

his

Gift of 22

III

2



Eight days for perusal
1364

November 11. 1705.

10

Nov. 2. 11.

P 4-15

1891

Aug. 2


Donavit

Gul: Hamilton A. B. Prof.

Societatis Nostræ

Socius Honorarius — 2)

M, DCC, LXXXVII





H. Z. PLATNER

IO. ZACHE. PLATNERI

D. ET PROF. MED. LIPS

INSTITVTIONES
CHIRVRGIAE

RATIONALES

TVM MEDICAE TVM MANVALIS

IN VSVS DISCENTIVM

EDITIO NOVISSIMA

RECENSUIT NOTASQUE ADIECIT

CAROLVS CHRISTIANVS KRAVSE

MED. DOCT. ET PROF. LIPSIENSIS

LIPSIÆ

SVMTIBVS CASPARI FRITSCH

MDCCLXXXIII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY



PRAEFATIO

EDITORIS

Non heri aut nudius tertius est, ex quo
CASPARVS FRITSCHIVS, Bibliopola apud
nos non minus honestus quam nobilis
et elegans, abs me vehementer etiam atque
etiam petiit, vellem institutionum chirurgiae
ab IOH. ZACHAR. PLATNERO olim conscripta-
rum, tertium quondam edendarum curam in
me suscipere, eamque ita agere, vt, quae post
tempora editionis prioris aut inuenta aut in
melius mutata sint, in arte chirurgica, nisi
omnia, praecipua saltem, adiungerentur. Ego
vero, tanti laboris difficultates perspicuens,
desiderio illi, quantumvis aequo et honesto,
satisfacere diu multumque dubitavi. Etenim
haec pars artis salutaris, et profectu efficacior
et factu difficilior, aetate nostra habuit incre-
menta tanta, quanta maxima. Quae, per in-
numerabiles libros sparsa, si quis velit collige-
re, et in vnum quasi corpus doctrinae ita coa-
dunare, vt nihil omissum, nihil superuacuum
aut falsum adpersum esse videatur, is profe-

P R A E F A T I O

cto onus humeris imponi suis patitur graue:
admodum. Haec quidem difficultas est com-
munis omnibus, qui in hoc scriptionis genere:
vires periclitari suas velint. Singularis vero
et propria obiecta est ei, qui PLATNERI li-
brum animaduersionibus augere secum animo
constituit. Nisi enim puritatem ac perspi-
cuitatem latini sermonis, a qua liber hic partem
non minimam commendationis laudisque ha-
bet, propius assequi studeat, laborem suum
prae populari elegantia et cultu sermonis
PLATNERI contemptum iri, certo praescire
potest. Haec mecum animo reputans, et mo-
dulo me metiens meo, sollicitationibus lauda-
ti FRITSCHII diu restiti et vsque, donec ille,
nisi ego manus admouere operi vellem, li-
brum eum alii nemini concediturum, sed nul-
lo ornatum augmento in vulgus tertia editio-
ne editurum se esse serio asseueraret. Ad haec
verba mutato consilio, operam meam libro
platneriano commodaturum me esse pollici-
tus sum, non quod ego tantum, quantum
FRITSCHIVS, mihi tribuerem, sed quoniam in-
telligebam, librum non solum modo a nostra-
tibus et Germaniae medicis, verum ab exteris
quoque haecenus lectum laudatumque, ex ma-
nibus

EDITORIS

nibus tironum breui post excussum iri, nisi a nouitate commendatio quaedam et gratia noua ipsi accesserit. Eum autem loco aliquo, haud vulgari aut infimo, ab exteris habitum esse, ne frustra dixisse videar, commemoranda est tum editio eius splendida illa, quae Venetiis A. MDCCXXXVII ex typographia IO. BAPTISTAE ALBRITH in forma quarta prodiit, et Auctoris Prolusionem de *chirurgia artis medicae parente* dissertationemque de *Fistula lacrymali* subiunctas habet; tum vero versio belgica A. MDCCCLXIV Amstelodami voluminibus in forma octaua duobus edita et inscripta: *Handleiding tot de chirurgie of Heelkonst etc. van den Heer I. Z. PLATNER, met veele nieuwe Anmerkingen verrykt door M. HOUTTUYN. Med. Doct.* Iteratis Fritschii precibus meisque ipsius cogitationibus victus atque compulsus cum de modo edendi libri et mecum ipse et cum illo deliberarem, magnae molis librum neque vsibus discentium neque facultatibus plerorumque accommodatum aptumve, neque adeo talem, qualem inscriptio promittit, fore facile perspeximus. Breuitati igitur studendum esse potissimum, attamen sic, ne fierem obscurus. Sinne

PRAEFATIO EDITORIS

utrumque an fortasse neutrum affecutus, penes
lectores aequos et intelligentes iudicium esto.
Si quis seuerior iudex; quod et nouum et uti-
le fuerit, subinde desiderari animaduertat, eum
rogo et obsecro, velit tum secum animo cogi-
tare, fieri non posse, quin in opere longo in-
terdum dormites; tum vero, humanae fortis et
libri inscriptionis memor, sperare, fore, ut di-
scientes meliora, desiderata, plura, edoceri a do-
ctoribus queant. Hoc si precibus meis de-
derit, oscitationibus etiam meis ignoscet, ne-
que ipse ad eas oscitabit, multo minus stoma-
chabitur. Ne vero, si quando ego librum
PLATNERI temeraui, error in eum refunda-
tur, animaduersiones, quae figuras has †, †† etc.
praefixas habent, a me esse profectas, ignorari
nolo. Scripsi Lipsiae in mercatu vernali
A. MDCCLXXXIII.



PRAEFATIO

I. Z. PLATNERI

In ea opinione me semper fuisse, profiteor, neminem ne illis quidem morbis, qui interiores corporis partes infestant, et quorum curatio a solis medicis requiritur, scienter ac perite mederi posse, nisi ea vitiorum genera, quae chirurgi sibi vindicant, habeat perspecta et pertractata. Quae enim in variis corporis sedibus extrinsecus incidunt, et quae oculis cernuntur, attrectatu sentiuntur, eadem fiunt in partium internarum viscerumque valetudinibus; non tam sensu in singulis morborum generibus, quam coniectura, ex collatis pluribus indiciis percipienda. Istorum autem morborum, quibus internae partes afficiuntur, natura, mutatio, euentus, omnisque curatio, quae vel artis beneficio fieri solet, vix aliter in notitiam venire potest, quam diligenti obseruatione vitiorum, quae chirurgiae auxilia desiderant, et omnium rerum, quae in horum decursu, atque varia curatione, incidere consueuerunt. Hoc vel seuerioribus disceptatoribus ex facili posset probari, si iam considerationem in inflammationem intendere et demonstrare vellem, illam, si in externis sedibus orta fuerit, febrem mouere, qua, vel discutatur, vel suppuratione finiatur, eamque, si male cedat, in gangraenam, scirrhum, vlcus, fistulam, carcinoma, degenerare. Morbi enim interiorum partium, qui ex iisdem conuersionibus nascuntur, nomine

P R A E F A T I O

ac sede magis, quam natura sua, ab his, quae extrinsecus fiunt, differunt. Quapropter omni tempore artem salutarem discantibus magnopere auctor fui, ut hanc vetustissimam eius partem, chirurgiam, cuius caeteroquin profectus eulentissimus est, diligenter excolerent, atque per eius notitiam ad recte medendi peritiam contenderent. Etiam inter caeteras artis disciplinas illam saepius discantibus, tum medicinae cultoribus, tum aliis, in hac vrbe chirurgiae operam dantibus, exposui, in eaque doctrina semper cum aliqua voluptate sum versatus. Sed plures fortasse existimabunt, mancam fuisse hanc doctrinam, propterea, quod in hac vrbe satis idonea facultas experimentorum huius efficacioris, quae manu sit, medicinae faciendorum in valetudinariis non detur: in omni autem disciplina, quae non sola ratione atque intelligentia contineatur, sed usu discatur, perficiaturque, vel maxime necessaria videantur experimenta. Per haec enim illam medendi rationem in valetudinariis disci posse, quae, cum aegrotantibus vario morbo conflictantibus affluentissima sint, magistros plerumque habeant peritiores, et qui multo usu atque fere quotidiana exercitatione maiorem in secando dexteritatem sint consecuti, ut horum non solum institutione, sed etiam exemplo, proficere possint tirones. At enim vero, quanquam, si verum sine ambitione fatendum est, inficiari non possum, haec efficacioris medicinae experimenta apud nos non ita frequentia esse, haud tamen crediderim, ob id omnem harum rerum doctrinam
super-

superuacaneam esse, et inutilem. Nam altera illa chirurgiae pars, quam medicam vocamus, et quae, impositis medicamentis, plurimum praestat, quae etiam ad vulnera, a chirurgo facta, omnem victus et medicamentorum intus dandorum rationem dirigit, optime docetur ab iis, qui non solam anatoimen norunt, sed, qui omnia, quae ad hominis, tum recte valentis, tum aduersa valetudine oppressi, naturam attinent, habent perspecta, nec medicamentorum, tum simplicium, tum varia arte compositorum, facultates ignorant. Quam necessaria sit haec chirurgiae pars, illis obscurum non est, qui interdum aegros viderunt scalpello dextre et feliciter curatos, sed postea, vbi inflammatio concitata fuerat, sanguinis missione, vel neglecta, vel immoderatus facta, aut alienis a morbo medicamentis, aut cibo pleniori, potioneque valentiori, ad mortem praecipitados. Nihil commemoro de varii generis tumoribus, qui nec scalpellum, manumque, sed medicamenta, postulant, quibus id, quod intumescit, vel reprimendum, vel discutiendum, vel, si ad suppurationem spectat, digerendum, emolliendumque, est. Nam, si haec medicamenta, non diuersis illorum generibus, et variis etiam, quae in his curationibus sunt, temporibus, accommodantur, illa omnia exasperare, et saepe immedicabile malum afferre possunt, cum et alii tumores sint, qui, quod in se ipsis aliquid corrupti habent, veluti cancer, omnibus auxiliis, tum scalpello, tum medicamentis, irritantur. Quid? quod inter illas curationes, quae manu ferramen-

P R A E F A T I O

tisque fiunt, magnum discrimen est. Sunt quaedam, quae, cum in iis multa genera atque tempora periculi sint, non, nisi usu atque longa exercitatione perdiscuntur, inter quas fere prima est, qua calculus ex vesica, si huic innatus est, educitur. Inter caeteras autem plures sunt, quae a quouis, cui partium, quibus succurrendum est, natura, et reliqua, aliunde cognita sunt, etiam nullo praeceunte magistro, ad aegrotantes possunt adhiberi. Et nemo ignorat, etiam inter Parisienses chirurgos, qui, prae aliis omnibus, docti et rerum suarum experti sunt, admodum paucos esse, qui, incisa vesica, calculum protrahere audeant. Nec ad illas arduas curandi vias, operationes vocant, aditus fieri potest sola imitatione magistri atque exercitatione, sed etiam vel maxime necessaria est notitia ipsius noxae, cui mederi volumus, et causarum, tum evidentium, tum abditarum, nec non omnium, quae incidere possunt. Parum saepe proficiunt tirones, qui hanc medicinae partem a magistris accipiunt, qui, usu tantum edocti, aliquando intra paucas horas omnem chirurgiae doctrinam exequuntur. Plurimum autem ab his illi discere poterunt, si, dum eos accedunt, animum accuratiori omnium illarum rerum notitia habeant praeparatum atque praecultum. Nihilominus tamen mihi, omnibusque, qui artem salutarem, in hac Academia, vel profitentur, vel discunt, in votis est, ut olim chirurgiae maiori honos habeatur, et occasio nascatur, qua illa etiam apud nos in valetudinario per experimenta possit addisci. Sed vero, cur has Institutiones

tiones scripserim, easque in lucem ediderim, iam
 paucis, Lector beneuole, accipies. Chirurgiam
 docenti defuit libellus, qui vtramque chirurgiam,
 tum medicam, tum manualement, dilucide et in
 compendio exponeret. Vt igitur discentes dicto-
 rum memoriam breui repetitione reficere possent,
 has theses conscripsi, quae postmodum ab his mul-
 toties transcriptae, et ob id etiam mendosiores
 factae, fuerunt. Has vero ita disposui, vt, ab in-
 flammatione, quam cum plurimis noxis, et cum
 vulneribus etiam, quae a chirurgo fiunt, esse oportet,
 orsus, hac quasi manu ducente ad eius supra
 commemoratos effectus et ea, quae hos conse-
 quuntur, fuerim progressus, qui deinceps vulne-
 rum, tumorum, vlcenum, fistularum, varia genera,
 ossium etiam morbos, executus sum, et alia quae-
 dam vitia addidi, quae singularem, quae manu fit,
 curationem postulant. Reliquorum enim morbo-
 rum expositioni mox efficaciorẽ medendi ratio-
 nem subiunxi, id quod vel ideo magis opportunum
 visum fuit, quod, si illae curationes, vel sic dictae
 operationes, seorsim traduntur, saepe necesse est,
 tironum animos ad memoriam iam alibi explicati
 morbi reuocare. Et nemo ignorat, doctrinae va-
 rietatem discantium animos quasi reficere, atque ad
 maiorem attentionem cogitationemque excitare.
 Commemoraui etiam optimos autores, praecipue
 eos, qui de morbis quibusdam, et variis eas cu-
 randi viis, singulari studio commentati sunt. Hoc
 autem velim omnes tenere, et scire, me scripsis-
 se tironibus, non excellentibus in arte Professori-
 bus

P R A E F A T I O

bus, nec peritis atque exercitatis Magistris, quibus in hoc libello plura leuiores, et vix commemoratione digna, videbuntur, quae tamen, discipulorum in gratiam, vel ex anatome, vel ex aliis disciplinis, repetenda fuerunt. Hoc vel ex iis intelligi poterit, quae sub finem de partu naturali proposita leguntur. Prima enim laus doctoris, qui rudes et omnium rerum ignaros bonas artes disciplinasque docet, mihi semper visa fuit perspicuitas, et adhibita diligentia, ne ea, quae leuia et minora videri possint, omittantur. Cum vero iam ante plures annos hunc laborem his thesibus conscribendis impendissem, et harum Institutionum quasi primas lineas duxissem, iam tum plures me hortati sunt, ut illas in publicum ederem. Obtulit se etiam Nobilissimus Vir, mihiq;e, dum viueret, amicissimus, CASPARVS FRITSCHIUS, qui necessarios sumtus, se suppeditaturum promisit. Igitur statim ab illo tempore quaedam plagulae typis exscribi coeperunt. Sed, cum, et aegrotantium curationes, et alia negotia, nimis me occupatum habent, interdum etiam aduersa valetudo incidit, plurimum saepe mensium mora est illata. Tandem, cum laudatissimus Fritschius ante aliquot menses diem supremum obiisset, haeredes me de perficiendo hoc libello urgere non destiterunt, quae postulatio tam aequa et honesta mihi visa est, ut illi resistere haud potuerim. Sed vero eo ipso tempore in miserum diuturnumque morbum incideram, quo per plures menses adeo intabui, ut mihi, ad omnem rem omneque studium minus idoneo, magis

gis de vitae, quam de huius libelli, exitu atque fine fuerit cogitandum. Cum vero tamen promissa exigerentur, iisque satisfacere cuperem, petii a Viro Excellentissimo et omni eleganti doctrina perpolito, IVSTO GODOFREDO GVNTZIO, in Academia nostra Anatomiae et Chirurgiae Professore Extraordinario, vt summam manum opusculo imponeret, idque sibi, si parente suo orbaretur, adoptaret, id quod ab eo, qui semper mei amantissimus fuit, et me singulari beneuolentia profecutus est, facile impetraui. Huic debes, Lector, ea, quae ad varias calculosos curandi vias, et ad omnem huius curationis historiam, quam longam accuratamque praemisit, attinent. Haec, magno labore ex optimis autoribus composita, quam pulchra sint, ipse legendo deprehendere poteris. Interca, cum meae valetudinis grauitas se paululum remitteret, et ego me aliquantum alleuatum sentirem, ipse iterum hunc laborem suscepi, et pauca, quae post calculosorum curationem sequuntur, inter corporis aegritudines debilitatesque perfeci. Dum vero iam hoc opusculum in publicum emittitur, id abs Te petatum impetratumque volo, vt omnia, et ea etiam, quae emendatione quadam egent, aequi et boni consulas. Multa enim corrigere possem, si, quae ante aliquot annos typis expressa fuerunt, iam scribenda essent, id quod vel ex dissertatione, quam, si Deus vitam dederit, propediem de Hydrocele proponam, clarum erit. Sunt etiam, in quibus per errorem lapsus est, cuius rei exemplum legitur in §. 831. cum quo §. 848. conferri potest.


PRAEFATIO I. Z. PLATNERI

potest. Animus erat, quasdam correctiones, emendationesque, sub finem libelli addere, et alia quoque adiicere, quae ab illo tempore, quo hae theses litteris mandatae sunt, a praestantissimis auctoribus fuerunt prodita, sed, tum a festinante propter nundinas typographo, tum a graui tenacique morbo, qui, dum hoc scribo, recrudescere videtur, prohibeor. De adiectis tabulis, et ferramentorum, aliarumque rerum, quae ad chirurgi officinam pertinent, iconibus, illud moneo, eas in Cel. HEISTERI et GARENGEOTI libris desiderari. Longe plura sunt ferramenta, a recentioribus reperta, quae addi potuissent, sed cura habenda fuit, ut a discentibus minore sumtu libellus parari possit; quorum utilitatibus si ille inseruire poterit, ego magnum laboris mei fructum tulisse mihi videbor.

D. Lipsiae d. XXIII. Maii MDCCXXXV.

IO. ZACHAR. PLATNERI
INSTITVTIONES
CHIRVURGIAE
RATIONALIS.

PARS PRIOR.





PROLEGOMENA

DE

CHIRURGIAE DEFINITIONE EIVS CVM MEDICINA NEXV ET MEDICI ATQVE CHIRVRGI IN CASIBVS CHIRVRGICIS OFFICIO.

§. 1.

Chirurgia proprie et ex etymo est illa Medicinae pars, quae manu curat. Seu quae hominis sanitatem tuetur morbisque medetur manu ac medicamentis, quae exterius corpori admoventur.

§. 2.

Sanitas consistit in integritate omnis actionis vitalis, naturalis, animalis, humanae. Si hae actiones non recte fiunt, varia morborum genera nascuntur. Omnibus medetur Chirurgia, frequentissime autem noxis partium solidarum externarum.

§. 3.

Chirurgi curant manu, et nuda, et variis instrumentis armata. Illi vero sibi a longo tempore vindicant etiam tumorum, vulnerum, ulcerumque curationes *, quae solis medicamentis fiunt. Diuiditur igitur Chirurgia in medicam et manualementis.

* Vid. CELSVS Lib. VII. Praef.

§. 4.

Et medica diuiditur. Nam ad eam pertinet non solum cognitio omnium medicamentorum, quae va-

riis sedibus corporis, si vitio laborant, imponuntur sed etiam eorum, quae intus sumuntur, omnisque vitus ratio, quem his curationibus accommodari oportet. His enim pericula, quae aegris ex variis rebus imminet, propulsantur, et ipsa chirurgica curatio non parum iuuatur.

§. 5.

Ea curandi ratio, quae manu fit, medicamentis recte imponit *, et manu, ferro, igne, varioque ferimento et machinamento dimota iungit (σύνθεσις) concreta diuidit (διαίρεσις) quae intus haerent educit (ἐξαίρεσις) quae vitiosa sunt vel abundant aufert (ἀφαίρεσις) alia adponit (πρόσθεσις) quae loco suo non sunt et detorta reponit (διόρθωσις) **.

* Exempli loco esse potest tempus, quo variae compositiones, quae imponi solent, mutari debent. Cataplasmata et epithemata quarta vel quinta quaque hora mutari decet; Et, si aeger non satis stragulis tectus est, atque in aere frigido decumbit, citius. Vnguenta et Emplastra per XII aliquando XXIV. horas superhaberi queunt. Infra de vulneribus dicitur, saepe multum ad eorum curationem conferre raram deligationem. Si vero illa alieno humore, pure, ichore, lotio, fecibus, bile et similibus multum inquinantur, lintamina et medicamenta saepius mutari oportet.

** Vid. GOVRMELENVS, qui vero διόρθωσιν et πρόσθεσιν ad σύνθεσιν, ἀφαίρεσιν ad διαίρεσιν retulit.

§. 6.

Chirurgia cum Medicina ita connexa est, ut ex toto separari non possint *. Necesse itaque est, ut Medicus et Chirurgus, si aegrorum fanitas quaerenda est, concorditer agant, ne in diuersas curandi vias procedant **.

* Vid. SCRIBONIVS LARGVS Compos. 260. p. 109. Herophili et Erasistrati temporibus Medicina in tres partes diducta fuit, vide GELSVM Praef. Lib. I. conf. Praef. Lib. VIII.

** Optat.

** Optandum est, vt illa acerrima et ex inimicitiiis orta controuersia, quae in Gallia inter Medicos et Chirurgos agitur, tollatur. Fungantur vtrique suo officio. Medici maiorem diligentiam adhibeant ediscendis rebus Chirurgicis, sine quarum notitia nec Chirurgicis curationibus praeesse, nec aliorum morborum causas, vt decet, nosse queunt. Chirurgi desistant ab illa arrogantia, qua omnium periculosissimorum morborum curationes, nec iis exceptis, quae in internis corporis partibus consistunt, sibi sumunt. Vtrumque aegrotantibus saepe perniciosum et funestum est. Voluntatum Consiliorumque facilis consensus est inter expertum prudentemque Medicum et modestum rerumque suarum peritum Chirurgum. Intolerabilis Medico est Chirurgorum saepe ignorantissimorum inconsiderata temeritas, arrogantissima de rebus suis persuasio, et odiosa alienae doctrinae affectatio. Nec minus molesta est cordato Chirurgo Medici inurbani, rudis ac indocti imperiosa dictatura.

§. 7.

Medicus, qui praeesse vult curationibus chirurgicis, omnium rerum, quae ad hanc medendi rationem pertinent, gnarus sit, necesse est. Debet pharmaca intus sumenda, victusque rationem solus, reliqua auxilia, in consilium vocato Chirurgo, praecipere. De ipsa efficaci medicina, num hac opus sit, et num illa sine maiori aegrotantis discrimine adhiberi possit, et qua methodo vtendum sit, praeterea de temporis etiam et loci opportunitate decernere, omnemque instrumentorum et fasciarum apparatus diligentius examinare. Praeter haec omnia debet aegro animum addere, et ei, vt Chirurgo confidat, persuadere, hunc, si opus est, officii sui admonere, consiliisq; adiuuare et semper cum hoc laborum socio amice ac fideliter viuere.

§. 8.

Qui Chirurgiae operam dare vult, Anatomen summo studio discat, et crebrius defunctorum cadauera incidat, manusque secando exerceat. Non solum vero oportet nosse singularum partium posituram, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laeuo-

rem, confractum, processus denique singulorum et recessus, quae omnia patefiunt Anatome *, sed etiam singularum partium, tum solidarum, tum fluidarum, naturam, mutationes, effectus et symptomata. Praeterea haud ignorare oportet rerum non naturalium, consuetudinis etiam ad morbos gignendos, alendos, tollendosque miram efficaciam.

* Laudabilem operam praestitit PALFINVS, qui Anatomen Chirurgiae accommodauit et Obseruationibus illustrauit.

† PALFINI librum melius instruxit et latius diduxit A. PETIT, medicus apud Parisienses clarus. Vt autem et Germanorum illi, qui linguas non callent, eum legere possent, in teutonicam linguam a G. L. HVTH et I. W. WIDMAN translatus est.

§. 9.

His praecognitis artem discat a magistro illam docente; legat optimos autores infra nominandos; studeat etiam medicamentariae. Oportet vero prius nosse simplicia, horumque proprias facultates, post vero progredi ad compositiones. Has, quia saepe ex pluribus et sibi contrariis constant, mutare cuilibet, qui earum vires cognititas habet, facile est.

§. 10.

Non sola autem doctrina, sed exercitatio, facit Chirurgum. Tiro itaque magistros duces sequatur, qui artem cum laude in magna vrbe, aut in valetudinario, in quo frequentes aegri decumbunt, exercent. Efficacem Chirurgiam primo crebrius in demortuorum cadaueribus imitetur, post, praesente magistro, veluti monitore, illam in viuientium corporibus tentare poterit. Semper a curationibus, quae ex facili fiunt, veniendum est ad arduas et periculorum plenas.

§. 11.

Chirurgum, qualis caeteroquin is esse debeat, CELSVS * descripsit. Cum in aegrotantium salutem
saepe

saepe tristiora adhibenda sint remedia, aegrorum gratiam is sibi conciliare studeat honestate, modestia, omni animi moderatione et laborum taediorumque patientia. Quamuis non raro oporteat eum immisericordem esse, caueat, ne immanfuetus, crudelis, agrestis et moribus efferationibus aliis videatur. Nunquam in laude et gratia apud aegros sunt, qui se, histrionum more, gloriando efferunt. Medico, qui curationi praeest, Chirurgus obediat, si is rerum satis intelligens est. Aequales sociosque aequo animo ferat, omnia ex optimae mentis conscientia agat, nihil ex lucelli vel gloriolae cupiditate.

* Lib. VII. Praefat. *Essé autem Chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraque, animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accipit, non, ut clamore eius motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur.*

DE VARIA CHIRVRGI SVPEL- LECTILI, INSTRVMENTORVM, FASCIA- RVM ET LINEAMENTORVM APPARATV.

§. 12.

Opus etiam est vario instrumentorum apparatu, qui magis ad vsum, quam gloriosam ostentationem compositus sit *. Semper enim praestat instrumentis paucioribus, iisque diligenter atque assabre factis, uti, quam nimia et cum theatrâli ostentatione ante aegri oculos exposita supellectili huic trepidationem iniicere. Nossé etiam debet Chirurgus instrumentorum et machinamentorum fabricam, ut, quae idonea sunt, possit artificibus imperare, alia corrigere.

* HIPPOCRATES de Articulis Textu XXVII. Edit. Charteri p. 377. *Turpe autem est in omni arte, nec minus etiam in Medicina, sine ullo profectu magnam adhibere turbam, magnum spectaculum polliceri, et multa verba facere.*

§. 13.

Ex instrumentis, quae semper et omni occasione ad manus esse debent, sint haec potiora: Scalpelli recti, falcati, alii ancipites, quos phlebotomos vocamus (*Lancettes*), iique maiores, minores. Forfices rectae, incuruae. Specilla varii generis variaequae magnitudinis, quae parantur ex argento, ferro, plumbo, balaenaria virga, cereo. Alia specilla, quae fulcum in longum ductum habent, super quae inciduntur sinus ac fistulae; vocantur nonnullis itineraria. Acus rectae, incuruae, variae magnitudinis. Nouaculae, volfellae, hamuli, forcipes, spathulae. De aliis instrumentis, quae ad singulas corporis sedes earumque chirurgiam requiruntur, suo loco dicendum.

* Vid. SCVLTEI Armamentarium. GARENGEOT des Instruments. HEISTERI Chirurg.

§. 14.

In promptu etiam Chirurgus habeat fascias. Aptissimae sunt lineae, quae ex linteo parantur detrito, molli, satis tamen valente, eoque mundo et nullo alieno colore infecto. Linteum scindatur sectione ad stamen directa, et videndum, quantum fieri potest, ne laciniam, oram vel futuram habeat. Quare iam multis in usu sunt habenae lineae textoris arte paratae (*Zwirn-Baender*). Aliquando valentioribus ligulis opus est.

§. 15.

Fasciarum plura sunt genera. Sunt aliae, quae variis, aliæ, quae certis saltem sedibus idoneae sunt. Aliae simplices, aliae compositae. Simples sunt vel longiores habenae, in vnum aut duo capita glomeratae,

tae, vel mantilia, quibus diuersae sedes varia ratione inuoluuntur. Compositae fasciae vel ex mantilibus diuerso modo figuratis et incisus struuntur, vel ex illis longis habenis sibi allutis. Nomen habent fasciae a sedibus, quae illis vinciuntur *, a figura **, ab effectu ***, ab inuentore ****.

* Capital magnum, Gallis *le grand Couvre chef*. Capital minus, *le petit Couvre chef*. Capiti cum vinculo scisso suspendente *la Serviette avec la Scapulaire*. Capiti veteribus pectoralis tunica et thoracis genus fuit. vide Varro- nem de L. L. Lib. IV. cap. 30. p. m. 22.

** Cancer Galeni dicitur linteum scissum, quo caput inuoluitur. Funda, Gallis *la fronde*, linteum scissum pro fronte, auribus, oculo, mento. Accipiter, Gallis *l'éprevier*. Capistrum, *Chevestre*. Spica, *Chirotheca*.

*** Fascia vniens s. glutinans, expellens.

**** Fascia HELIODORI. Accipiter MENECRATIS, Vide VIDM VIDIUM Chirurg. L. III. p. 55.

§. 16.

Simplicioribus fasciis glomeratis, s. habenis, accedit differentia, ex circumducendi ratione. Quae circa membrum in orbem ita voluitur, vt nec sursum, nec deorsum feratur, sed alter circuitus priorem comprehendat, orbicularis, Gallis *le Circulaire*, dicitur. Quae sursum versum, vel deorsum ita fertur, vt quasi in cochleam serpat, et duas tertias prioris comprehendat, *Afcia*, Gallis *le doloire*, vocatur. Quae vero in vtramque partem ita ducitur, vt tertiam demum partem prioris amplectatur, *Sima*, Gallis *le mouffe*, dicitur. Quae tandem maiori interuallo ita serpit, vt orbes sese haud contingant, Gallis *le rampant* audit. A veteribus haec ad simam relata fuisse videtur. Quandoque, si membra inaequalis crassitudinis sunt, fasciae in circuitu inuertuntur, quo valentius contineant; Gallis dicuntur *les renversés*. Hoc fasciandi genus subiectas partes offendit.

Vide has denominationes fasciarum in HIPPOCR. de Medicina officina L. II. Text. 2. et GALENI in hunc Librum Comment. de fasciis vid. I. c. GALENVS, SORANVS, et HELIODORVS, HEISTERVS, VERDVC *des Bandages*, BASSIVS.

§. 17.

Diuerſam latitudinem habeant habonae, melius vero attrahitur, quae anguſta eſt et ſaepius circumdatur. Nunquam ſuper vulnus, vlcus, aut tumorem incipere debet fascia, aſt ſuper fracturam. Extrema eius pars inferioribus aſſuenda eſt. Nodus enim, vel futura, vel acus, qua finis ſiſtitur, vulnus et fracturam offendit. Sic deliganda ſunt membra, et circumdandae fasciae, vt contineant, nec tamen adſtringant. Quod non recte continetur, elabitur, quod nimis adſtrictum eſt, ſtupore, atrophia, gangraena, periclitatur. Satiuſ eſt, fasciam ſaepius circuire, quam adſtringi. Fascia in duo capita glomerata ſaepe media primum iniicitur et duabus manibus in vtramque partem ducitur. Aliquando tamen capita non aequalem longitudinem habent. Eo ordine, quo inieſta fuit fascia, etiam ſolui debet, et ſi membro agglutinata inhaeret, non vi auelli, ſed calida aliove liquore molliri. Fasciis, quae preſſius et adſtrictius glomeratae ſunt, conſcinne vincitur.

§. 18.

Fasciarum ope curantur fracta, luxata, continentur clapſa, ſuſtinentur tumores, adducuntur et glutinantur vulnera, coërcetur ſanguis, exprimitur pus et ſanics, a membris male affectis auertitur aëris aliarumque rerum, quae nocere poſſent, iniuria.

§. 19.

Veteres in deligandis vulneribus uſi ſunt lana bene carpta, quam impoſuerunt. Hodie vtuntur chirurgi linamentis. Horum enim, quae detrita eſſe oportet, ſtamina ſingula digiris enellunt, ea ordinatim ſibi apponunt, complicant, et in ſic dictos puluillos, Gallis
pluma-

plumaceaux, formant, quibus varia magnitudo ac figura est. Hos vulneribus, vlceribus, ossibus nudatis vi-
tiatisque imponunt, superque ea medicamenta, quae
e re sunt. Puluilli etiam ex variis liquoribus expri-
muntur, et his tincti vulneribus et vlceribus super-
dantur. Linamenta carpta etiam obiciuntur ruenti
sanguini, qui saepe his solis et facta compressione co-
hibetur. Iisdem etiam purgantur madentia vlcera.
Nam ea his imposita humorem, qui ex iisdem fertur,
spongiae in modum perforbent. Si, id quod in vale-
tudinariis frequentius incidit, linteï copia non habe-
tur, vti solent stupa pectine diligenter deducta.

§. 20.

Si iam descripti puluilli manu comprimuntur et
conuoluuntur, fiunt *ellyphnia*, Gallis *Bourdonnets*,
quae plerumque ex filo suspensa in profundiora vlcera
demittuntur. Ex iisdem vero lineis filis, seu stamini-
bus, struuntur turundae teretes, oblongae, clauo simi-
les, vel ex vna vel ex vtraque parte scissae. Ab his,
quae figuram habent coni, differunt aliae, quae ad
figuram cylindri accedunt, quas Galli *les Maiges* ap-
pellant (*Fig. I.*). Aliae turundae fiunt ex linteolis
in conum contortis, quarum extremum in fila resolu-
tum est. Turundae in vulnera et vlcera profundiora
fistulasque demittuntur. Quia vero nec pus exire
nec vulnera glutinari sinunt, orasque vulnerum graui-
ter offendunt, iis non nisi minoribus mollibusque
praeterea raro et tunc saltem vtendum, quando satius
est vlcera nondum curari. Sunt enim non pauci, qui
omnem turundarum vsum veluti noxium repudiarunt.
Fiunt etiam turundae, quae, tum humorem ex vlceri-
bus sorbent, intumescunt et vlcerum fistularumque
sinus ampliant (Germ. *Quell-Meissel*). Harum ma-
teria est spongia cerata, radix siccata gentianae, aristo-
lochia, quae radices etiam aliquam vlcera purgandi
viam

vim habent. Rapa siccata satis inflatur et minime offendit.

Vid. CAESAR MAGATVS L. I. C. 45. p. 42. BELLOSTE.

† Spongia non cerata, verum arctius fortiusque compressa promptius sorbet, atque intumescit, minus vero premit atque irritat. Fieri compressio potest vel torculari vel circumductis filis, crassioribus cannabinis (*Bindfaden*) vehementius constrictis.

§. 21.

Ex linamentis etiam struuntur penicilli, Gall. *Fausse tentes*, quibus mediantibus ex ulcere pus et sanies extrahitur. Praeterea pilae seu glomi, Gall. *Pelottes*, qui vulneri, quod chirurgus in herniae chirurgia facit, imponuntur. Nec non maiores glomi paululum depressi, Gall. *Gateaux*, quibus, si membra praecisa fuerunt, carniū ossiumque frons contegitur (*Fig. III.*). Nec non minores depressioresque glomi, quibus foramen in calvaria modiolō factum impletur (*Fig. IV.*)

§. 22.

Linteola etiam varie figurata adaptantur et imponuntur durae matri, si calua effracta vel modiolō excisa est. Alia sunt linteola caesitia, seu quorum ora in fila resoluta est; quae in pectoris vulnera, si chirurgus turundis uti non vult, coniiciuntur (*Fig. V.*). Linteolis sanguinem ex vulneribus extergunt, si in varia chirurgia vulnus faciendum est, quae opportuniora habentur, quam spongiae.

§. 23.

Emplastra in varios usus ex gummi, resina, cera, seu, admixtis pulueribus vegetabilium, animalium, mineralium, absurde saepe composita, inducuntur panno lineo et serico, nec non alutae. Multis modis figurantur. Imponuntur cuti, pilis prius abradis, et continent imposita pharmaca, puluillos et turundas. Purgant et curant vulnera et ulcera. Tumores resolu-

vunt,

vunt, molliunt, digerunt, pus mouent, et ab omnibus aëra auertunt.

§. 24.

Ad hanc supellestem etiam pertinent panni, qui simplices, duplices et multiplices ex linteo struuntur variamque figuram accipiunt. Qui oblongi sunt, veteribus splenia dicta fuere *. Iisdem partes laesae involuuntur, vel ficcis vel vino aliove liquore tinctis, et dicuntur Epithemata. Necessè est plerumque, si sic imponuntur, ut liquor, quo madent et ex quo diligentius exprimendi sunt, caleat. Panni ficci comprehendunt fracta et luxata, aliasque sedes contra aëra et ea, quae incidere possunt, custodiunt. Madentes vero medentur inflammatis, alioque vitio laborantibus partibus. Densis gradatisque pannis membra crassitudine inaequalia aequalis crassitudinis fiunt, ut iis melius ferulae accommodari possint. Gradatis etiam sanguis sistitur, et pus vel sanies ex profundiori vulnere vel ulcere exprimitur.

* Vid. MARTIAL. L. II. Ep. 29. PLINII H. N. L. 29. T. II. p. 514. PLINIVS EPIST. L. II. Ep. 2.

§. 25.

Fistulis ex auro, argento, plumbo fabrefactis, rectis, incurvis, rigidis, flexilibus educitur sanguis, serum, pus, ex thorace et abdomine, urina ex vesica. Debent esse recurvatis in exteriorem partem labris, vel circumcingente quadam remora, ne intus totae delabi possint. Et hae vulneribus infestae sunt, si in his relinquuntur, imo magis, quam turundae. Siphonibus etiam quandoque dicti humores euocantur, frequentius varii liquores in vulnera ulcerumque sinus immittuntur.

§. 26.

Nec deesse debent Chirurgo ferulae, loramenta, ligamenta, ligulae, fila, quibus in fractis luxatisque membris extendendis, iisque in sedes compellendis, in
tumo-

tumoribus continendis, in sistendo sanguinis profluvio, vulnere fuendo chirurgus utitur.

§. 27.

Autores, qui de vniuersa chirurgia optime scripserunt et ideo legendi, sunt: HIPPOCRATES, CELSVS, GALENVS, ORIBASIVS, AETIVS, PAVLVS AEGINETA, ALBVCASIS, DE SALICETO, DE CAVLIACO, DE VIGO, GOVRMELENVS, PARAEVS, FEL. WÛRTZIVS, VESALIVS, FALLOPIVS, GVILLEMMAEVS, HOLLERIVS, FABRICIVS AB AQVAPENDENTE, FABRICIVS HILDANVS, A CRVCE, M. A. SEVERINVS, SCVLTVS, GLANDORPIVS, DE MARCHETTIS, PECCETTIVS, SOLINGIVS, ROONHVSIVS, NVCKIVS, PVRMANNVS, VERDVCCVS, CLERICVS, DIONIS, HEISTERVS, BELLOSTIVS, GARRENGEOTTVS, MARINVS, LE DRAN etc.

† Numerosum recensum scriptorum chirurgicorum habet PORTAL in libro inscripto: *Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie*, Paris 1770. A. HALLER in *Bibliotheca Chirurgica*, Basileae 1778. STEPHAN. HIERON. DE VIGILIIS in *Bibliotheca Chirurgica*, Vindobonae, 1781. Recentius editorum Scriptorum chirurgicorum penum habemus in AVG. GOTTL. RICHTERI *Bibliotheca chirurgica*.

DE INFLAMMATIONE.

§. 28.

Chirurgiae operam daturò valde necessaria est inflammationis notitia. Nam si externae sedes inflammantur, requiri solet Chirurgorum opera. Ex inflammatione etiam variae noxae nascuntur, quarum plures ferramentorum operam desiderant. Nec vulnera, tum quae Chirurgus accipit, tum quae facit, sine illa esse quicunt, quae, si increbrescit, magna pericula adfert.

adfert. Saepe ea quoque tumores, vlcera, luxata fracturae occupat.

§. 29.

Nomen habet a similitudine, quae est inter partes igne ambustas et inflammatas. In vtrisque differentia est, si variae sedes leuiter adfectae sunt, aut grauius, et si vitium altius descendit.

§. 30.

Inflammatiō est motus auctus sanguinis in corpore viuo, quo succus in minimis arteriis partium mollium quiescens maiori vi agitur, vt is vel mobilis reddi vel in pus verti queat.

§. 31.

Sanguis mouetur secundum naturam et per corpus diuiditur actione potissimum cordis, cuius valentiori et celeriori motu etiam is celerius et valentius propellitur. Cordis tamen actio non sola ad mouendum sanguinem sufficit, sed requiritur, praeter naturale illud, etiam vitale robur, quod tum in vasis tum in omnibus aliis partibus est, qui nervos sensum motumque praestantes habent*. Nisi hoc, quod plura experimenta probant, concedas, intelligi vix poterit, cur sanguis maiori vi per vnā arteriam feratur, quam per alteram, et cur in inflammatione, v. g. ex infixa spina tumor circumcirca fiat, vt taceam, inflammationes vehementiores et periculosiores esse in nervosis partibus, quam in aliis sanguine abundantibus.

* Vid. praeter STAHLIVM GORTERI Compend. Med. Tract. LXVI. n. 8. T. I. p. 234.

§. 32.

Motus hi vitales, data obstructione in corpore viuo, seu quiescente in arteriis humore increbrescunt. An propterea, quod sanguis, qui vasa quaedam obstruita

structa permanere nequit, copiosior per caetera fertur? An quia nervi tum partis laborantis, tum ab his cardiaci in vehementiorem motum cientur? An inflammationis motus debetur ynice illi vitali vi, siue autocratiae naturae *, quae corpus tuetur, et quae multis morbis, interque hos vulneribus ossibusque fractis, sola medetur?

* Ne ambiguitas in vocabulo sit, intelligo per naturam complexionem omnium causarum, quae nobis vitam praestant. Harum causarum plures, ex Physiologia, cui Physica, Mechanica, Chemia et Anatome praelucet, novimus, non paucas tamen ignoramus. Vide LANCISIUM de Corde p. 2.

§. 33.

In omni inflammatione humor quidam in aliqua parte quiescit; plerumque sanguis; si vero verbum inflammationis pluribus valetudinum generibus accommodare, et erysipelas, rheumatismum, arthritidem ad eam referre velimus, etiam lymphæ, serum aliique succi. Prior vera, altera spuria inflammatio dici poterit.

* v. g. ex fero per tubulos, qui in cute sunt, exire solito erysipelas, ex lymphæ in ligamenti articulorum arthritide, podagra, ex eadem in periostio et aponeurosi rheumatismus.

§. 34.

Quiescit humor imprimis in arteriis, quippe quae conicam figuram habent et finem versus angustantur. Eum tamen etiam quandoque in venis haerere, si spasmus constringuntur, vel aliis rebus premuntur, varices et haemorrhoides coecæ, nec non oedema, ex compressa maiori vena sanguinea ortum probant. Non vero in solis arteriis, per quas sanguis in corpus diffunditur, inflammationis sedes est, sed etiam in aliis longe minoribus, quae alium tenerioremque succum habent. Si enim in oscula harum arteriolarum, quae ex latere maiorum educuntur, humor, qui caeteris suc-

cis

cis crassior est, cogitur, ille per minores fistulas permeare nequit, in iis haeret et sic obstructionem atque excitata vitali virtute inflammationem parit. Hoc ita fieri, iam olim CELSVS * cognouit. Ad oculum res demonstratur in tunicarum corneae atque adnatae inflammatione.

* Praefat. L. I. *Si sanguis in eas venas, quae spiritui accommodatae sunt, transfunditur, et inflammationem, quam Graeci φλεγμονή nominant, excitat. Et mox: Si manantia corpuscula, per inuisibilia foramina subsistendo, iter claudunt.*

† Haereatne sanguis in minoribus vasis arteriosis, an vero extra ea in telam cellulosam effusus sit, haud pauci dubitant; quorum sententias, rationes et animadversiones vid. apud A. HALLERVM in *Physiologiae operis* T. I. p. 37. 38. et aliis locis. Verum eorum opinioni repugnat contemplatio diligentior. Nam in oculorum, menyngum, ventriculi et intestinorum venenis acribus laesorum, aut hernia incarcerata affectorum inflammationibus vasa singula et discreta sanguine turgescere oculus et microscopio armatus et non armatus clare cernit.

§. 35.

Inflammatiō igitur nascitur ex obstructione, quae incidere potest in omni corporis parte, quae arterias habet. Itaque etiam obstructio in ossē durissimo, non vero, vt infra dicetur, vera inflammatiō. Cum autem plura arteriarum genera sint, in omnibus quidem obstructio oriri potest, genuinae et sanguineae tamen inflammationis sedes esse videtur in arteriis lymphaticis, in has, non nisi tenuem et pellucidum humorem rehere solitas, rubicundus sanguis transfunditur.

§. 36.

In omni itaque parte molli, arterias sanguine et lymphā plenas habente, oriri potest obstructio et inflammatiō. Hoc autem incidit frequentius in adipe et tunica cellulosa. Nam mollis raraque eius com-pago est, cuius cellulae ita factae sunt, vt ex vna in alteram aditus sit, id quod vel flatu immisso quilibet
B experiri

experiri potest. Sanguinis motus in ea multo tardior est, ac in aliis partibus, quae exquisitiorem sensum habent. Propterea a quiescente sanguine facile distenduntur, rumpunturque arteriae, quae humorem in cellulas illas mittunt. Sanguis ibi quiescens misceatur oleo, quod quiete et calore rancidum fit. Vterque itaque humor putrescens motus inflammatorii necessitatem parit.

§. 37.

Fit vero obstructio et inflammatio in ipsis arteriis, quae sanguinem vehunt, si illarum fines nimium arctantur. Hoc incidit, si a rebus externis, tumoribus varii generis *, fractis luxatisque, aliisque duris et ponderosis, corpus prae grauantibus, etiam huius ponderis in vario super duris cubitu, a telis aliisque corpori infixis, sanguine etiam, qui in vexatis e vasis effluxit et aliqua parte haeret, arteriae premuntur. Arteriae etiam quandoque nimium elongantur, vel spasmo contrahuntur, quod ultimum incidit, quando acria, frigida, valde calida et adurentia corpori, imprimis nervosis eius sedibus, admouentur. Rarius arteriarum tunicae, quae etiam et vasa et contextum cellulosum habent **, ita intumescunt, ut mananti humori iter claudant ***.

* BOERHAAVE Aphor. 112.

** GORTER Comp. Tr. XIX, n. 41. p. 76.

*** In vase maiori s. aorta, vid. STENTZEL de Steatom. in aorta.

§. 38.

Arteriae etiam obturantur in omni vulnere. Ex fauciatâ enim arteria humor effluit, quod profluuium contracta obturataque arteria sistitur. In vexatis, collisis, ambustis vasa ita laesa sunt, ut defecta omni elastica et vitali virtute sanguinem promouere nequeant. Si vero in arteriarum finibus obstructio fit, premitur sanguis

sanguis in minores laterales. Hoc etiam ex contraria causa incidit, si omnis in his renixus sublatus est. Recipiunt enim sic laxiora oscula humorem, quem trahere nequeunt, et oritur in his etiam obstructio ac inflammatio.

§. 39.

Etiam humor densatur et obstructionem ac inflammationem parit, id quod etiam a causis sibi contrariis fieriprehendimus. Sanguis enim, si vel nimium calescit, vel refrigescit, crassus fit, in quo uorum albo similis est. Si is quiescit, mox cogitur, id quod in omni sanguine, qui ex bene valentis vena missus est, cognoscimus. Etiam quiescit in omni vulnere, quippe qui aere externo densatus inhaerescit arteriarum fauciatarum extremis.

§. 40.

Ast is etiam cogitur valentiori et perniciosiori motu, quo calor in corpore viuo increfcit. Ideo, si inflammatoria febre laboranti sanguis mittitur, non solum rubicundus celerius in cruorem cogitur, sed huic etiam inhaeret subalbidum, glutinosum, tenax coagulum, quod oritur a lymphâ nimio aestu densata. Quo maior in inflammatione aestus vehementiorque febris, eo magis haec *διάθεσις φλογισικὴ* extimescenda. Calore praeterea aquosa difflantur, relictis terrestribus, crassis et glutinosis.

† De crusta inflammatoria sanguinis multa disseruit ANTON. DE HAEN in *Ratione medendi in nosocomio practico* etc. vid. etiam HENR. PALMAT. LEVELING *Disquisitio crustae inflammatoriae* etc. Aügustae Vindelic. 1772. nec non FRANC. JOSEPH. KRAVS *Dissertatio de natura crustae inflammatoriae* etc. Pragae 1773.

§. 41.

Sanguinem etiam et lympham cogit alcohol exterius admotum, ipse etiam ignis, vt et frigus, nec non
B 2 acetum

acetum aliaque, quae frigida dicuntur, inter quae omnia, quae ex plumbo parantur, Lithargyrium, Cerussa etc.

§. 42.

Nocet ob hanc causam etiam nimia sanguinis copia, quae eum libere moueri haud sinit. Crassius lentusque est in aliis morbis, scorbuto, cacochymia, et si multo sudore, alui profluuiio, urinae excretionem, ptyalismo etc. blandum aquosum euaporatur et educitur, crassum relinquitur, id quod aliquando ex morbo fit, aliquando ex medicatione et nimia exercitatione.

§. 43.

Nimio tamen et perniciosiori motu, siue hunc cieant externa, frictio, exercitatio, siue interna e. g. febris, sanguis in oscula lymphaticorum cogitur. Hoc etiam fit, si eius particulae iusto minores sunt, et vel intestino aliquo motu v. g. in malignis, vel nimio attritu plus iusto attenuatae. In tali sanguine etiam plerumque acrimonia est vel alcalescens, vel alia maligna, tomentum minimorum vasculorum rodens. Quare in malignis, quamuis sanguis nec post mortem cogatur, frequens est inflammatio.

§. 44.

Inter inflammationis causas etiam non omitti debet robur partium solidarum, tum illud vitale (31), tum alterum elasticum, quod ab elementorum mistione habent, et quod naturale dici potest. Si enim illa vitalis vis nimium intenditur, id quod in omni musculorum et fibrarum inuita contractione seu in spasmo fieri nemo ignorat, et si partes nimis rigidae sunt, etiam sistitur humorum motus. Quare facilis transitus est ex morbis spasticis in inflammatorios. Vulneribus itaque aliisque noxis partium nervosarum superuenire solet ut plurimum grauis inflammatio; maxime si illa
nimia

nimia constrictio et quae illam efficiunt, haud tolluntur. Acrida itaque, rancida venena, aliaque, quae, siue exterius admota fuerint, siue ingesta, partes neruofas grauiter afficiunt, inflammationem excitant. Corpora vero rigida ex omni inflammatione non parum periclitantur, quia ille rigor impedit, quo minus ea facile discuti possit *.

* HIPPOCR. T. I. p. 560. in Coacis. *Τῶν σωμάτων τὰ γεγυμνασμένα καὶ πυκνὰ θάσσον ὑπὸ τῶν πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονικῶν ἀπόλλυνται τῶν ἀγυμνάζων.*

§. 45.

Si vero in arteriis fibrisque partium nullus renixus est, et defecta vitalis et naturalis illa virtus, obstructio oritur, dum minora vascula aequae ac oscula lateralium distenduntur, quare in confiniis laesionis oritur inflammatio, in media parte putredo. Propter hanc atoniam etiam illas sedes, quae olim inflammatae fuerunt, saepe iterum occupat inflammatio.

§. 46.

Nec omitti debet, frequentius fieri metastases et varias sedes inflammari, in quas impetus morbi eiusque materia a natura conuertitur. Hae inflammationes, quae criticae sunt, diligentem animaduersionem habent necessariam, quia in his omnia reprimentia aliena sunt.

§. 47.

Vel ex iam dictis intelligitur, inflammationis non vnā et simplicem causam esse, sed eam plerumque a plurium consortio enasci. Potest enim aliquid esse in corpore vel aliqua huius sede, quod per se tantum non est, vt inflammationes excitet, sed eam tamen huic magis obnoxiam reddat. Quare plerumque illud pro causa apprehenditur, quod vel prius accidisse, vel plurimum contulisse videtur.

§. 48.

Inflammationis notae sunt quatuor: rubor et tumor cum calore et dolore. Ruborem facit sanguis, qui minora et lympham vehementia vasa implet. Tumor oritur, quia minores arteriae ab intus haerente sanguine et ab impetu irruentis distenduntur. Calor ab attritu est. Quo maior enim in corpore nostro est motus, et ex hoc attritus, eo maior est aestus, vel in vniuerso corpore, vel in aliqua eius sede. A quiete vero frigus. Si pars inflammata multum rubet, in illa multus calor est. Dolor oritur a nervis, qui a vasis sanguine confertis distenduntur. Accedit etiam spastica nervorum et fibrarum in parte inflammata contractio. Dolor *σφυγμώδης* est, seu qui omni momento, quo arteriae in diastole sunt, exacerbatur, quia eo tempore maior sanguinis vis ad partem inflammata apprimitur, quo nervi magis intenduntur.

† *Inflammationem doloris expertem esse nonnunquam differit in singulari Dissertatione PHILIP. ADOLPH. BOEHMER. Hallae 1772. Neque notae illae quatuor in partibus interioribus aut alte sub carnibus conditis, si illae laborant, reperiuntur; inflammationem tamen tum subesse dolor sedem non mutans et febris inflammatoria cum symptomatibus suis monstrant. Sed etiam hoc fit, ut febris inflammationem concomitans non inflammatoria sit, sed vel catarrhalis vel erysipelatodes vel putrida. Hanc differentiam aut ex causis aut symptomatibus cognoscimus. Ei autem accommodanda est curatio, quae vniuerso corpori sit.*

§. 49.

Omnes etiam, qui inflammatione laborant, febri-
citant. Prout autem febrium plures corpori praesidio sunt, ita etiam febris in omni inflammatione necessaria est, quae sine ea esse nequit. Certus vero eius modus esse debet: quare illud curandum est medentibus, ut febris talis sit, quae inflammationem haud peiorem faciat; nec minus videndum, ne illa prorsus desinat. Si enim febris nimium vrget, aeger gan-
graena

graena periclitatur, si illa nimium et sine integritate remittit, scirrho et vlcere. Febris etiam valde tenuata non raro in lentam et hecticam degenerat.

§. 50.

Febri vero huic, quam vulnerariam vel symptomaticam nominant, alia quoque mala accedunt, horror et ex horrore calor, sitis, inquires. Febris cum inflammatione soluitur et plerumque multo sudore finitur. Urina etiam crassa est, et ex qua multa desidunt. Adversus tumorum, vulnerum, vlcerum inflammationem auxilium in suppuratione est. Si vero febris subito sine bonis signis conquiescit, inflammatio in alium morbum mutatur (48. 50.).

§. 51.

Grauiora vero febris pericula sunt, vbi illa (48. 50.) increfcunt et alia signa peiora accedunt. Si vltima aegro infirmitas est, nulla requies, sed vigilia, delirium, vel sopor noctu atque interdium continuus, spirandi difficultas, aestus et sudor non per totum corpus aequalis, vel sudor frigidus, vrina cruda, fulua et tenuis, aluus liquida, illaque nigra, et cui magna odoris foeditas accedit, neruorum distentio, quae vltima, si incidunt, mortis futurae indicia sunt.

§. 52.

Inflammatio varium exitum habet. Nam quiescens humor vel resoluitur, vel orta suppuratione in pus vertitur, vel inflammatio degenerat in gangraenam et scirrhum. Ex gangraena facilis transitus est in sphacelum, ex scirrho in cancerum. Si vulnus et abscessus male cedunt, aut non recte et negligenter curantur, ex iis vlcus oritur, ex vlcere fistula.

§. 53.

Sine vlla noxa inflammatio tollitur, si illa resoluitur. Hoc fieri potest, si quiescens et obstructionem

efficiens humor, aucta illa vitali cordis et neruorum actione, et a sanguine a tergo veniente commotus iterum abripitur, et mobilis redditus circumeuntibus humoribus admiscetur. Haec curatio locum habet si parum humoris quiescit, inflammatio nec magna nec profunda est, si vasa nondum rupta sunt, si ipse humor malus putrisque non est, nec vasa erodit. Si sanguis aliquantum, ast non nimis vehementer agitur, nec febris ingentem feruorem habet. Si praeterea ipsa pars inflammata, nec nimium rigida est et contracta, nec laxa et soluta.

† Inflammatio aliquando etiam e loco in locum remotum migrat, modo sine grauiori noxa modo cum periculo, sc. si locum quendam nobiliorem petit.

§. 54.

Ad suppurationem spectat inflammatio, si sanguis, qui malus non est, ex ruptis arteriis iam emissus coit. Is enim extra vasa quiescens vitali motu in pus vertitur, id quod fit, dum globuli illi rubicundi, qui in sanguine sunt, vario, externo et intestino motu, ipsoque calore rumpuntur, et in subalbidum humorem vertuntur. Pus ob hanc causam albidum est, crassum vero, quia calore densatur. Pus vero non ex solo quiescente humore oritur, sed etiam ex partibus solidis. Nam quae iuxta sunt etiam suppuratione liquecunt et purificantur.

† De generatione puris nonnulla proposuit DE HAEN l. c. Putat, pus non in abscessu gigni sed in sanguinis flumine parari, et in loco affecto tantum secerni, eiusque materiam esse in crusta inflammatoria reperiendam. Verum haec perspicue falsa sunt. Etenim pus et laudabile et illaudabile sere saepius in abscessibus vlceribusque diutius pus plorantibus gignitur, quamuis nulla inflammatoriae crustae nota in sanguine existat. Et ex leuioribus inflammationibus partium idem non raro fit.

§. 55.

§. 55.

Gangraena vero occupat, si humor quiescens malus est, et omnis corporis succus vitiat, qualis a venenato vulnere, vel a maligna febre, esse solet. Si quiescens sanguis penitus infedit, obstructio magna et profunda est, febris autem et alia symptomata valde urgent. Si causa, ex qua obstructio orta fuit, tolli haud potest. Si inflammatio magna est et vehemens, si ea nervosas sedes occupat, et dolor acrior vrensque aegrum vexat. Si accedunt quaedam, siue externa, siue alia, quae in ipso corpore fiunt, quibus pars, quam inflammatio tenet, grauiter afficitur. Si sanguis nimium cietur, si ipsa pars aliqua re premitur, si superhabentur adstringentia, reprimentia, frigida, pingua, anodyna. Si febris nimium incenditur. Si humoris, qui ex ruptis vulneratisque vasis exiit, maior vis est, quam vt his vitalibus motibus digeri satis et in pus verti possit. Id quod etiam accidit, si cruor aliussue humor in cauum quoddam effluxit, et haud euocari potest. Humor enim quiescens, accedente corporis, eoque aucto, calore, putrescit, putredo vero in partes iuxta sitas, quae integrae sunt, transit: Inter quae febris oritur, ex qua iterum gangraena increfcit. Hoc etiam in maioribus abscessibus fit, si altius malum est, nec pus per se aperitur, nec scalpelli opera euocatur. Vitiatur enim et corrumpitur illud, et ex eo vel gangraena, vel vlcus ac fistula, oritur.

§. 56.

Ex quibus et supra dictis (36) intelligitur, cur nulla pars gangraenae adeo obnoxia sit, quam tunica adiposa, quae frequentissima huius vitii sedes est. Ruptis enim et exesis vasculis humor cum oleo remixtus corrumpitur, putredo serpit, et, quia ex corrupta materia crassum desidit, fluidum sub epidermide coit, haec in

vesiculas illo humore plenas leuatur. Quiescit in affecta parte omnis dolor, peritque sensus, tumor minuitur, color vero ex rubro in pallidum et liuidum mutatur, putredine interea ultra procedente.

§. 57.

Ex gangraena sphacelus oritur, si membrum penitus ad os usque emortuum et sine omni sensu motusque est *. Putredinem aliquando sine inflammatione oriri, infra videbimus.

* Motus intelligitur, quem praestant muscoli sphacelo affecti.

§. 58.

Si vero, id quod crebrius in glandulis fit, inflammatus locus parumper detumescit, et ex quiescente id, quod fluidum est ac mobile, euaporatur, vel per naturalia emissaria excernitur atque diffatur, crassum vero et terrestre magis compingitur, concrescit et penitus cohaeret, manet tumor durus ac renitens, haud dolens, quem scirrhum vocamus.

§. 59.

Scirrhum itaque pariunt omnes humores, qui in variis glandulis partibusque et visceribus glandulosis sunt, lac in mammis, saliu et lympa in glandulis hos succos secernentibus, semen in testibus. Hi humores enim in duritiem coguntur ex variis et sibi contrariis causis. Nimirum quiete, si in tali inflammatione febris sine integritate conquiescit, vel, id quod crebrius fit, medicatione intempestiue nimiumque tenuatur, tumor vero manet. Nimio etiam motu et aucta febre humores valde compinguntur, id quod incidit, si calidiora et aestum augmentia intus sumuntur, vel si exterius ipsa pars inflammata premitur, fricatur, vexatur, vel nimio siccoque calore adficitur. Idem accidit, superhabitis coagulantibus, spirituosiss, refrigerantibus, quibus omnibus humores magis densantur. Si vulnus
in

in parte glandulosa est, his adhibitis, non pus melioris generis exit, sed humor tenuis, qui ipsum vulnus erodit, quod sic in vlcus mutatur.

§. 60.

Quae vero spem vel periculum ostendunt in inflammatione, haec sunt:

- 1) Aetas, vires, temperies aegri, morbus praegressus, et totius corporis habitus.
- 2) Pars, quam infestat inflammatio, si illa ad vitam necessaria est, eiusque natura, si vel nervosa est, vel glandulosa, vel carnosa. Multum etiam interest, qualis humor ad inflammata permanet.
- 3) Magnitudo inflammationis, si illa intus tendit, multum et subito procedit et vehementer vrget, nec non eius symptomata.
- 4) Causae. Nam grauis morbi periculum est, si inflammatio a malo corporis habitu, vitioque humorum, nec non ex veneno, vel dato, vel exterius corpori illato, nascitur.

§. 61.

Qui igitur inflammatis mederi vult, variam adhibere debet curationem. Nam non omnia auxilia omnibus conueniunt, et ea, quae nascenti inflammationi opportuna sunt, aliena sunt, si illa iam adoleuit. Inflammationis etiam minor impetus minus acrem curationem requirit. Aliam quoque postulant sedes nervosae, et quibus exquisitior sensus est. Semper eo enitendum est Chirurgo, vt inflammationem reprimat atque resoluat, vel, si resoluendi nulla spes est, vt humorem digerat, molliat et pus moueat, vtque gangraenae scirrhiue periculum auertat.

§. 62.

Ab initio vero et ante omnia remoueri oportet causas, ex quibus inflammatio coepit, si illae in aperto sunt.

sunt. Post auertendus nimius sanguinis aditus est, in quod fit sanguinis detractio, eaque repetita. Hanc si inflammationis timor est, quam primum fieri oportet. Mittendus vero sanguis est quam longissime inde, ubi est inflammatio. Si vero humoris maior vis iam in aliqua parte coit, mittendus est ex ea ipsa parte, aut ea, quae proxima est, ut affectus locus exhauriatur. Quia vero usus ostendit, sanguinem, incisa vena ex vltioribus partibus sequi, confert, ne is in id ipsum, quod grauatum est, euocetur trahaturque, eum iterum, et quidem ex distanti vena, detrahere. Etiam remotis partibus imponi possunt cucurbitulae, vel integra vel concisa ante scalpello cute. Nec minus frictione, non vehementi, sed leni, euocatur sanguis ex partibus inflammatis, si, cum aliud dolet, aliud perfri- catur. Id quod etiam efficitur, si super remotas partes imponuntur, quae adurunt, sinapi, ranunculus, pyrethrum. Videndum tamen, ne, dum his sanguinem ab inflammatis euocare volumus, eum nimis vehementer agitemus et febrem incitemus. Nec utendum cantharidibus. His enim impositis, virus additur humoribus, quod teneriora vascula laedere, atque inflammationem maxime in nobilioribus partibus, augere potest.

† Inflammationis paulo post futurae aut incipientis vehementiam minuit etiam tempestiue datum opium scilicet tum cum a nimio dolore parti affectae metuimus. Peritus autem medicus, etiam non admonitus, intelligit, ante usum opii sanguinem mitti aliumque solui oportere.

§. 63.

Aluus etiam duci potest per data cathartica, quae lenissima esse debent et ἀντιφλογιστικά, satis tamen valentia. Aliena sunt resinosa, tutiora vero, quae ex tamarindis, manna, uvis passis Corinthiensibus, cremore tartari, sale cathartico, magnesia alba parantur.

Opti-

Optimae etiam sunt lotiones mollientes in aluum immiffae.

† Alui solutio maxime necessaria est, et repetenda quoque, quandocunque primarum viarum vitia subesse videntur, quod saepius quidem fieri consuevit, si qua pars interior affecta est inflammataque. Ipsa emetica tempestive adhibita opem tum, cum ventriculi vitia subsunt, praestant.

§. 64.

Adhibenda sunt, quae aestum infringunt, succi acidi fructuum horaeorum, liquores ex aceto, melle et aqua compositi, serum lactis dulce, vel acidulum, ptisana ex hordeo, nitro et succo citri, quae copiosa praebenda est, ut aeger etiam illam ultra satietatem bibat, quia et aestum infringit, et humores diluit. Misceri potest nitrum cum terrestribus. Cum aqua etiam contundi possunt semen papaveris, semina sic dicta frigida, amygdalae, pineae, et liquori expresso nitrum adiici. Maximum vero praesidium a victus ratione petendum et abstinentia utendum. Necessaria etiam est quies. Summum periculum oriri potest, si quidam mali affectus interueniunt, et aeger animo laborat. Eius itaque notitiae omnia subtrahi debent, quae animum exasperatura sunt. Nocet et nimius calor et frigus. Nimius aestus fere pestilentior est frigore.

§. 65.

Si vero inflammationis incrementum iam consistit, medentis consilium eo dirigi debet, ut tumor discutatur. Eum itaque oportet febrem moderari, non nimium minuere, ne corpus exinanatur, viresque convellantur: Solui potest inflammatio, si ea nec grauis, nec profunda est, tumor non valde durus, sed aequaliter mollis, in latum diffusus, nec febris admodum vehemens, et si aeger ab initio non valde inhorruit. Conf. (60.)

§. 66.

§. 66.

Si vero ad resolutionem dirigenda est curatio, praesunt diluentia, quibus nouus humor quiescenti additur, illeque mobilis redditur. Si coctionis signa apparent et cutis relaxatur, corpus madescit, quae sudorem venturum esse testantur, vtendum maxime sorbitionibus est, et aqua calida cum radicibus herbisque resoluentibus. Eo tempore oportet aegrum continere, nunquam vero illum multis stragulis vel vestimentis strangulare, sed admodum leuibus tantum velare, et cauere, ne eum frigus adspiret. Si magis se inclinauit inflammatio, paulo efficaciora danda sunt vbi nec sic dictae Essentiae resoluentes alienae sunt.

§. 67.

Optimum medicamentum est victus. Quamdiu inflammatio increscit, cibis vel nullus dandus est, vel talis, qui non nutrit, sed sustinet. Omnis enim nocet, qui febrem incitat. Potioni vero aptissima est ptisana. Cibus sit ex imbecillissima materia, ex fructibus horaeis siccatis, prunis Damascenis, pomis, cerasis, aliisque vegetabilibus, acidum succum habentibus. Ex aqua coqui possunt oryza, auena decorticata, hordeum, additis vuis Corinthiacis et adiecto succo aciduli Punici mali. Aliena sunt valentiora, iurulenta, et quae multumimenti praestant. In decessione vero morbi, ne vis omnis corpori desit, cibus paulo plenior, et vini meracioris aliquid dari potest.

§. 68.

Sunt aliae quaedam obseruationes in inflammatione necessariae. Si inflammatio metuenda est, quamprimum, nisi magnopere res aliqua impediat, sanguis mittendus est. Demitur enim inflammationi materia, illaque sic saepe auertitur. Si aeger robustus est, laetio vero magna, multum sanguinis detrahendum, nec adeo

ideo metuenda imbecillitas est. Satius tamen est, sanguinis missionem diuidere, quam simul omnem humorem atque vim effundere. Aptissimi autem sunt primus dies et secundus. Sera vero, et, quae post tertium diem fit, sanguinis missio, vix vnquam utilis est, qua aeger imbecillus redditur et resolutio turbatur.

† Potest sanguinis missio post tertium etiam diem necessaria esse, si vel resolutionis spes decollat, sc. ne gangraena fiat.

§. 69.

Quod ad medicamenta pertinet, iuuenes sanguine pleni optime ferunt succos acidos vegetabiles, siccioribus vero melancholicorum senuumque corporibus conuenit nitrum. Si aliud vitium in corpore est, cacochymia, scorbutus, lues venerea, et his accommodanda medendi ratio est. Si morbus mutatur, et vel grauior, vel leuior fit, mutanda saepe sunt medicamenta, nunquam vero subito ab vno genere ad alterum transeundum est. Omnibus, maxime, quibus nobiliores neruosaque partes inflammantur, venus perniciosissima est. Si post grauiorem acutamque febrem, et in ipsa eius decessione, facta μετασάσει, quaedam per se intumescunt, et sanguinis missio, et alui ductio, nimiaeque abstinentia perniciose sunt. Augenda potius est per contraria inflammatio, cum, si illa discutitur, recidivae timor sit. Si igitur locus opportunus est, enitendum, vt coitus malae materiae fiat, illaque mature scat.

§. 70.

Accidere potest, vt in maiori malo maior sit vitium imbecillitas, si aeger graui sanguinis profluvio exhaustus, aetate, inedia, alioque morbo confectus est. Tunc cum febricula tenet, ast pro modo ipsius noxae non satis valens. In hoc casu circumspecti Medici est, vires reuocare et febrem augere. Minime etiam in hoc

hoc casu vtile, sanguinem mitti, aluum duci, vel in-
ediam imperari; nec refrigerantia profunt. Danda
sunt, quae vires reficiant, iuscula carniū iuniorum,
vinum meracius et ex hoc intrita cum saccharo et ci-
namomo. Ex medicamentis prima sunt cardiaca, ex
cinamomo, caryophyllis, nuce myristica, horumque
olea, inprimis alcohol soluta, seu balsama vitae, tinctu-
rae bezoardicae, alexipharmacae.

§. 71.

Praeuisis vero, quae ad vniuersam inflammationem
et huius curationem per victum et data medicamenta
pertinent, veniendum est ad eam, quae externas sedes
occupat, et ad medicamenta, quae exterius superdari
possunt. Duo vero inflammationis modi sunt, qui
etiam diuersam curationem requirunt, Phlegmone et:
Abscessus. Addunt Erysipelas, de quo supra (33).

P H L E G M O N E.

§. 72.

Phlegmone omnem inflammationem, saepe tamen
eam significat, quae externas corporis sedes infe-
stat. Est tumor cum inflammatione, latus, profundus,
aequalis, et qui potissimum adipem occupat.

§. 73.

Differt ab erysipelate, quod sine altitudine latum
est, et in sola cute consistit. Erysipelas etiam serpit
cum calore et rubore, sanescente eo, quod primum
vitiatum erat, phlegmone autem magis nocenter ado-
lescit, altius descendit, et latius intumescit. Maior in
phlegmone symptomatum acerbitas est. Differt ab
abscessu. Si enim inflammatio ad suppurationem spe-
ctat, tumor non ita aequalis est, sed profundus, et qui
in medio maiorem duritiem habet.

§. 74.

§. 74.

Oritur ab omnibus, quae obstructionem inferunt (35. ad 47). Superuenire solet frequentius vulneribus, vexatis, fractis. Aliquando ex febre oritur, et concurrente post eam morbi materia (46).

§. 75.

In hoc inflammationis genere negotium periculumque maius est, quam in erysipelate et abscessu. Facile enim transit in gangraenam. Ex omnibus signis et aegri proprietatibus (60) colligitur, num is sine periculo euasurus sit.

§. 76.

Omni opera enitendum, ut inflammatio discutatur (53). Quare quam primum auxilium petendum est ab iis, quae supra (62. ad 70.) praecepimus. Si vero ad ea veniendum, quae exterius inflammatis imponi debent, et haec variis temporibus accommodanda sunt. Concurrentis humoris aditum mox ab initio auertunt reprimentia. Remotis enim ante omnia, si fieri potest, causis, aliquando confert corpori vel perctus, vel, ubi ex alto decidit, colliso, frigidum ferrum aliudue durum corpus apprimere. Filo etiam supra noxam iniecto membrum deligari potest, non tamen nimis vehementer, ne torpeat, quia ipsa re impeditur, ne illud adeo intumescat: id quod maxime obseruari decet, si serpentium aliorumque venenatorum morsus non nimium distantem curationem desiderat. Sunt, qui membrum pellicula inuoluunt, quae in ovo est, quae in aëre ficcata, illud etiam valentius adstringitur. Superdari in maiori malo possunt epithemata ex aceto et aqua expressa, in quibus alumen, sal marinus, sal ammoniacus soluta fuere. Reprimunt etiam et his adici possunt omnia ex plumbo parata, cerussa, litharyrium, saccharum saturni: ex vegetabilibus adstringentia

gentia, radix bistortae, tormentillae, filipendulae, acori adulterini, herba alchimillae, equiseti, millefolii, herniariae, hederæ terrestres, pentaphylli, faniculæ, virgæ aureæ; flor. rosarum rubr. balaustiorum, hyperici, gallæ, cupulæ glandium, malicorium, cortices quercus, fraxini, musci varii generis, quibus, ex aqua cum aceto vel vino austero decoctis, addi possunt dicti sales. Emplastra, quæ vulgo hic laudantur, defensionis minoris efficaciae, et vix minori malo opportuna sunt. His admisceri potest camphora.

† Epithemata frigida maxime tum profunt, cum a grauiori ictu capiti illato metus est, ne partes encephali inflammatione corripiantur; tum quoque, cum articulorum vulnera metum incutiunt, ne a concurrente humore mala vlcera, nimium madentia illa fiunt. De his legantur SCHMUCKERI viri peritissimi *Observationes chirurgicae* (Joh. Lebrecht Schmuckers *chirurgische Wahrnehmungen*). Maxime autem frigida et reprimentia necessaria sunt, si a futura inflammatione partibus nobilioribus tanquam oculis grauior noxa imminet.

†† Nobilem aquam traumaticam cum medicis communicauit THEDENIVS, de qua vid. eius *Observationes nouae chirurgicae dicatae* (*Neue Beobachtungen für Wundärzte*) vid. etiam *Pharmacia rationalis. Cassellis, 1782. iterum edita.*

§. 77.

Haec vero ita superdari oportet, vt nec calor, nec frigus locum irriter. Nec conueniunt, nisi a primis initiis, et antequam membrum prorsus intumuit. Si enim humor iam coit, illa nocent. Tunc enim commodius est, tumorem vel resolui, vel maturari atque aperiri. Vtrumque non sinunt reprimentia, quæ in tali casu faciunt, vt indurescat locus et vt obstructio pertinacior fiat. Nec super glandularum tumores vtendum est reprimentibus et refrigerantibus. Si vero glandularum inflammatio nimis nocenter et ita increfcit, vt gangraenæ timor sit, circa tumorem ea possunt membro superdari, non vero ipsi tumori imponi, id quod etiam in phlegmones et abscessus curatione fieri potest. Magis ista aliena sunt in inflammatione

matione, quae ex vulnere nascitur, quod virus habet. Maxime vero in tumoribus ex febre maligna per *μετά-
στασιν* ortis. Crebrius haec medicamenta mutanda sunt. Nam si diutius superhabentur, eorum vis effoeta redditur. Sanguinem mitti, aliumque lotionibus duci, ad hanc curationem, quae per reprimentia fit, non tam commodum, quam necessarium est.

§. 78.

Membrum inflammatum continendum est, et ita collocandum, ut a nulla re offendatur, utque nec moveatur, nec dependeat. Sine quiete inflammata aegrius curantur. Si epithemata superhabentur, illa nocentissima esse possunt, si nimium madent, calor vero moderatus fit.

§. 79.

Vbi autem inflammatio adoleuit, illaque plane membrum tenet (65), Chirurghi cura esse debet, ut illam resoluat. Praeter ea, quae supra (66. ad 70.) praecepimus, imponi debent medicamenta, quae quiescentes tumores attenuant, et resoluentia vel discutientia vocantur. Si inflammatio non magna, nec profunda est, opitulari possunt spirituosa, et ex his spiritus vini camphoratus, cui addi potest essentia croci, nec non sacculi ex resoluentibus parati, vel sicci, vel ex calido vino expressi. Aduersus vehementiorem vero inflammationem auxilium est in epithematis, quorum compositiones et misturae variae sunt. Fiunt enim ex vegetabilibus amaris, ex quibus fere prima sunt: radix angelicae, aristolochiae, bryoniae, imperatoriae, ireos florentinae, herba abrotani, absinthii, agrimoniae, betonicae, maioranae, marrubii, menthae, origani, pulegii, roris marini, rutae, sabinae, salviae, scordii, serpilli, tanacetii, flor. sambuci, chamomillae, laeundulae.

§. 80.

Haec res vero eam prudentiam exigit, vt, si locus, qui inflammatus est, valde rigidus fiat et durus, haec epithemata ex aqua coquantur, iisque quaedam ex mollientibus adiciantur, id quod fere necessarium, si corpus valde adstrictum est. Si vero tumor iusto mollior est, et nihilominus inflammatio vehemens, et in corporibus, in quibus phlegma abundat, aliena sunt mollientia, necessaria vero, quae adstringunt et roborant (76). Ob hanc causam, antequam epithemata imponuntur, lauari potest locus vino adusto, spiritu matricali, spiritu vini cum camphora. Epithemata coquantur ex vino austero, vel adiciatur iis acetum, nitrum, sal ammoniacus. Haec vltima etiam aduersus putredinem sunt, quorum vis multum augetur, si, priusquam superdantur, cutis paululum conciditur. Hoc necessarium est, si inflammatio iam ad gangraenam spectat, et locus iusto mollior est.

§. 81.

Si inflammatio se inclinare coepit, tumor cum integritate resedit, isque nec durus est, nec mollis, et color etiam in naturalem conuertitur (66), magis vtendum est roborantibus, quae fibrarum laxatarum imbecillitati opitulantur. Si, inflammatione prorsus leuata, membro quaedam imbecillitas manet, confert ei subinde infriktionem adhibere, illudque ex spiritu quodam perfricare. Aptissimus est spiritus serpilli, lauendulae, iuniperi, formicarum, et ex compositionibus matricalis. Alternis etiam vicibus imponi possunt emplastra, et inter haec potissimum, neruinum et oxycroceum. Confert etiam, quando quies non ita necessaria est (78), vt membrum iterum ad suos vsus promoueatur. Aliquando infirmis optime medetur fascia, qua fibrae modice adstringuntur.

§. 82.

§. 82.

Si vero inflammatio pro magnitudine noxae minor est, confert locum perfricare et super illum iniicere cataplasmata ex resoluentibus et emollientibus, vel emplastra, quae molliunt et digerunt, inter quae diachylon compositum primum est. De his infra, ubi de gangraena agetur, dicendum.

§. 83.

Nocent, si inflammatis admouentur, olea destillata, vnguenta, opiata. Si magnis vulneribus superuenit inflammatio, pus mouendum est; si autem vulnus est in parte nervosa, incidendum est, donec satis pateat, sine quo inflammatio curari nequit. Si ab emoto osse orta fuit, non prius, quam illo reposito, leuatur. Medicamenta celerius imponenda sunt, cum frigus et aer non parum offendere possint inflammata.

A B S C E S S V S.

§. 84.

Vbi autem nimis valenter retenta materia est, illa in pus vertitur (54). Suppurationem vero futuram esse, intelligitur, si inflammatio non ita valida est, ac esse solet, si illa ad gangraenam spectat, si febris, quamvis tenuata, cum dolore, calore omnibusque symptomatis permanet, et si omnia illa auxilia, quae supra praecepimus (61. ad 81.), nihil proficiunt. Si decrescente febre ex vrina nihil desidit. Si tumor rotundus profundusque ab initio cum duritie ac rubore adolefcit. Si aeger grauitatem tumoris sentit. Si etiam dolor cum siti, vigilia aliisque symptomatis increfcit.

§. 85.

Oriente vero pure, iterum inhorret aeger, horroris tamen incerta tempora sunt. Summus tumor mol-

lescit et rubor in album mutatur. Vbi iam in tumore humor subest, ille digito parumper cedit, circumfluenſque id, quod non premitur, attollit, quo tempore etiam dolor se aliquantum remittit, grauitas vero augetur. Quamdiu enim humoris magna pars in vasis haeret, tumor durus est et renitens, quam primum vero is ex iis exiit coitque, leuatur inflammatio et tumor mollescit.

§. 86.

Aliquando tamen in penitus condita suppuratione, et si altius pus mouetur, nihil horum in cute deprehendi potest. Sentit tamen aeger cum febre, siti, vigilia aliisque symptomatis intus aliquas punctiones, et locus prurit, tandemque subliuidus aut subalbidus fit.

§. 87.

Hoc inflammationis genus, nisi valde magnum sit, et partem aliquam nobilem occupet, non ita periculosum est. Magnae tamen et longae suppurationes, quia mala materia aliis corporis succis admiscetur, saepe cacochymiam, phthisin et hecticam relinquunt, id quod accidere etiam potest, si ex abscessu pus non iusto tempore emittitur, vel si ipsa suppuratio cohibetur. Hoc, impositis reprimentibus, spirituosius fieri, et si sub curatione locus valentius fasciis adstringitur, pannisque premitur, infra, vbi de vulneribus agetur, docebo.

§. 88.

Aliquando, si in vrina purulentum, laeue ac album subsidit, abscessus soluitur, id quod tamen rarius fieri compertum est.

§. 89.

Si iam tumor ita adoleuit, vt pus alat, aliena sunt reprimentia, discutientia et spirituosia, quippe quae eum in scirrhum vertunt. Si chirurgus non certa
resolu-

resolutionis spes est, ab initio imponere potest, quae utramque facultatem habent, et resoluendi et molliendi. Igitur ex remixtis inter se resoluentibus ac emollientibus parari possunt cataplasmata, vel imponi supra commemorata emplastra mollientia.

§. 90.

Quod vero his non discutitur, necesse est, ut mature scat. Si autem, id quod crebrius incidit, protumoris magnitudine minus valida est inflammatio febrisque leuior, maiori vi opus est. Incitare itaque oportet febrem, quo in casu fere optimum est, nulla medicamenta dare. Aliena est sanguinis missio, alui ductio, et omne, quod aestum infringit. Adhibenda est exercitatio, loci inflammati fricatio, cibus plenior, potio etiam liberalis, et quae valentioris generis est.

§. 91.

Tumori imponenda sunt, quae pus mouent, in quibus aliquod discrimen est. Sunt enim quaedam, quae tantum molliunt, fibrasque laxant, et expirationem ex cute cohibent. Ex his prima sunt radix altheae, maluae, liliorum alborum, herba altheae, malvae, brancae vrsinae, meliloti, mercurialis, parietariae, verbasci, violarum, flores chamomillae, meliloti, verbasci, semen lini, foenu graeci, psyllii, sesami, omnis generis farinae. Praeter haec olea blanda, liliorum alborum, verbasci, lini, axungia et butyrum, oui vitellus, quae vltima non rancida esse debent, sed recentia. Fiunt ex his cataplasmata. Expeditissimum etiam est, quod paratur ex simila, vel pane similagineo, semine lini, confusis, quibus ex lacte coctis oleum liliorum alborum adiicitur. Et cataplasmata nocent, si hument et frigescent. Emolliunt etiam emplastra, de melilotto, malacticum, de ammoniaco, diachylon simplex. Emplastra emolliendis tumoribus valde idonea sunt.

§. 92.

Alterum genus medicamentorum est, quod maturationem iuuat, dum puris concurrentis internum motum auget, et facit vt colliquescat. Haec vel emollientibus misceri possunt, vel summo tumori imponi, superdatis istis emollientibus. Ad mouendum itaque concoquendumque pus maxime possunt cepae vstulae, allium, caricae pingues, sapo, mel, fermentum panis, panis domesticus masticatus et saliuā subactus, gummi ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium, quae potentiora sunt, si aceto soluuntur, et aliis admiscantur *. Ex compositionibus praecipuum est emplastrum diachylon compositum.

* Si gummi soluuntur vitello oui, ad mollienda, quae dura sunt, magis valent,

§. 93.

Haec vero conueniunt in minori inflammatione, et si febris pauca et mediocris est. Si vero vtriusque maior impetus est, atque sanguis malus, qualis in malignis esse solet, vltimum genus medicamentorum, omniaque emplastra aliena sunt, et sola emollientia proficiunt, quibus acetum adiici potest, quo putredo auertitur. Circa tumorem imponantur (76. 77.) obseruatis (78).

§. 94.

Si tumor induruit, inflammatio vero et febris se plane remiserunt, id quod accidit, si alius chirurgus refrigerantia, reprimentia, spirituosa superhabuit, vel si euacuantibus omnem calorem motumque infregit, primum genus medicamentorum (91) ad concoquendum pus magis valet: Quae vero curatio saepe longa esse solet. Pus ex his tandem victis plerumque pallidum, liuidum, sero simile, ac faeculentum effunditur.

§. 95.

§. 95.

Pus maturuisse, ex notis (84. 85. 86.) colligitur. Illud, si altius non est, per se aperitur, vel impositis adurentibus, vel scalpelli opera euocatur.

§. 96.

Plerumque expectanda maturitas est, qua cutis extenuatur, omneque pus in abscessu iungitur. Si enim subcruda aperiuntur, pus multo sanguine remixtum, tenue, dilutum, esse solet, non vero crassum, albidum, laeue, aequale et vnius modi, quod optimum est. Orae incisae plagae intumescunt et inflammantur, vlcus manet, quod aegrius, et non, nisi impositis aliis concoquentibus et pus mouentibus, sanescit. Aer enim, si hoc tempore adspirat, adstringit vasorum disruptorum oscula, quae ideo humorem aegrius dimittunt. Nec tamen hoc perpetuum est. Nam interdum maius malum, quod timetur, requirit, vt ex crudo tumore pus euocetur. Id quod in abscessibus, qui iuxta anum sunt, saepe fieri oportet. Ast non sola festinatio nocet. Nam aequae nocet pus, quod, si maturum est, non educitur. Nam et illud diutius subsidens in saniem vertitur tenuem, liuidam, acrem, et quae proxima atque sana rodendo sinuat. Inde autem vlcera fiunt ac fistulae, et saepe, quia mala materia, si eius maior modus est, sanguini admiscetur, vitiatur totus corporis habitus.

† Pus ex iis abscessibus, qui ad parietes maiorum cauorum corporis sunt, mature emittendum est, ne rupto tumore in cauum effundatur,

§. 97.

Vbi chirurgus medicamentis, quae adurunt atque exedunt, abscessum adaperire vult, ad hoc commodissimus est lapis infernalis, vel lapis causticus chirurgorum. Haud ita opportunum est butyrum antimonii, quod calore liquatur et diffunditur. Alienus est mercurius sublimatus. Si haec admouentur, locus emplastro

stro tegitur, quod in medio foramen habet. Super eutem itaque inter emplastri oras ponitur medicamentum adurens, quod, alio emplastro superdato; pannis et fascia apprimitur. Priusquam imponuntur, cutis humidanda est. Intra aliquot horas adurens medicamentum cutim exest.

§. 98.

Expeditissima vero curatio est, si tumor inciditur, id quod fit scalpello ancipiti maiori. Vbi scalpellus admouetur, altera manu tumor modice comprimendus et pus versus superiora vrgendum, quo illud propius reperiatur. Maior abscessus maiorem plagam desiderat. Scalpellus ita demittitur, ut mero prius etiam oppositam partem incidat, et post acies per summam eutem educatur. Aliquando nondum satis tenuata est adeps, quae igitur profundiores sectionem postulat. Cauendum tamen, ne grandes arterias venasque praecidamus *. Huius rei vero, si pus maturuit, minor metus est, quia illud inter eutem et vasa medium est. Minus aptum est, tumorem non in summa, sed inferiori parte, incidi, id quod nonnulli eam ob causam praeceperunt, ut puri exitus esset. Nam et haec sectio cruda (96) foret.

* Vid. Exemplum in GALENO de Administrat. Anat. L. VIII. c. XIII.

§. 99.

Rupta itaque vel incisa suppuratione, pus exprimi debet. Nil vero magis alienum est, quam, si ea valentius premitur, si in eam immittuntur duriores turundae (20), et si haud modice deligatur, sed adstringitur. His enim tumor durus fit et orae callosae.

† Si magni abscessus aperiendi sunt, proficius est usus setaceorum. Adhibetur autem setaceum sic, ut id a superiori abscessus parte ad inferiorem acu maiori perducatur, et post quotidie versus eandem inferiorem regionem moueatur, noueturque. Sic enim et aer a cauo abscessu arcetur,

et

et pus paulatim effluit, et sanatio breuiori tempore absolvitur. Decrescente puris copia minuenda est setacei crassities. Est autem haec medendi ratio maxime tum utilis, si circa abscessum multus tumor est, vt fere fit, si loco glanduloso diu antequam accessit inflammatio, tumor durus erat. Si altius conditus est abscessus, commoda non videtur haec ratio.

§. 100.

Caetera, quae ad purgandum abscessum, eum implendum, et cicatricem inducendam, conueniunt, infra docenda sunt (v. de vulneribus). Iam etiam medicamenta, quae sanguinem purgant, necessaria sunt. Omnis curatio ad corporis habitum, aetatem, vitae genus, aliosque morbos, quibus aeger laborat, dirigenda est. Perniciosa esse possunt, quae aduersus humorum vitia dari solent, si sanguinem nimis cient. Aliena etiam sunt ab initio purgantia, quia puris exitum cohibent, quae, quando ad inducendam cicatricem ventum est, requiruntur. necessaria est abstinentia. Nam, si cruditas in corpore est, ea etiam in pure deprehenditur, quam facile dignoscit peritus chirurgus *.

* Si aeger se vino vel alia valentiori potione iniurgitauit, vel si concitato animi motu perturbatus fuit, noua oritur inflammatio, siccantur orae, pus tenue fit, acre, rodens. Si se carnibus impleuit, pus lentum est et mucosum.

§. 101.

Si durities, postquam pus effusum est, manet, superhaberi debent emollientia et pus mouentia, ex emplastris diachylon compositum.

FURUNCULVS.

§. 102.

Furunculus est abscessus quoddam genus, quod oritur, si sanguinis parum ex rupta aliqua minori arteria coit, et, quia solui ac mobilis reddi nequit, in pus vertitur. Nam, si plures arteriae rumpuntur, maior

maior puris concurrentis modus est, et fit abscessus. Ex furunculo enim minime multum exit.

§. 103.

Eius notae sunt: tuberculum acutum, valde durum, cum inflammatione et pro modo tumoris vehementissime dolens. Furunculus enim oui dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Manet durities et cum dolore increfcit. Tandem summus tumor inalbefcit, et nascitur pustula, ex qua rupta parum puris crassi, sanguine remixti, exit. Nullum periculum est, etiamsi nulla curatio adhibeatur. Si vero tumor partes neruofas occupat, aut, si plures idem corpus infestant, oportet dolorem leuare. Non a cute, sed ab interioribus partibus incipit, et per se intumescit furunculus vitio in sanguine orto, qui, si crassus, vel glutinosus est, morbum facere videtur.

§. 104.

Si propter doloris vehementiam oportet furunculo curationem adhibere, efficiendum est emollientibus, ut celerius maturefcat atque pus erumpat. Superuacua enim hic scalpelli opera est, cum pus cutim rumpat et per se aperiatur. Superdari itaque possunt emollientia, et quae puri mouendo idonea sunt (91. 92.). Vbi pus expressum est, superhaberi potest emplastrum diachylon compositum, quo duritia, quae plerumque manet, soluitur, et quicquid materiae in vasis haeret, euocatur. Nec aliis medicamentis opus est.

† Ad cicatricem perducere non potest hoc genus abscessus, nisi purgetur libereturque corrupta et tenaci materiae cellulosa et vasculis abscedentibus. Ut haec purgatio fiat, aliquantum et satis quidem comprimendus duobus digitis est maturus prorsus furunculus. Ea materiae, quam Germani *den Eiterstock* vocant, expressa abscessus facile et breui sanatur.

V A R I.

§. 105.

Furunculis fere similes sunt vari, quorum sedes est in glandulis sebaceis MORGAGNI. Nascuntur in facie, etiam, vt videtur, ex crasso, glutinoso et impuro sanguine. Si foeminae eo tempore, quo catamenia fluunt, vescuntur cibis, qui mali succi sunt, nec non, si illis cutis sordescit, quia neglecta munditie, faciem pinguioribus digitis contrectant.

§. 106.

Aduersus eos, maxime si sanguis non tam impurus est, quam glutinosus, proficiunt cucurbitulae concisa cute tergo admotae, nec non aquae minerales. Nocent plerumque cosmetica, prae aliis ea, quae ex mercurio parantur.

† In nonnullis necessaria est curatio, quae fit per haemato-cathartica, quae vocant.

C A R B V N C V L V S.

§. 107.

Maius periculum adfert *ἀνθραξ*, seu carbunculus, qui quasi malignus furunculus est. Nam tumor vehementissima inflammatione cingitur, quae non tam in suppurationem, quam in gangraenam tendit. Plerumque nascitur ex maligna pestilentique febre. Eius notae sunt tumor valde durus, ex atro rubens et lividus, qui parum leuatur, sed inferioti carni quasi affixus est. Dolor acerbissimus est, et qualis ab aduentibus esse solet.

§. 108.

Aridus durusque tumor, si superhabitis emollientibus curatur, non, vt furunculus, in pus vertitur, sed
super-

superueniente gangraena, putrescit. Si vero res benecedit, gangraena non serpit, sed id, quod corruptum est, ab integro separatur, pure inter vtrumque mota (Vid. de Gangraena).

§. 109.

Carbunculus semper magni et maligni morbi testimonium est, et summum periculum habet. Is tam tolerabilior, qui leuatur, rubet et musculosa loca occupat. Circa quem vero magna inflammatio est, et quae subteractis quasi radicibus, serpit, qui nigrum liuidum, quae colorem habet, qui non leuatur, sed inferioribus quasi affixus manet, vel qui sine integritate iterum minuitur, qui loca neruosa, articulos atque tendines occupat, mortis periculum ostendit. Aeger etiam rapi potest, si plures, quamuis boni, idem corpus instant, quia is nimio dolore conficitur.

§. 110.

Aduersus carbunculos auxilium est in emollientibus, quibus pus mouetur et vitiatum ab integro separatur. Imponenda itaque cataplasmata ex farina, quam ex lacte coqui optimum est. Adiici possunt oleum, mel, carica pinguis, et alia (91. 92).

§. 111.

Sunt, qui festinare malunt, et crudum carbunculum protinus excidere vel adurere, et ad id, vel igne, vel medicamentis, quae rodunt atque exedunt, uti. Ast sic vitium non tollitur, sed inflammatio, quae oras noui vlceris occupat, periculosius procedit (96).

§. 112.

Commodum magis videtur, ferrum candens minus adioueri carbunculo, si is quasi imis affixus est, quo magis leuetur. Nam cantharides non ita opportuna sunt (62). Si omne corruptum vndique a viua carne

carne diductum est, vlcus curatur implentibus. (Vid. infra de Vulneribus.)

† Ferrum candens, itemque butyrum antimonii quidam laudant, alii reiciunt. Sed optimum est, locum scarificare, et adhibere vnguentum digestiuum cum puluere vel corticis peruiani vel herbae scordii, adiecto sale ammoniaco, et desuper dato pulte e mica panis candidi, floribus sambuci lacte et cepis; separato eo, quod corruptum erat, vtendum essentia vulneraria et emplastro diachylo composito, donec ad sanitatem perueniat.

MAMMARVM INFLAMMATIO.

§. 113.

Aliter etiam curari debent glandulae, si illae cum inflammatione intumuerunt. In his enim reprimenda plerumque aliena sunt, cum nec sola discutientia ferant. Nam si earum tumor resolui debet, necesse est plurimis emollientibus vtī, vel horum non minimam partem aliis admiscere.

§. 114.

Nonnunquam mammae inflammantur, id quod iis frequentius euenire solet, quae suo lacte prolem alere nolunt, vel dum eam delactant. Enitendum est, vt his lac, quod in mammis confertim haeret, reprimatur et sanguini admisceatur (87).

§. 115.

Expeditissimum est, fascia paulo adstrictiori mammas protinus comprehendere, et in altum leuare. Sic enim, et hac obiecta, lacteus humor, ne in mammas concurrat, prohibetur et auertitur. Fascia vero non ita opportuna est, si mammae lacte iam tument et valde durac sunt. Nam facile ex nimis valida pressione increfcit duritia et inflammatio. In hoc casu optimum est, si lac exitum habet, et sponte ex manibus effluit, hae autem mollescunt et residunt. Circumdari

dari cum fascia potest emplastrum, quod ex aequis portionibus emplastri de spermate ceti et diaphoretici Mynsichti miscetur, vel aliud, quod crebrius in usu est, emplastrum filii Zachariae. Nihil vero maiorem usum praestat, quam abstinencia, et si aqua calida, vel iuscula, quae minime pingua, sed quam dilutissima esse oportet, potioni dantur. Egregie etiam in puerperis proficit alui deiectio, quae vero medicamentis quam mitissimis, et minime acribus, iisque petenda est, quae *ἐκκοπρωτικά* dicuntur. Ex horum genere potiora sunt: manna, passulae, cremor tartari, rhabarbarum. Iis, quae prolem, quam aluerunt, iam adultiore ablegant, paulo validiora dari possunt.

† Febris autem, quae plerumque tumores eos concomitatur, ratio praecipue habenda est sic, ut datis diluentibus et temperantibus vis eius, si qua est, frangatur, et perspiratio moveatur.

†† Iis, quae prolem suam lacte suo alere nolunt, mature et antequam lac in mammis colligatur, h. e. altero post partum die, danda est medicina aluum purgans, non acris quidem, sed pro viribus mulieris sat efficaciter aluum soluens.

§. 116.

Vim nocendi habet cibus potusque valentior, calidus et sanguinem ciens, qui inflat, et in quo nimium alimenti est, qualia esse solent iurulenta. Malum etiam auget aluus contracta, et si in puerpera lochia non proueniunt. Has vero foeminarum purgationes medicamentis calidis promouere pestiferum esse puto, maxime, si aestus pulsusque concitator febrem superuenturam esse indicant, quam calidis incendi nemo ignorat. In hoc enim casu, ex medicamentis ore sumendis, quae temperandi vim habent, habent etiam dissipandi. Nocent etiam extrinsecus spiritus vini cum camphora, et alia (59. 77.), interque haec fascia iusto adstrictior.

§. 117.

§. 117.

Crebrius autem incidit, ut mulieri prolem alenti mammae ex represso coactoque lacte intumescant atque inflammentur. Hoc autem fit, si inopina re territa fuit, vel si frigore horruit, vel si ipsas mammas aliquid offendit, id quod ex emplastris accidere potest in iis, quarum cutis omnium rerum impatiens est. Hic diligentem observationem adhibeat chirurgus, an talis sit inflammatio, quae discuti possit. Si enim tumor non valde durus est, aequalis et ruber, qualis in erysipelate esse solet, satis est, mammas ficcis pulueribus conspergere, qui aduersus erysipelas profunt (vid. infra de erysipelate) illasque contra frigus custodire.

§. 118.

Si autem iam magis adoleuit et altius descendit inflammatio, et tumor durus est ac nodosus, ea observanda, quae supra praecepimus (93). Dari possunt temperantia et diluentia. Lac euocandum suctione catelli, vel alius mulieris. Conducit etiam lenior mammae fricatio, quae fieri potest mediante molliori excutia. Si vero lac iam penitus coactum est, et tumor ad suppurationem spectat (59. 84. 85. 93.), maturandus est, observatis omnibus, quae supra praecepimus. (90. ad 101.)

† Lac in mammis quiescens redditur mobile, ut pars refoveri, pars ex mamma effluere possit, si aquae calidae vapor admittitur, aut butyrum recens, non salitum imponitur, aut sapo Venetus lacte vaccino solutus et agitatione in spissam spumam mutatus, calide quidem, adhibetur.

PAROTIDVM INFLAMMATIO.

§. 119.

Parotides ex varia causa intumescunt, ex concurrente mala materia in scabie et venereo morbo, nec non illo ulcere, quod a faui similitudine veteres *κνέλον* appellabant.

D

pella-

pellauerunt *, et si humor argento viuo solutus eo concurrat. In ardentibus et ipsa peste saepe in parotides *μετάσασις* fit (46). Accidere etiam potest, vt in glandulae emissario, seu ductu a STENONE inuento, se aliquid opponat, et saliuam efflui prohibeat.

* CELSVS Lib. V. cap. 28. PAVLVS L. III. c. 3. p. 16. TRALLIANVS L. I. c. 9. p. 5.

† Parotidum tumores isti vix non semper incipiunt ab glandula conglobata illa, quae parotidi glandulae insidet.

§. 120.

Vt vero hae causae, sic etiam curationis ratio multum inter se distat. Quantum fieri potest, auertendus materiae coitus est, et cauendum, ne aperiantur. Propter humorem enim, quem continent, pus boni generis haud fit, sed acre, et quod iunctas partes erodit; inde vlcera fiunt, quae difficilius sanescunt. Si tamen acuti, grauioris malignique morbi materia eo conuersa est, satius est, tumorem aperiri, quam reprimentibus curari. (46. 77.) Nec tamen hae parotides omnes in pus vertuntur, sed saepe vel iterum euanescent *, vel aluo biliosa, crassaque vrina soluuntur **.

* Vid. HIPPOCRATES Epidem. L. I. Sect. I. p. 653.

** c. I. Sect. II. p. 667.

† Materiae coitus a primo initio auertitur aqua frigida identidem et assiduò applicata, et dato sat valenti medicina aluum purgante.

§. 121.

In aliis morbis praesidium petendum est potissimum ab illorum curatione. In scabie malisque vlceribus aluus ducenda catharticis, quibus adiciendus est mercurius dulcis, dandaque sunt, quae sanguinem ac lympham purgant. In catarrho, et si salivae ductus confertus est, profunt praeter ea, quae ipsi morbo atque feбри medentur, masticatoria, et ex his pimpinella alba. Leuiter etiam pertractari fricarique locus potest.

est. In omnibus vero his casibus tumor calidus fer-
vandus est, et superdandum emplastrum diaphoreti-
cum, cui admisceri potest emplastrum de meliloto. Et
in hac curatione cauendum, ne scirrhus oriatur. (58.
59. 93.)

§. 122.

Si vero felix haec curatio non fuit, et tumor totus
ad suppurationem spectat (84. 85.), superdari debent
emollientia cataplasmata et emplastra (91.), et deinde
tumor aperiri (96. 98. 99. 100.), vlcus curari. Hoc
aliquando, quia nimium et perpetuo madescit, diffici-
lius sanescit. Confert, si hoc incidit, linteamenta pau-
co spissiora ex spiritu vini exprimere, et vlceri impo-
nere, eaque iniecta adstrictiori fascia adprimere, fa-
ciam vero ante sextum diem, nisi aliud quid hoc ex-
gat, non soluere. His vero diebus silentium haben-
dum, neque quidquam, quod mandi debet, edendum *,
ed in iusculis, pulticulis et similibus perseverandum
est aegro, donec vlcus fuit glutinatum.

* LE DRAN Obs. T. I. Obs. 2.

B V B O.

§. 123.

Fiunt etiam tumores sub axillis et inguinibus, quo-
rum ultimos bubones appellant *. Hic tumor
non absimilis ei est, quem in inguine faciunt epiploon
et intestina, si ex abdomine descenderunt. Cum vero
nullus error maius periculum habeat, et cum vtrum-
que genus saepe cum inflammatione sit, sedulo no-
tenda est differentia. Illud autem herniae genus,
quod super cruralibus vasis oritur, et quod herniam
cruralem vocant, maxime, si non omentum, sed solum
intestinum descendit, prae aliis minus perito opinio-
nem bubonis facere potest. Nam bubonoccele, a pu-
dendis

dendis propior est, quam bubo. Epiploocele mollior plerumque est, et digitis plus cedit, quam enterocel et bubo, inter quae itaque maior similitudo est. Alii enim in hernia crurali tumor rotundus est, in bubo oblongus. Si utrumque vitium digito premitur, plus cedit intestinum, etiamsi distentum sit, quam bubo, qui maiorem duritiem habet. In hernia, nisi id inflammatio prohibeat, tumor, si premitur, ad abdomen reuertitur, haud vero bubo, qui pressus increfcit, indurescit et magis inflammatur. Hernia repente oritur, si abdomen valde constringitur, premitur, concutitur, nec non sub clamore, vomitu, et si homo sub aliquo pondere nixus est. Bubo nascitur ex aliis causis, frequentissime ex impura venere, et pedetentim adolescit. Si inflammatio mouetur, ea, quae herniam occupat, maxima est, cum summo dolore et vomitu, et per euolutum compressumque intestinum nec aluus, nec spiritus transmittitur; aluus sumptis purgantibus haud soluitur, quamuis frequens sit desidendi cupiditas. Tandem, nisi minime distans curatio adhibeatur, bilis et sub finem stercus per os redditur, inflammatio vero in gangraenam ruit. Bubo lenta plerumque inflammatione in pus vertitur, rumpitur, vel a chirurgo aperitur.

* Βυβων, inguen et tumor inguinis. Vide SVIDAM Tom. P. 444.

§. 124.

Bubones non raro intumescunt, si gonorrhoea male curata fuit, et virulentus humor celerius suppressus. Hoc vitium, si recens est, tollitur, si retenta materia resolui, et illud humoris profluuium reuocari potest. Hoc vero efficiunt emulsiones, si amygdala pineae, papaueris et alia semina his idonea ex diureticis aquis in mortario conteruntur, et liquori per lientem transmissio pauciores guttulae balsami Peruuiani adiciuntur.

adiiciuntur. Si vero inflammationem adesse dolor et urinae difficultas significant, fere alienum est balsamum, et vtilius nitrum.

† Si his adhibitis non reuertitur gonorrhoea, aliquando vtilis esse potest cereus. Nonnulli quoque nouam infectionem per cereum materie virulenta infectum laudant. Aliquando et datum emeticum medicamentum gonorrhoeam refricat.

§. 125.

Attamen, vbi bubo iam adoleuit, illum resolvere non ita tutum est, quia per suppurationem multum vitii virulentique humoris exit. Hoc vero, si febris non vrget, fieri potest, superhabito emplastro molliente et diaphoretico, et datis simul catharticis paulo valentioribus, imprimis ex mercurio dulei. Postquam tumor resedit, dari oportet medicamenta efficaciora, sanguinem purgantia, et quae aduersus venereum morbum valent. Emplastrum Vigonis de ranis cum mercurio, nisi fere quadruplum mercurii adicias, parum efficax videtur.

§. 126.

Optimum est, si pus mouetur (90. ad 99.), et post longam suppurationem, qua humores purgantur, vlcus glutinatur * (100. 101). Nec hic omittenda sunt medicamenta (125).

* Est tamen quaedam differentia. Si bubo mox post impurum coitum vel cohibitam gonorrhoeam oritur, is fere criticus est, et quo virulenti humoris plurimum ex corpore eiicitur. Si autem ex inueterato morbo nascitur, is nec leuamen adfert, nec adeo facilem curationem recipit.

† Tumores huius generis aegre purgantur in abscessum versi. Quapropter quidam inter Britannos clari Chirurgi eos anteaquam magnitudine augentur, sectione tollunt. Quod si factum non est, et tumor pus concepit, ad vlcus purgationem plerumque opus est mercurio praecipitato rubro, aut aliquando etiam separatione solidi corrupti ope tenaculae et scalpelli.

§. 127.

Si pestilentis morbi materia in bubonem coit, obseruandum, quod (46. 69. 77.) praecepimus. Mol-

lientibus cataplasmatibus (91. 92.) adiici potest, si dolor vehementer urget, parum croci atque theriacae. Abscessus maturus factus scalpello aperiendus (96.), et vlcus purgandum est.

§. 128.

Pueris saepe bubones indurantur et intumescunt ex lymphae bonique succi redundantia. Vocant vulgo *die Wachs-Beulen*. His medentur abstinentia, corporis exercitatio, purgatio, sorbitiones ex superinfusis herbis discutientibus calida.

T E S T I C V L O R V M

I N F L A M M A T I O .

§. 129.

In testiculis vero inflammatio ex variis causis oritur; ex impura venere, et si virulenta et venerea gonorrhoea cohibita est, nec non ex ictu, et si valentius requiapiam premuntur. Haec inflammatio, et propter doloris acerbitem, et propter ipsarum, quae laborant, partium naturam, non sine periculo est. Testis enim scirrhus (59), scrotum autem et eius interior cellulosa tunica gangraena periclitatur. (36.) Si a retenta materia vitium oritur, prima tumet epididymis.

§. 130.

In hoc casu, et si gonorrhoea haud ita pridem coercita fuit, illa quandoque reuocari potest. (124.) Si vero res non feliciter ceciderit, prospicienda duo sunt; ne tumor pus alat, et ne vitium contrarium oriatur, et duritia scirrhifque maneat. Si itaque inflammatio vehemens est, mox sanguis ex brachio mittendus (62), et omnia adhibenda, quae (63. ad 68.) praecepimus.

† Sanguisugae etiam, si initio morbi plures scroto admouentur multumque sanguinis extrahunt, discussionem iuvant.

§. 131.

§. 131.

Extrinfecus inflammationi opitulantur cataplasmata, quae vero minime humida esse oportet. Panis candidi interior pars, adiecta herba hyoscyami et paucro croco, coqui potest ex aqua fluuiali, donec habeant spissi cataplasmatidis temperaturam, et potest addi parum olei cuiusdam mollientis, verbasci, liliorum alborum, altheae, hyoscyami. Etiam farinae seminis lini, fabarum, addita pauca farina seminis cumini, ex aqua coquuntur, donec crassitudinem cataplasmatidis minime madentis habeant, quibus parum olei additur. Si durus testiculus emollientia postulat, scrotum vero inflammatum est, hoc, priusquam cataplasmata iniiciuntur, lauari potest vino austero vel aqua calcis viuæ, ex quibus decocta sunt roborantia et discutientia vegetabilia. (76. 79.)

§. 132.

Quod si, omnibus his frustra adhibitis, pus oritur, illudque increfcit, aliter succurri ei non potest, quam, si inciso tumore (98. 99.) emittitur et vlcus purgatur. Si dissipata inflammatione tumor durus manet, diu superhabenda sunt mollientia, et, ex his, nisi cutis emplastri impatiens sit, emplastrum, quod aequas portiones diachyli compositi et diaphoretici Mynsichti habet. Necessarium autem est, vt scroto vinctura subiiciatur, quæ illud et testiculos suspensos teneat: suspensorium vocant.

§. 133.

Si vero testiculus totus vitiatus est, isque seruari non potest, necesse est, vt excidatur. Prius tamen spermaticis vasis vinciendo prospiciendum. (Vid. infra de Sarcocoele.)

§. 134.

Si inflammatio scrotum tenet, illa celerius serpit (36. 129.) et in gangraenam degenerat, qua non raro

totum scrotum corrumpitur. Huic vitio occurrendum est roborantibus. (76. 79. 131.) Si iam nigrities illud occupauit, protinus omne, quod corruptum est, excidendum. Videndum tamen, ne ex incisa arteria profusio sanguinis oriatur. Quare saepe praestat: crustas scalpello concidere et medicamentis resolvere. Digerentibus igitur et pus mouentibus adiici possunt: septica, et ex his vnguentum WÜRTZII, eaque obseruanda, quae de gangraena infra docebimus. Non raro accidit, vt omne scrotum abscedat, quod adhibitis digerentibus et balsamicis renascitur.

§. 135.

Solent etiam TONSILLAE VVAQVE inflammari. Si malum vehementer adolefcit, ab initio necessaria sunt. (62. 63. 64.) Aqua gargarizandum est, in qua decocta sunt reprimentia. Radix figilli Salomonis, bistortae, tormentillae, herba pyrolae, prunellae, hyssopi, saluiae, origani, flores rosarum, sambuci, balaustiorum, malicorium. His adiiciendum est nitrum, lapides prunellae, roob dianucum vel diamoron.

† Efficaciora illa fiunt, si ex aequalibus partibus aquae et aceti coquantur.

§. 136.

Si vero inflammatio ad suppurationem spectat (84. 85.), ex aqua vel lacte coqui possunt mollientia. Radix althaeae, maluae, herba parietariae, mercurialis, flores maluae, verbasci, semen foenu graeci, lini. Ex utroque genere decoctum componi potest et varia proportionem misceri, prout res postulat.

§. 137.

Si vero faucium ardor aegrum male habet, illum leuant cydoniorum psyllique semina, si adiecta paulatim aqua plantaginis teruntur, et sic cremor paratur, eoque fauces illinuntur. Melli, quod rosam excepit, admisceri potest roob diamorona et nitrum, eoque per-
vngi

vngi fauces. Hoc penicillo fit, aut specillo, quod lin-
teo carpto inuolutum in medicamentum demittitur;
quo etiam tenacior pituita, si fauces obsidet, extergen-
da. Praestat enim, si inflammationis metus est, penicilli
vsus, quia, si liquores per siphonem expressi maiori vi
in fauces immittuntur, hae non parum offenduntur.
Haec etiam vuae per cochlear commode illinuntur.
Pituitam melius resoluit essentia pimpinellae albae, si
pauciores guttulae frustulo sacchari exceptae in ore
continentur, quod remedium vero non, nisi in minus
valida inflammatione, opportunum, in maiori alienum
est. Cum his collum velandum est. Sal calidus et
sambuci flores cum saccellis superponi extrinsecus pos-
sunt. Vbi autem inflammatio periculosior interiora
occupat, illaque extrorsum euocanda videtur, vttiliora
sunt emplastra et cataplasmata emollientia. Non pa-
rum confert, si caput sublimius habetur.

§. 138.

Vehemens inflammatio in ANGINA terret, si ea
fauces difficultate spirandi strangulat. Haec tamen
aliquando desiderat, vt sanguis ex ipsa parte, quae la-
borat, vel ex proxima mittatur. Hoc vero auxilium
non prius arripiendum, quam si nullum aliud apparet.
Super faucibus itaque et tonsillis concidenda cutis
scalpello est, idque altius, quo multum sanguinis ex-
eat. Prius tamen sanguinis non parum detrahendum
est ex incisa alia vena. Celerius inflammatae fauces
exhauriuntur, si sanguis ex iugulari mittitur, id quod
magis commodum est, quam si inciduntur venae sub
lingua. (Vid. infra de sanguinis missione.) (62. 68.)
Si periturus est aeger, is temeraria via, secta nimirum
trachea, adiuvandus. (Vid. infra de bronchotomia.)

§. 139.

Vbi tonsillae pus alunt, tumorque maturuit, is
vero pure substante non rumpitur, incidendus est.

Ad id aptum est anceps scalpellus linteo carpto ac mucronem usque obuolutus, vel instrumentum, quod *Φαρυγγότομον* appellant, cuius etiam varii modi sunt *. Vlcus purgat mel cum rosa, cui tantillur essentiae succini et pimpinellae admisceri potest. Etiam utilis est pimpinella cum saccharo. Ex male curata inflammatione non raro tonsillae scirrhusae fiunt. Si earum maior tumor est, isque premit Eustachii tubam, aegri grauius audiunt.

* Vid. WIDEMANNI Dissert. de Tonsillis. GARENGEOT de Instr. Tom. I. p. 371.

PARONYCHIA.

§. 140.

Propriam animaduersionem etiam postulat illud abscessus genus, quod in extremis digitis oritur et veteribus *παρωνύχια* vel reduuia *, recentioribus barbaro nomine panaritium dicitur. Adfert magnam inflammationem, acerbissimum dolorem, grauioremque febrem, non raro gangraenae metum.

* Reduuia proprie significat, si cutis e latere et ad radicem unguis soluitur.

§. 141.

Nascitur vitium, si humor aliqua parte in digiti extremo coit et quiescit, qui vel sanguis est, vel illud oleum, quo interius tendines inunguntur. Nam in paronychia non semper pus, sed saepe ichor tenuis acris reperitur. Non raro ex punctura cum acu aut festuca fit. Saepe tamen non tam a cute, quam ab interioribus partibus incipit. Cui rei occasio datur, si digitus calida mollitus et actiuans repente in frigidam demittitur. Obseruatio docuit, ad id etiam valere lixiuum ex cineribus, quod ad purganda coquinaria et alia vasa adhibetur.

§. 142.

§. 142.

Hoc inflammationis genus summum dolorem habet, quia locus, quem infestat, nervis abundat. Illud saepe sine notabili tumore, nunquam sine maiori inflammationis impetu est.

§. 143.

Variam autem sedem habet malum. 1. Aliquando enim tumor coit, in tunica adiposa, sub cute, quae hac parte et multum sensum habet, et exercitatis durior est; quod genus optimum esse solet. 2. Fere peius est, si humor sub ungue haeret. 3. Longe difficilius, si humor sub perioestio est. 4. Pessimum autem, si is haeret in vagina, qua tendines musculorum digitos mouentium, sublimes et profundi, comprehenduntur. Neque enim alia importunior acutiorque inflammatio ea est, quam haec ultima paronychia species mouet. Alia etiam sedes esse potest, si materia sub vagina illa perioestio inhaeret.

§. 144.

Primum autem huius mali genus tumorem habet elatiorem, cum aliquo rubore dolorem vero tolerabiliorem. In altero et tertio genere locus nec tumet, nec rubet, et colorem cutis haud excedit, dolor autem subest atrocior, qui vehementius crescit, aegro omnem somnum eripit, et summam febris intentionem adfert, ex qua etiam delirium nascitur. Ex quarto autem genere tumor oritur, qui cum summo periculo totum brachium occupat, ut etiam magis intumescat manus, quam digitus, illeque locus, ubi prima mali sedes fuit. Mox a principio in hoc genere aeger dolorem sentit eo loco, ubi ex condylo interno humeri, vlna et ligamento interosseo educitur musculus flexor digitorum sublimis seu perforatus.

† In vehementiori malo interdum glandulae, quae sub axillis sunt, intumescunt.

§. 145.

§. 145.

Expediſſima curatio eſt illius, quod ſub cute eſt. Si ſub vngue vitium haeret, iſ abſcedit. Si vero mala materia oſſi inſidet, hoc vitium contrahit et totum vitiatum plerumque eximendum eſt. Quarto generi niſi quam primum ſuccurratur, proximus eſt gangraenae metus, quae in totum brachium tendere ſolet.

§. 146.

Raro haec inflammatio, et non, niſi ab initio, diſcutitur, vbi nondum penitus inſedit. Ad id vero maxime poſſunt aqua, quantum tolerari poteſt, feruida, in quam digitus demittitur et per multum tempus in ea relinquitur. Alii magis idoneum eſſe volunt ſpiritum vini cum camphora. Imponi etiam poteſt emplaſtrum ſaponatum Barbette, addito croco et camphora, vel cataplaſma ex allio, ſcordio, hyoſcyamo, quibus, ex lacte coctis, adiicitur crocus et theriaca.

† Quartum paronychiae genus, vbi et in tribus digiti phalangis et in vola manus rubor de ſede morbi teſtabatur, impoſito emplaſtro malaſtico diſcuti vidimus.

§. 147.

Quod vero his non ſoluitur, euocandum eſt. In primo genere humor in pus verti poteſt, id quod efficiunt cataplaſmata mollientia et diachylon compoſitum. Tandem cutis ſupra pus exciditur et plaga hoc exempto purgatur atque ad cicatricem perducitur. Ad hanc curationem apta ſunt, quae locis neruoſis conueniunt, eſſentia baſamica Stahlī, cum baſamo Arcaeī. (vid. de Vulneribus.)

§. 148.

Vbi autem tumor ſub vngue coit, et hic incidendus eſt, quo iſ poſſit effundi. Vnguis abſcedit, quo in caſu ſuper eum imponitur cera, vt iſ, qui renaſcitur, contra iniurias cuſtodiatur.

§. 149.

§. 149.

In tertio paronychiaie genere necesse est ad euocandum humorem etiam crudum festinare. Inciditur vero locus hoc modo: digitus tabulae, seu alii corpori duro, imponitur, ita, vt noxa chirurgi obuersa sit, scalpellus in locum, qui maxime dolet, ad os vsque demittitur, et vsque ad extremum digitum plaga inciditur paucusque humor exprimitur. Si autem tumor prope articulum aperiendus est, incidi debet e latere, cum tendini flexoris parcendum sit. Sectionem recte factam esse, intelligitur, si dolor conquiescit. Aduersus plagae inflammationem auxilium est in ipso sanguinis cursu, quem haud suppressere oportet, sed pati fluere, donec sponte conquiescat. Si parum fluxit, mitti debet ex talo, vel altero brachio. Vulnus impletur linamentis, vel siccis, vel ex aqua vulneraria, quae paucum theriacae habet, expressis. Multum nocent linamenta, si nimium premunt. Haec sectio etiam in eo casu, vbi inter vaginam et perioestium tumor coit, locum habere videtur.

§. 150.

Vbi perioestio iniuria accessit, os vitiatur. Ex eo vero rarius squama secedit, dum id, quod vitiatum est, aridum sit, vel hoc adhibitis medicamentis pedetentim secedit; crebrius autem incidit, vt totum officulum, quia caries ad illud totum transiit, eximendum sit. Quamdiu vitiatum nondum eiectum est, necesse est, vt plaga pateat. (vid. infra de ossium morbis.)

§. 151.

Vltimum paronychiaie genus requirit, vt vagina tendinum digitos flectentium, in qua materia haeret, incidatur. Nisi enim hoc fiat, illa nocenter increbrescit ac in vaginam diffunditur, qua re et vagina nervosa et ipse tendo, qui premitur, multum intenditur (44.

83.). Haec vero res magnam inflammationem, et, nisi efficacior curatio adhibeatur, gangraenam brachio adfert.

§. 152.

Protinus igitur scalpello recto digiti extremum, ipseque, qui ibi minimus est, tumor aperiri debet, post in plagam demitti specillum fulcatum, et super id vagina incidi, donec perueniatur ad purulenti humoris sedem, et, si res postulat, ad carpum, illudque ligamentum, quod huius ossiculis innexum, annulare vulgo dicitur. Quia vero, si vitium iam adoleuit, saepe humor sub illo ligamento haeret, huic parcendum est, quia, si id secatur, tendines, quos comprehendit, euolvuntur. Igitur sub ligamento in vaginam compellere oportet specillum, et in altera parte supra ligamentum istud paulo inclinatum cuti apprimere, quo haec contra specilli principium incidatur, et exitus materiae detur. Saepe enim super musculo pronatore quadrato, vbi copiosa adeps est, multum puris haeret, quod omne euocandum est. Quo specillum melius eo usque compellatur, aegri manus ac digiti, quantum res permittit, debent inflecti. Si euocata materia fuit, vlcus purgandum est. Ne orae celerius coeant, commodè sub ligamento linum, vel habenula, traicitur, cui medicamenta, purgando vlceri idonea, illinuntur.

§. 153.

Si haec omnia non proficiunt, nec se remittit inflammatio, expeditissimum est supra carpi ligamentum, ipsum musculum, vbi is in tendinem degenerat, praecidere, quod auxilium magis commodum videtur, quam ligamenti annularis sectio, quod, nisi rodente materia violatum sit, integrum seruandum est. Si vero illud dissectum fuit, oportet aegrum semper digitos inflexos habere, donec illud iterum fuit glutinatum.

Quae-

Quaecunque etiam curatio adhibeatur, minor, vel nullus usus illius digiti, qui laboravit, relinquitur, cuius etiam saepe parum superest in tota manu, quam rigida manere necesse est.

§. 154.

Incisa vagina finire oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Si vero is cum impetu periculosius ruit, non medicamentis suppressendus est, sed arteriae vincienda sunt. (Vid. de Vulnerum haemorrhagia.)

§. 155.

His autem fauciatis compressisque nervosis partibus saepe caro supercrescit, quas medicamentis leniter exedentibus et adurentibus tolli potest. Commodissimum vero est, forfice carunculam excidere, vulnus ampliare, et sic id, quod contractum erat, laxare, plagae vero eam curationem adhibere, quae locis nervosis idonea est. Deligatur manus fascia, quae duo de viginti capita habet.

Vide GLANDORPIVM de Paronychia. GARENGEOT Operat. T. III. c. VIII. p. 283.

ERYSIPELAS.

§. 156.

Nec omittenda erysipelatis curatio. Est illud quasi spurium inflammationis quoddam genus, quod in cute nascitur, si humor per hanc exire solitus in minoribus fistulis retinetur, et tumorem cum febre excitat.

§. 157.

Notae erysipelatis sunt: tumor aequalis, fere sine altitudine latus, ex albo et liuido splendens, subrubicundus, aut rubore et pallore mistus, aliquando, si eorum corpora tentantur, quae mali habitus sunt, ex rubro subni-

subniger. Membrum, quod erysipelas recepit, non tam dolet, quam prurit. Accedit febricula, quae cum fiat magno horrore incipit, sudore et vrina, ex qua multa crassa desidunt, soluitur. Fit praecipue erysipelas in pedibus et cruribus, aliquando etiam in capite, ceruice, facie, palpebris, aliisque sedibus. Non raro superuenit vulneribus et vlceribus. Oritur etiam ex μετασάσει, si febris, vel alius morbi materia, in aliquem locum incumbit. (46.) Locum mutat, et fane-
scēte eo, quem prius occupauerat, in id, quod integrum est, transit. (73.)

† Color ex pallido rubens plerumque flauum admixtum habet, quod maxime decedente morbo conspicuum fit. Locus digito impresso pallescit, sed remoto digito prior color redit. Malum non modo in vicina serpit, sed et facile interdum reprimitur. Febris modo leuis, modo vehemens, atque grauioribus symptomatis, capitis dolore, aurium tinnitu, stupore, delirio, vomitibus stipata est, neque hominem prorsus relinquit, etiamsi erysipelas in cute efflorescat. Finitur autem aliqua desquamatione epidermidis fere vndecimo die. Si morbus et febris mitior est, breuior etiam esse solet.

§. 158.

Et hoc vitium aliquod discrimen habet. Nam saepe minor pruritus, qui ex quiescente et acri humore in cuti fit, veram inflammationem mouet, et dicitur ερυσίπελας φλεγμονώδες. Si vero inflatio maior est, quam rubor, tumor mollis, febris non magna, ερυσίπελας οίδηματῶδες vocatur. Σκιρτώδες autem, si tumor maiorem durtiem habet. Incidere subinde vltimum solet ex mala curatione.

† Aliquando erysipelas cuticulam vel in pustulas minores, vel in bullas maiores eleuat, diciturque vel pustulosum vel bullosum.

§. 159.

Erysipelas excitat animi grauior commotio, praecipue terror et ira, immoderata exercitatio, frictio, ignis, vel solis ardor, et omne, quod expirationem in
cute

cute coercere potest. Ad id corpora, quae mali habitus sunt, opportuniore esse compertum est. Subinde illud ex eadem causa reuertitur.

† Cacochymiam biliosam saepe peccare et flavescentes color docet et causa praegressa h. e. ira, et causa praedisponens h. e. temperies biliosa. Aliquando et sapor amarus in ore et vomitus biliosi idem demonstrant.

§. 160.

Sedes eius est in cute et huius minimis fistulis, per quas tenuissimus halitus sudorque effertur. Si enim ille in his, ex variis causis, ex quibus obstructions fieri supra retulimus (35-37. ad 47.), subsistit haeretque, oritur tumor, incitantur vitales motus, cieturque febris. Humor autem, qui ex oleo tunicae adiposae et recrementis omnium corporis succorum ortus videtur, motu et calore acrior fit, vrens, ac tandem putris. Oleum enim rancidum, et optimam lympham salsam fieri, et sic ex variis sibi contrariis causis putre, salsum ac volatile in corpore caeteroquin recte valente oriri, compertum est. (vid. de Gangraena.) Quare hic humor nunquam, ut sanguis, inflammatione coquitur, et in pus bonae notae vertitur, sed, si haud dissilatur, in saniem mutatur, quae cutim rodit et mala ulcera parit.

§. 161.

Si erysipelas sine inflammatione est, minus periculum habet. Peius tamen, quod caput, palpebras, faciem infestat. Periculosum esse potest, quod cum mala febre oritur et in phlegmonem transit.* (conf. 50.)

* Vid. Illustr. HOFFM. Med. Rat. System. T. IV. P. I. Sect. I. cap. XIII.

§. 162.

Oportet itaque erysipelas discutere. Dari debent aegro, si valentior febris est, medicamenta, quae aestum minuunt (64.), et ex his praecipue pulveres absor-

E

bentes,

bentes, bezoardici cum pauco nitro. Praeter haec et iam diluentia, ptisana. Vbi morbus se inclinauit, fortiores calidae, liquores bezoardici, alexipharmaci opportuni sunt. Valde necessaria est abstinentia et quies. Nocet frigus, magis vero aestus. Si sudor venit, debet aeger se sub stragulis continere, ut is per totum corpus diffundat.

† Vt ubique sic et hic habenda est ratio causarum et symptomatum. Itaque videndum utrum perspiratio cutanea repressa, an vero sordes biliosae morbum faciant. Si prius est neque febris vehemens, quies, abstinentia, diluentia, stragula pauca, usus aeris temperati, fuga persflatus aeris, vestes et stragulae tum vniuersum corpus tum partem satis non tamen nimium fouentia atque si alius non respondet, venemata non acris vel lenis medicina purgans primis diebus sufficiunt. Liqueores bezoardici et infusa herbarum hyssopi, scordii, fl. sambuci conueniunt, tum, cum cutis vnda et mollis fieri incipit. Si erysipelas phlegmonodes et cum vehementi febre est, potest sanguinis missio necesse fari esse, qua tamen non multum sanguinis effundi debet, ne humor mobilior e loco affecto, in alium nobilioremque retrahatur. Alia ratio medendi adhibenda est, si ex sapore foedo, nausea, vomitione, fordibus linguae, biliosa in primis viis subesse intelligimus, sanguinis missio omittenda est. Oportet autem alium sed per antiphlogistica dicta purgantia soluere, et, si febris, ne tum quidem remittit, vomitum mouere; caeteroquin vero omnia ea adhibere, quae febris eiusque symptomata indicant.

§. 163.

Si vero ad medicamenta veniendum, quae exterius imponuntur, et usus et ratio docuerunt, aduersus erysipelas in iis auxilium esse, quae tenuem, acrem, in cutis fistulis haerentem humorem recte discutunt, dum solidas partes paululum adstringunt, et tetrum illum halitum bibunt atque absorbent. Profunt itaque pulueres sicci, farina secalis, fabarum, lupinorum, quibus admiscantur radix glycyrrhizae, cortex medius sambuci, flores sambuci, adiecta etiam pauca camphora.

† Vt satis sicci pulueres sint, ex rebus iis antea humidum mediocri calore expellendum est.

§. 164.

Vbi autem erysipelas cum magna inflatione, seu *φλεγμονώδες* est, corpus vero molle, laxum, humidum, et obesum, requiruntur efficaciora roborantia. Iis igitur admisceri possunt bolus Armenia, cerussa, plumbum vstum. Ad id idonea est compositio Mynsichti. Pulveres subinde, et post sextam circiter horam, mutari debent, quos nec frigidos, nec valde calentes, esse oportet.

§. 165.

Vitium vero, quod cum mala febre est (161), hanc curationem haud admittit. Tolerari debet, cum satius sit, summam cutem corrumpi et exulcerari, quam, id quod nocet, impositis reprimentibus, in interiores partes verti. Febre enim discussa, etiam huic succurritur.

† Hoc casu pars solummodo fouenda est velamine molliori et leuiori, aut imponendi sacculi herbis floribusque discutientibus, cuique notis, pleni, parum tantum calentes.

§. 166.

Ad erysipelas referri posse videtur rarum illud morbi genus, quod veteribus *ζωστήρ*, ZONA, vel *ἐξπηγς* dictum est. Nam ab umbilico ad genua usque cutis per pustulas liuidas exasperatur, rubet et multum roditur. Habet etiam febrem, eamque subinde grauem, cum delirio aliisque symptomatis, et periculum adfert, praecipue, si imprudentia curantis irritatur. Nec huic vis, impositis externis, adhibenda, sed febris curanda est, qua quiescente, etiam hoc erysipelas sanatur.

Vide SCRIBONIVM LARGVM Comp. 53. p. 44. et Comment. RHODII p. 122. PLINIVM II. N. Lib. XXVI. Cap. XI. T. I. p. 409. et Exempla in IOH. LANGII Lib. I. Ep. 32. TVLPII Obs. Lib. III. Cap. 44. HOFFMANNO l. c.

§. 167.

In omni erysipelate male plerumque mittitur sanguis, nisi illud plethora magnaue febris et iuncta inflammatio

inflammatio postulare videantur. Nec aliis, nisi lotionibus mollientibus, alius soluenda. Nec multus fudor eliciendus est. Quare aliena sunt omnia calida, externus etiam calor, et, si, quae imponuntur, nimium concalescunt sunt, quibus ardor atque pruritus augentur, inflammatio incitatur. At etiam frigus vitandum, quod, si locum laborantem ferit, metum adfert, ne mala materia repressa in partem magis necessariam incumbat. Alienus etiam cibus est, qui intus facile corrumpitur, iurulentus et calefaciens (64. ad 67). Nocere tamen aliquando potest nimia abstinentia (70). Emplastra pingua, humida, si superdantur, ulcera faciunt, quae non facile sanescunt, quia acris illius humoris (160) exhalationem impediunt. Nec proficit Spiritus vini cum camphora, quo fistulae nimium arctantur.

† Non pauci aetate nostra audaciores sunt, et ad erysipelas utuntur modo aqua frigida modo aqua vegetabili-minerali a GOVLARDO, Chirurgo inter Franco-gallos claro, ita dicta. Quae quidem ratio medendi tempestive et tum, cum a repulsa materie noxa grauior non imminet, expedita est admodum; fierique tuto potest, si vitium non ab vniuersi corporis affectione procedit, sed, quod dicunt, locale est. Quodsi aliquando a repressa materie pars nobilior obsidetur et grauiora symptomata incidunt, pars prius affecta frictione, fotu, pulte ex fermento panis et sem. sinapeos parata, curanda, loco nobiliori illi emplastrum cum cantharidibus imponendum est. Opus etiam esse potest sanguinis missionem, nitrosi, enematibus, perspirationem mouentibus. Si pustulae vel bullae erumpunt, nec sponte humorem dimittunt, aperiantur vel acu vel forfice, et humor acris lintee mollissimo abstergeatur. Postea utilis esse potest vel aqua calcis vel saturnina.

§. 168.

Si, discussa febre omnique inflammatione, tumor durus manet, id quod saepius obseruatum est, si erysipelas spiritu ardente curatum fuit, durities molliri potest emplastro de meliloto, nec non emplastro de sensiuo viridi; vel miscendus est par modus emplastrum vltimi.

ultimi, vel diachyli simplicis, et emplastri diaphoretici. Ulcera enim, nisi dūritia per haec mollientia euicta fuerit, vix glutinantur (vid. de Ulceribus). Nec haec curationem recipiunt, nisi adhibeatur quies, et iniiciatur fascia moderate adstringens. In cruribus ad id commodissima sunt tibialia, quae per ligamen adstringuntur.

GANGRAENA ET SPHACELVS.

§. 169.

Inflammatiō, si fatalem exitum habet, tendit in γαγγραιάν. Dicitur autem quaelibet pars solida mollis hac laborare, si in ea vitalis humorum circuitus tolli coepit, et mors * atque putredo ** imminet (55). Vbi vero membrum plane et ad os vsque sine sensu ac motu est, atque emortuum, illud σφάκελος tenet (57).

* Pars corporis viuere dicitur, quamdiu humores in suis vasis actione cordis et solidarum (31) mouentur et vitalem circuitum faciunt. Si hic motus penitus cessat, pars emortua est.

** Putrescunt corpora, tum vegetabilia, tum animalia, si motu intestino et accedente calore externo conuertuntur in liquamen foetens, quod admoto igne salem dat volatilem valde attenuatum et oleum rancidum. Ex his sale et oleo attenuatis et inter se mixtis oritur sal volatilis. Terrae inhaeret et manet aliud oleum crassum piceum. Humores enim corporis, at his praecipue sanguis ex vena missus, calore in putre liquamen foetidissimum acerrimum conuertuntur, maiori vero calore, si minor humoris quiescentis modus est, siccantur et coguntur in materiam solidam. Id quod etiam oui albo, humori animali minime acri, accidere in vulgus notum est. In corpore viuo putrescunt humores ex variis et sibi contrariis causis. Hoc incidit 1) a quiete. Si sanguis haeret in tunica adiposa, et sub cute in phlegmone, ἐκχυμώσει, aneurysmate spurio, in vexatis. Si is haeret in cauo quodam, sub calua, in pectore, abdomine etc. Sic etiam putrescunt pus in abscessu, et, si hic ruptus fuit, in aliis locis, axungia in articulis, medulla in ossibus, id

quod in ἐξορώσει maligna, carie et παιδαρθροακή deprehenditur, lymphæ in hydropæ, serum, quod per cutim exire solitum est, perspiratione cohibita in erysipelate (160), anasarca. 2) Putredo oritur a languido nimis motu, qui lentam corruptionem parit, v. g. in scorbuto a vita sedentaria orto, in gangraenâ senum, infirmorum. 3) A valentiori motu atque aestu, quo humores similem in modum attenuantur, solvuntur, volatiles fiunt et acres. Hoc observatur in febribus acutis, valentiori corporis motu, aëre feruido. Quamvis enim ab initio in febre acuta humores coquantur (40), mox tamen illud coagulum, per διάθῃσιν φλογιστικήν ortum, motu intestino solvitur, et oritur attenuatio summa, atque, si hoc liquamen non vi vitæ elicitur, putredo. 4) A cohibita excretionē feri, vrinae, fecum. 5) A defectu novi chyli blandiorisque succi, qui sanguini admisceri debet, in diuturniori inedia, potus defectu, si viæ chylum ferentes obstructæ, e. g. in pueris, quibus indurantur mesenterii glandulae, oritur rhachitis, παιδαρθροακή, nec non, si ductus thoracicus vulnere laceratus est. 6) Inter putredinis in corpore ortæ causæ est, si chylus nondum subactus et in sanguinem coactus iterum crudus ex corpore per varia loca expellitur, in coeliaca, diabete, sudore ac diarrhoea hæticorum. Quod vero ad ea attinet, quæ extrinsecus corpori hanc διάθῃσιν adferunt, ut humores celerrime putrescant, potiora sunt varia venenorum genera, maxime illud, quod morsu viperarum serpentiumque infertur, occulta etiam illa pestilentium ac malignorum morborum causa. Putredinem augent quoque sales volatiles, si intus sumuntur et extrinsecus admouentur, saponēs cum alcali parati, rancida, et omnia, quæ rancescunt. Si vero aliqua parte putredo orta fuit, illa, nisi cohibeatur, peruadit proximas sedes, imo defecta vitali virtute omnes humores, quos tandem prorsus maligno sidere adflat et corrumpit. Id factum esse, humorum lixiuium, vrina, quæ putris, foetens, spumans, acris, obscura exit, testatur, nec non putidissimæ et malæ olentes deiectiones.

§. 170.

Praecipua gangraenæ sedes in adipe est et tunica cellulosa (36. 56.), quam, et omnes, et singulos, musculos, et musculorum fibras, membranas aliasque partes comprehendere constat. Haec, si exesa est, et putredine consumpta, haud renascitur. Quæ res occasionem dat, ut, si haec omnis per gangraenam corrupta fuerit, integris manentibus musculis nullus sit motus

motus, quamuis caeteroquin hi omne illud habeant, quod motum praestat.

§. 171.

Cum vero hoc vitium et sua initia habeat, et in perniciem procedat, et, cum aliter medendum sit ei, si increfcit, aliter, si subsistit, aliter, si iam ad sanitatem reuertitur, explicandae sunt propriae notae, quae haec tempora et vel spem vel periculum ostendunt.

§. 172.

Protinus vero ex (55) propositis signis scire licet, si inflammatio in gangraenam tendit. Vbi vero haec incipit, dolor, aestus loci inflammati, intentio se remittunt, et aeger de bonis suis gaudet, qui se meliusculum esse credit. Haec enim, quae suspecta et periculi plena est, leuatio non fit ob aliam causam, quam, quod vasa, quae cum nervis a quiescente humore tensa erant, iam rupta sunt. Dolorem enim fieri, si nervi intenduntur, nemo ignorat (48). Haec etiam sine bonis signis fiunt, mala crudaque est vrina, aeger ardentius sitit, viribus deficitur.

§. 173.

Vbi autem malum increuit, et gangraena penitus insedit, insolitus quidam torpor ac stupor membrum tenet, ita, vt tactus is locus, etiam acu punctus vel incisus, paucum, vel nullum, dolorem habeat. Tumor, qui durus erat renitensque, iam mollis est atque cedens, vt digiti impressi sedes etiam maneat, cutis vero inflata est, turgida, pallida, liuida, subnigra, pustulisque impletur, quae vario humore, cruento, pallido, flauo, tenui, acri, male olente, plene sunt. Circa locus dolet et inflammatus est, vitium vero alte lateque serpit. Pustulae enim in eum locum, qui pallet et liuet, pallor et liuor in id, quod inflammatum est, inflammatio in id, quod integrum est, transit. Tandem in pustuloso

corruptoque loco se crusta ostendit, quae ex quiescentibus putribusque humoribus cum ruptis emortuisque vasculis ac fibris concrevit.

§. 174.

Tumor enim mollis fit, quia humor non per arterias ad cutim fertur, sed ex his ruptis sub cute in adipem, etiam iam putrem atque exesum, emittitur, qui humor ipse valde tenuatus cutim inflat et turgidiorem reddit. Ab eo, qui gradatim in putidissimam saniem vertitur, etiam color in cute mutatur. Quia etiam humor tenuatus per cutis poros traicitur, isque sub epidermide coit, pustulae nascuntur simili humores plenae.

§. 175.

Si vero, omnibus his adauctis, putredo totum membrum ad os usque occupat, et omnis etiam caro corrupta est, illud sphacelus tenet (169).

§. 176.

Inter haec vero, et, dum membrum paulatim emoritur, magis decedunt vires, et aeger intra verba desipit, vel, si mentis compos est, balbutiendo vix sensus suos explicare potest, accedunt inordinati horrores, pulsus debilis et *σπωληκίζων*, seu vermiculate arteriam attollens *. Urina est crassa, nigra foetidaque, et alvus liquida, nigra, sanguini atro similis, pinguis, cum magna odoris foeditate, quae aegrum in praecipiti iam esse denunciant, qui sub sudore frigido et saepe nervorum distentione moritur.

* Vid. GALENVS de Praesag. ex pulsibus Lib. II. Cap. 9. T. VIII. p. 270.

§. 177.

Vires autem franguntur, quia sanguis et omnis humor ita coactus est, ut is minores, tum corticis cerebri, tum reliqui corporis, arterias permanare haud possit. Supra enim (40) retuli, in omni valida febre fieri

fieri illam sanguinis *διάθεσιν φλογισικὴν*, seu humores glutinosos, tenaces, coactos fieri. Hoc coagulum etiam horrorem excitat, prout omnis cruda materia, quae euacuationi inepta est, qua vires irritantur. Hi enim vagi et intempestiui horrores discernendi sunt ab illo, qui post materiae in febribus concoctionem eo tempore incidit, quo natura morbi materiam emolitur. Is enim breui desinit, corpore protinus recalescente *. Pulsus autem naturaliter ordinatus esse, et arteria recte attolli haud potest, quia defectum viribus cor non satis contrahitur, et quia lenti coactique sanguinis parum ex vena caua in cor influit. Ex eadem causa cor etiam palpitat.

* De horrore illo mortifero vid. HIPPOCR. Lib I. Epid. Sect. 3. de aegro IX. Critone, Lind. T. I. p. 680. et aliis locis. De horrore critico Epidem III. Sect. 3. aegr. XII. c. I. p. 738. de Virgine in Larissa, quae, quum inhorruisset, sudorem multum calidum per totum corpus effudit.

§. 178.

Magna tamen discrimina recipit gangraena, cum ex variis causis oriatur. Haec enim, quae iam executus sum, ita sunt, si valida corpori vis est, magna febris intentio, et, si malum a cute incipit et serpendo penetrandoque ad ossa usque descendit. Potest autem incidere, vt inflammatio et gangraena aliqua parte intus moueatur. Quod si enim os frangitur, et fragmenta haud recte reposita sunt, etiam grauis inflammatio oritur et gangraena, quae a periosio incipit, et plerumque sequitur vitae periculum. Huius vero, si id in femore accidit hominis habitioris atque obesi, nullae aliae notae sunt, quam dolor ac febris. Cutis enim non, nisi sub finem, rubere incipit, vbi iam omnis caro corrupta, et ad vltima ventum est.

§. 179.

Genere etiam vitii et ratione curationis multum distat gangraena, quae non a vi vitae aucta, sed a vi-

rium defectione in valde infirmis oritur. Hoc vero accidit senibus, nec non iis, quorum succi aliis, longisque morbis, malo victu *, nimia venere, corrupti sunt in quorum vitiosis, inualidis, effoetisque corporibus ex paruula saepe causa, ira, terrore, frigore, malum oritur. Incipit vero hoc plerumque ab extremis artubus pedumque digitis. Aeger sibi recte valere visus vix quicquam, praeter insolitum torporem sentit, et tandem conspicitur liquida macula, quae pedetentim increfcit. Haec sine sensu est, et totum membrum sine notabili tumore et inflammatione; proxima tamen cutis, quae vitium receptura est, paululum rubet, molliorque existit, quam esse naturaliter solet. Interea vitium tarde serpit et vix intra aliquot hebdomadas ex pede ad tibiam peruenit. Vbi vero loca carnosia occupat, quae magis putrescere possunt, celerius procedit. Putre vlcus ab initio humidum est, post nigrum et aridum, humor vero, qui ex eo fertur, mali et cadauerosi odoris. Specillum vel scalpellus sine dolore demittitur. Totum tandem membrum nigrum, aridum fit, carnes durae, friabiles et infumatis similes, aeger vix de dolore conqueritur, sed de debilitate, et crebrius animo linquitur. Nonnunquam tamen superueniens febricula efficit, vt malum celerius serpat, vel, vt consistat moto pure inter illud, quod viuum est, et quod emortuum.

* Secale cornutum, quod apud nos grauissimas et funestas neruorum distentiones adfert, in Galliis lentam attulit gangraenam, vid. H. A. R. Sc. Anno CIOCCX. p. 80.

§. 180.

Frigore autem si densantur humores in aliqua corporis viui parte, oriuntur tumores, ab initio albicantes, mox rubentes, non tam cum dolore, quam intolerabili pruritu. Hi tumores ita dolentes dicuntur τὰ χίμεθλα, pernioes, in quibus, si cutis finditur ac exasperatur,

peratur, mala ulcera fiunt. Si vero omnis humor in membro quodam frigore concrevit, et is admissio recente calore regelatus motu intestino soluitur, membrum fit rubicundum, putre, nigrum, et oritur verus phacelus. De combustis vide infra.

§. 181.

Si maior arteria ligata et compressa est, illudque, quod sanguinis motum per hanc impedit, tolli nequit, perit cum calore omnis mouendi potestas, membrum paulatim et lenta putredine emoritur. Quod vero mortuum est, non intumescit, sed aridum contractumque fit. Si ad membrum aliae, quamuis minores, arteriae sanguinem ferunt, illud non emoritur, sed tenuius fit, et imbecillum. (Vid. infra de Aneurysmate.)

§. 182.

Maiori vena compressa, ligata obstructaque, membrum extrema sua parte valde intumescit, tumor fit durus, renitens, cutis valde intenta maioribus pustulis impletur, cruentiori humore plenis, et aeger gravitatem membri cum summo dolore sentit. Compressis enim sanguinem ferentibus venis, omnes lymphaticae venae distenduntur et partem tumidam reddunt, id quod etiam in oedemate accidit, cui hic tumor fere similis est. Tandem cutis a subiecta tunica adiposa diducitur et multum inflatur, quare tumor mollior fit, in quo digiti impressi sedes manet, et e cute, si inciditur, spiritus cum sono fertur, quem ex rarefactis et putrescentibus humoribus nasci, a vero propius est.

§. 183.

Quod si membrum totum valentius premitur, id quod ab adstrictiori fascia, vel a ferulis nimis coarctatis incidere potest, oritur intolerabilis pruritus, in parte, quae sub vinctura est, tumor, ei similis, de quo mox retuli; et tandem perit dolor omnisque sensus,
et

et membrum ea parte, qua compressum erat, fit nigrum, aridum et quasi fumo induratum.

§. 184.

Si autem post scorbutum gangraena accessit, incipit ab extremis plerumque incipit. Nigrities cutim occupat, quae fere non sentitur, sed serpit et altius penetrat, membrum aridum fit, nigrum, haud multum foetidum. Odorem enim foedum continent sales sanguini in scorbuticorum corporibus admixti.

§. 185.

Perniciosissima gangraena est, quae oritur ex mortuorum viperarum, serpentium, animaliumque, quae virus habent. Breui enim, postquam vulnus illatum est, fit syncope et nervorum distentio, spiritus diffinit, et in omni corpore id, quod album esse debet, fit luteum. Tumor magnus fit et magna inflammatio, quae breui in gangraenam transit, summa celeritate serpit et morte finitur. Si nervosus locus ictus fuit, celerius rapitur aeger.

§. 186.

Quodsi vero maior nervus praecisus, aut spina medulla a vertebra fractis compressa est, oritur in membro putredo, quia vitalis humorum motus sistitur. Haec nullum dolorem adfert, ab interioribus incipit, et aegrum occidit. Pars omnis, ad quam nervi illi, qui laesi sunt, pertinuerunt, soluta est.

§. 187.

Sed ex his propositis signis et supra dictis (§5) scire licet, quae sint, quibus gangraena excitatur. Dissimiles vero causae sunt, quae etiam dissimilem curacionem requirunt. Nam multum distat illud gangraenae genus, quod valida vi excitatur, et ubi magnus febris impetus est grauiorque et acerbior dolor, ab illo quod languescens viribus, ex vitiosis humoribus

fere

ere sine doloris sensu oritur. Gangraena itaque fit, ubi magna obstructio est, seu ubi quaedam inflammatis superueniunt, quae obstructionem augent. Inter haec sunt ea, quae arterias venasque premunt. Quare gangraena occupat epiploon atque intestinum, si haec qua parte ex abdomine descenderunt, et hernia orta uit. Ob hanc causam etiam gangraena superuenire solet vulneribus collisis, nec non aliis partium nervosarum (44), si fibrae haud laxantur, vel vulnera ampliantur. Etiam paraphimosis, nisi tollatur, gangraenam genitali membro adfert. Concitator etiam sanguinis motus auget obstructionem in inflammatis (40. 43.), siue is internis, siue fricatione, exercitatione, immodico aestu externisque cieatur. Obstructio etiam increbrescit, si humores frigore (180), et impositis frigidis (39. 41. 55.), nec non nimio aestu (40.), coguntur.

§. 188.

Gangraenam etiam adfert omnis humor ex vasis suis missus et aliqua parte haerens (169**) vitiosus humor in hydrope et scorbuto, pus in abscessu. Virus etiam, quod morfu teloque venenato per totum corpus diffunditur, nec non illud, quod contagio pestilentium malignarumque febrium in corpus importat, humores ita corrumpit, ut breui putrescant (169**). Quae vero accidunt, si maior arteria (181), vena (182), nervus, spinaeque medulla (186) laesa est, iam retuli.

† Aliquando critica quoque metastasis in febribus est generis gangraenosi, atque adeo peioris, quam ubi purulenti tantummodo generis est, quo casu pedes aliquando decidere CELSVS noster iam memoriae prodidit.

§. 189.

Nulla gangraena leuiter terrere debet, nisi illa ex re quadam enata sit, quam tollere facile est. Semper enim

enim in sphacelum mortemque tendit. Maiorem vel spem maiusque periculum ostendunt ea, quae supra inflammatis relata sunt (60). Periculosissima omnium est ea, quae intus incipit (178), et quae ex humorum aliquo vitio (184. 185.) defectaque vitali virtute (179) oritur, vel, cui etiam, si aliunde orta fuerit, aliqui horum accessit. Nam ii, quos hydrops, aut tabes, aut scorbutus, male habet, gangraena multum periclitatur. In ea, quae ex inflammatione valentiori nascitur (172. 173.), quo vehementius agitantur arteriae, quo celerius procedit vitium, quo plura accedunt symptomata, eo maius subest periculum. Ex incisis etiam pustulis (173.) scire licet, quid sperandum metendumque sit. Si enim humor effertur limpidus et palidus, spes est; si vero is cruentus, flavescent, malus est; pessimus vero, si liuidus, subniger, et in quo magna foetidas est. Difficilem, plerumque nullam, curationem recipit gangraena, quae laesa spinæ medulla nec nou dissectis maioribus nervis, arteriis venisque orta fuit. Mortis etiam indicium est, si circa vlcus omnia arida fiunt et nigra. (Confer. 176.)

§. 190.

Sphacelus vero aliquando loca carnosio occupat, v. g. nates, femora. Hoc si incidit, et si non nimium alte et ad os usque vitium descendit, nec a causa mala ortum fuit, quandoque valentioribus auxiliis curari et mortuum a viuo resolui potest. Vbi vero totum membrum emortuum est, hoc nullam curationem recipit. Supereſt miſerum, ſed vnicum auxilium, illud, vt caetera pars corporis tuta ſit, abſcindere. Vbi iam ſphacelus inaiora vaſa tenet, is longe celerius procedit.

§. 191.

Quod ſi igitur magna vehemensque inflammatio ex magna obſtructione orta, in gangraenam ſpectat

(55. 172. 173.), ab initio eadem fere curatio adhibenda est, quae supra (61. 62. 63. 64. 69.) praecepta est. Sanguis etiam iterum mittendus, si pulsus magnus, aequalis, celer atque durus, vrina rubra, spumosa, foetida, lingua arida, fissa est, iuuenilis praeterea aetas, quae omnia significant, corpus nimias habere vires: Aluus ducenda lotionibus paulo valentioribus, quae fiunt, si cum mollientibus senna cremorque tartari ex lactis sero coquuntur, et iterum ac saepius in aluum immittuntur. Idonea etiam sunt apozemata ἀντιφλογιστικά (63). Ratione vero et obseruatione compertum est, corpora, quae sanguine redundant; optime ferre sanguinis missionem, eamque repetitam, iis vero, quae phlegmate abundant, alui ductionem vtiliorem esse. Nec alia medicamenta sumi debent, quam, quae calorem temperant, (64. 69.) Est tamen et hic aliquod discrimen. Sanguine redundantibus optima sunt acida, corporibus siccis nitrum cum absorbentibus, et iis, qui multum phlegma habent, decocta ex resoluentibus, herba rutae, scordii, veronicae, salviae, summitatibus centaurii minoris, floribus lauendulae, rosarum rubrarum, radice sassaparillae, scorzonerae, quibus herba acetosae admisceri potest. Victus etiam non alius sit, quam, quem supra praecepi (67):

† Haec a Platnerō dicta fere magis ad arcendam gangraenam faciunt, quam ad eam curandam. Saltem in his quoque casibus si iam aliquod gangraenae initium est, euacuationes quaecunque, si nimiae, facile nocent vires frangendo, necessarias illas ad coctionem materiae.

§. 192.

Extrinscus superimponenda sunt, quae discutiunt, expirationem iuuant (79. 80.), et quae impediunt, quo minus putre penitus descendat, et venis sorptum sanguini admisceatur. Quare aliena sunt reprimentia (76), sed opportuna fomenta, quae putredini resistunt, et molliendo humorem corruptum euocant. Est
vero

vero et illa obseruatio iam supra proposita (80) valde necessaria. Maior enim emollientium necessitas est, corpus adstrictum, locus neruofus, et maior partis intentio est, quare etiam in his cataplasmata aliis fomentis fere opportuniore sunt. Vbi vero tumor molli et caeteroquin corpus plenius et humidum, ibi et spiritus et sales epithematibus admisceri debent.

§. 193.

De omni genere medicamentorum, quae in gangraena extolluntur, haec tenenda sunt: Herbae amarae, et, quae inter eas primae sunt, herba absinthii, ruta, scordii, alliariae, abrotani, cardui benedicti, centaurii minoris, salviae, matricariae, menthae, si iis iufomentis calor accedit, illud efficiunt, vt locus, qui gangraena laborare coepit, expiret, qua re prohibetur ne humor quiescens tam celeriter putrescat, et ne vitium altius serpat. Herbae vero mollientes et linfarina possunt quidem putredinem augere, ast iuuant separationem putris atque mortui, et prohibent, quominus cutis aliaeque partes corruptique humores induram et omnia strangulantem crustam concrecant. Praeterea iis etiam humores ab interioribus euocantur. Nihil efficacius putre continet, quam sal et alcohol. Sales vero, si eorum nimium fomentis adiicitur, reddunt humores spissatos rigentesque, id quod praecipue efficiunt vitriolum, alumen, sal communis, et ex vegetabilibus gallae. Optimus est sal ammoniacus, qui melius per vitiatum locum penetrat. Corruptionem, si celerius cum summo foetore increfcit, coercet efficacius nitrum. Ad id vero maxime valet acetum acrius, quod etiam putrorem vltra serpere non finit, humores vero non ita nocenter cogit spissatque. Nec vinum alienum est, si cum amaris coquitur, eique acetum et ammoniacus sal adiicitur.

✧ Ad falia tenuiora pertinet spiritus Mindereri, Tartarus tartarificatus, Terra foliata tartari, et eius liquor, aqua marina, vel salinarum.

§. 194.

Alcohol, seu sic dictos spiritus chemica arte paratos carnes etiam a putrore vindicare, omnes norunt. Si vero soli, iique efficaciores, gangraena laborantibus imponuntur, nocent adhuc viuis et integris partibus, quia vascula contrahunt, adeoque rigida reddunt, vt illa facile rumpantur. Hoc vero si factum est, putrescentium sanies celerius in crustam concrefcit (173) duram, quae, nisi molliatur tollaturque, vitalem humorum motum in parte adhuc viua tollit, vasorum ora praecludit, sicque omnem resolutionem ac suppurationem cohibet. Diluere itaque et ex aqua coctis miscere oportet ardentis spiritus. Gummi, et inter caetera aloë myrrhaque etiam contra putredinem valent, si aceto soluuntur et aliis adduntur. Ast motum etiam eo concitant, quare non tam discussioni apta videntur, quam, si crusta iam emortua a viuo resolvenda, vel maior motus ciendus est. Lixiua acriora et saponem in gangraena, ex valentiori motu orta, huiusque initiis, aliena esse existimo. Sine graui noxa adhiberi non possunt terebinthina aliaque balsama, quae ad condienda cadauera, non vero ad vitalem humorum motum tuendum instaurandumque accommodata sunt, quippe quae omnem expirationem penitus coercent.

§. 195.

Chirurgus itaque, qui horum medicamentorum facultates exploratas habet, et aegri etiam naturam, nouitque, humidum magis, an siccum corpus sit, an validi nerui, an infirmi, an vires integrae, an fractae, qui etiam non ignorat, vnde morbus coeperit, gangraenae nascenti occursurus est. Nec ei difficile erit,

F

ex

ex vario remediorum genere fomenta componere quae tamen mutari subinde necesse est. Nam quaedam remedia incrementibus morbis, alia inclinatio conueniunt, et saepe a variis mutationibus, quae incidere solent, nouum consilium petendum, nouaque curandi ratio ducenda est. Prudentem igitur chirurgum oportet non tanti putare compositiones, à summis etiam autoribus propositas, quas illi, prout magis quid quisque sibi persuaserit, et prout cuius curatione cesserunt, quasi solas venditauerunt, sed praesidia petere, tum ab iis, quae experientia in ipsis curationibus docuit, tum a ratione et a medicamentorum facultatibus exploratis. Prosumt tamen frequentius fomenta si herbae illae amarae ex aequis portionibus aquae atque aceti, vel ex vino coquuntur, illisque et sal ammoniacus, et, si locus valde humidus est, spiritus quidam additur, vel si scordium, absinthium, ruta in vase clauso et sic dicta cucurbita ex spiritu ardente coquuntur, et expresso liquori acetum et sal ammoniacus additur.

§. 196.

Calida vero haec omnia admoueri oportet, maxime enim prodest calor, nocet omne frigus. Quo tempore etiam fomenta mutanda, vel, si inaruerunt, iterum madefacienda sunt, auertendus aeris afflatus (47), illudque obseruandum est, quod (38) praeceptum est. Quo fomentis calor diutius maneat, illis eminus adponi potest concalescentia tegula, non nimis tamen his membrum onerandum est. Quia etiam cutis, si putrescendo intenditur, medicamenta, quo minus descendant, prohibet, ea prius, quam haec admouentur, concidenda est. (80.)

§. 197.

His vero adhibitis non raro incrementum gangraena continetur. Si vero illa constitit et tumor se ad naturalem

alem duritiam coloremque inclinat (66), aegro danda sunt resoluentia, sorbitiones ex herba scordii, salviae, veronicae, radice cichorii, sassaparillae, nec non analeptica, et aliquid meracioris vini. Quae, quibus temporibus, et quantum eorum dari possit, ex ratione vel dauctae vel leuatae solutaeque febris apparebit.

§. 198.

Quod si vero gangraena eo processit, ut super utri serpenteque vlcere arida et intentioni cuidam proxima vel corrupta foetidaque crusta sit, medentis consilium ad illud dirigi debet, ut haec, moto, inter id, quod viuum, et quod mortuum est, pure, resoluitur. Num vero pus moueri nequeat, si locus sine omni inflammatione est, hanc non prorsus cohiberi, sed potius ad suppurationem dirigi expedit. Nocere igitur et in hoc casu possunt sanguinis missiones, alui ductiones, et alia, quae omnem febrem tollunt, vitalemque vim conseruant. Viribus potius, datis analeptics, succurrendum et aliqua febricula accendenda vel toleranda est.

† Quodcunque gangraenae genus sit, si iam notae quaedam sunt virium plus minusue fractarum, nocent omnia euacuantia, quia iis hoc fit, ut motus humorum a parte affecta retrahatur, fiatque putridi resorptio, serpatque putredo, neque corruptum a viuo separare possit natura, pus mouendo inter id, quod viuum est et illud, quod mortuum. Quam ob rem et tum, cum a vehementiori inflammatione gangraena coepit, non sine magna animi attentione aut sanguis detrahendus aut alius mouenda est.

§. 199.

Protinus vero, quo corrupto humori exitus detur, et medicamenta melius penetrare possint, ad corpus unum usque concidenda etiam crusta est. Plagae faciendae sunt, non solum rectae et maiores, sed et aliae transversae. Incidendae enim sunt transversae aponeuroses (44. 83.) v. g. musculi bicipitis in brachio,

musculorum rectorum abdominis, fascia lata femoris quo harum nervosarum membranarum intentio tollitur et plagae satis pateant. Summopere vero caendum est, ne praecidantur maiores venae, arteriae atque nervi, qui sub adipe conduntur.

† Sic incidenda et crusta sicca et vlcus humidum, ut ad vnum quidem perveniant plagae, sed id minime vulnere alioquin et novus dolor fit, et sanguinis iactura, et propterea putridi resorptio. Ex incisis locis exiens humor putridus diligenter vel pannis mollioribus vel spongia abstergeendus est, et munditiei opera danda, quam diligentissime.

§. 200.

Extrimsecus aliena sunt reprimentia et siccantia. Omne enim auxilium petendum est ab emollientibus et ab iis, quibus putrida curantur. Imponantur itaque crustae incisae cataplasmata ex mollientibus (91) additis etiam amaris (193), quae ex lacte coquantur. Si crusta valde putrida est, id quod ex odoris foeditat dignoscitur, acetum vel spiritus cataplasmatibus adiungi potest. In hoc casu vero commodissimum est, crustam incidere, et prius, quam cataplasma iniicitur eam calido aceto vel spiritu fouere, hisque etiam salerni ammoniacum addere. Semper enim medicamentum utendum, quae corruptionem coercent, alii vero praecipue iis, quae mitius hoc efficiunt, ne spissatis humoribus materia valentius retineatur et suppuratio cohaereat. (193. 194.)

† Emollientia cum amaris conveniunt praecipue tum, cum dolor partem adhuc tenet. Videndum tamen ne applicationes humidiores putredinem augeant. Qua de re non modo putredini adversa adicienda sunt, sed et cataplasmata ad debitam spissitudinem percoquenda, epithemata vero diligentius exprimenda, atque sic demum admouenda. Putredini adversa sunt vinum acidum, acetum, spiritus vel vini vel frumenti, aer fixus, puls aliqua fermentans, camphora, flores chamomillae, cortex, myrrha eiusque liquamen, aloe, sed haec omittenda si alium sollicitat. Emplastrum sulphuratum descriptum a SCHMUCKERO in Observationibus (*in chirurgische Wahrnehmungen, 2ten Bande*). In eorum defectu amarum
sim

suma quaelibet, et ex iis parata decocta maxime saturata, aut cataplasmata. Si gangraena humida est et incisiones factae sunt, humor putridus antea quam medicamenta admoveantur, diligentius remouendus et pars abstergenda.

§. 201.

Gangraenam vero stare, et pus inter id, quod emortuum et viuum est, moueri, significat crusta, quae depressior sit ac contractior, orae autem vlceris circa crustam, quae intumescunt, rubent et pure madent. Tunc autem confert, crustam iterum concidere et per diductas lateque patentes plagas demittere linimenta, puri subter mouendo et vlceri purgando idonea. Ad illud aptissimum est vnguentum basilicum, cui vnguentum Aegyptiacum, vel aliud Felicis Würtzii admisceri potest. Mercurius etiam aqua forti solutus et aqua plantaginis dilutus, seu liquor Bellostii vtilis est, in quem penicillum vel specillum linamento inuolutum, premittendum, et super crustam illumque locum, qui inter integrum vitiatumque est, teneri potest. Lintheolum etiam his madefieri potest, et super id, quod emortuum, iniici, super lintheolum vero cataplasma imponi. Non facile ad ea veniendum, quae vehementius erodunt atque adurunt. His enim et illud, quod viuum est, aduritur, et huic noua crusta inducitur, quam resolui aequae necesse est. Nec confert, crustam excidere, vel vi a viuo diducere. Cruenta enim sectione noua subinde inflammatio cietur. Si tamen interea, dum crusta mollietur atque resoluitur, quae partes emortuae dependent, illae forfice possunt praecidi. Nec spiritus aut balsama profunt, quae escharam ficcant. Cuilibet vero vsus ostendet, cur hoc, vel illo auxiliorum genere potius vtendum sit, et quamliu in aliqua curatione perseuerandum. Ex mutationibus enim, quae incidunt, medendi vias trahere oportet. Inimicum est frigus, quare, si illud laedere potest,

est, in eo conclavi, in quo curatur aeger, ignis communus esse debet. Ast immodicus aestus corpus, et ubi, et corruptioni, magis obnoxium efficit, quare non parum expedit, aera et temperatum esse, et purum.

† Aeris impuritas in nosodochiis plurimum facit ad gignendam gangraenam eamque augendam; quare praecipua rebus dentibus cura esse debet de aere mutando, conclavi repurgandis etc.

§. 202.

Quod si vero iam vlcus magis ad suppurationem spectat, ipsaque crusta vacillare videtur, nulla alia medicamenta imponenda sunt, quam, quae illam molliendo resoluunt. Sunt autem digerentia: vnguentum melle, terebinthina, quae vitello oui excipiuntur, sed digestivum: et ex aliis cognitis compositionibus, vnguentum basilicum et vnguentum aureum. Superdari etiam potest recens acetosae herba, butyro non salito subacta, nec non farinae, atque emollientia lacte cocta, donec cataplasmatibus temperaturam habere debeant. Si his tandem crusta resoluta fuerit, vlcus purgandum glutinandumque est. (Vid. infra de Vlcere colliso.)

§. 203.

Maximum interea praesidium a victus ratione petendum est, et omni cura enitendum, ut aegri vires valantur sustineanturque, quare omnia, quae eas minuire atque infringere possunt, studiosè vitanda sunt. Victus vero non alius esse debet, quam, qui ex gravissimo morbo convalescentibus necessarius est. Aeger nec superuacua materia onerandus, nec fame perdedendus est. Si vires superfluent, eo tempore, quo vlcus glutinandum est, leniora dari possunt cathartica, id quod fere necessarium, si illud valde humidum est.

§. 204.

At, si ex senectute, aliaue imbecillitate, gangraena enata est, omnia, quae in aliis casibus detrahendo iuvant, pestifera sunt. Nam in ea (179) sanguinem mittere, aluum ducere, et vires iam inualidas conuellere, hominem iugulare est. Danda sunt aegro, quae boni succi sunt; et alendo corpori idonea, iura feruentia, aromate, mace, vel nuce myristica condita, iura gelata, vinum dulce, idque feruens, aromate, cinamomo, caryophyllis conditum, ex medicamentis autem cardiaca, balsama vitae, sal volatilis oleosus Syluii, et prae caeteris cinamomum eiusque oleum. Naribus etiam adnoueantur, quae grato odore vires reficiunt.

§. 205.

Aduersus hanc potissimum gangraenam ex imbecillitate ortam summopere recentiores extollunt corticem Peruuianum cum analepticis dandum. Hoc enim solo quandoque desperatam gangraenam expugnatam coercitamque fuisse pluribus exemplis probant*.

* De eo peculiarem Tractatum scripsit DVGLASSIVS. Vid. Cel. VATERI Diss. de efficacia admiranda Chinchinae ad gangraenam sistendam, Witteb. Anno MDCCXXXIV. et Conf. *The Medical Essays* Vol. II. Art. XXXIV. p. 383. Vol. III. Obs. V. p. 35. et Art. VI. p. 43. Vol. IV. Obs. X. p. 47. Dari potest quarta quaque hora cortex ad drachmae dimidium cum duplo confectionis alkermes, vel cum syrupo caryophyllorum. Aeger quidam post uncias duodecim corticis deuoratas conualuisse dicitur l. c. Vol. III. p. 42.

† Corticis chinae vsus post auctoris nostri tempora in curationibus gangraenae aliorumque morborum non paucorum adeo inualuit, ut nostra aetate nihil eo nobilius celebratiusque in arte salutari sit, et medicamentum, quibus Priores antea vsi sunt, hodie fere ineffectum prae eo et vilia habeantur; rectene an perperam non facile dixerim. Nam Priores, qui amaris illis aliis, scordii, centaurei minoris, cardui benedicti herbis, floribus chamomillae Romanae, radice gentianae, corticibus malorum aurantiorum similibusque vsi sunt, aegrotantium quosdam sanitati reddidere, alios et plures quidem haud seruarunt. Sumusne nos hodie fortunatiores? De eo iudicium pene s

alios esto. Quicquid autem eius sit, neque cortex is neque illa alia ad omnem gangraenam et omni tempore gangraenae recte dantur. Efficat etenim cortex arteriarum micationes vegetiores, solidam compagem corroborat, siccat, in oris vlcerum inflammationem ciēt, putredini resistit, et pus malum in bonum vertit, adeoque variis modis vire corporis excitat augetque, atque propterea in multis gangraenae curationibus mirifice prodest. Verum aut nocet aut certe non iuuat, si arteriae vehementius micant, si in loco gangraenae vicino inflammatio est, si crusta sicca est. Indicatur praecipue a pulsu paruo et debili, a notis febris putridae, siue ea gangraenam fecerit siue ab ea profecta sit, indicatur etiam ab vlcere gangraenoso humido, a laxitate et pallore atque tumore partium gangraenosum locum ambientium. Virtus eius, si magna quidem est putredinis vis efficacior redditur adiectis spiritus Sulphuris vel alius acid mineralis guttulis aliquot. Si laxitas compagis solidae magis peccat, alumen, vitriolum artefactum efficaciam eius auct. Si vero ingens virium imbecillitas est, cardiaca si dicta admiscantur; denique si neruorum spasmi simul sunt moschus, radix valerianae maioris, immo etiam opium iungitur, maximeque hoc, si dolores in affecta parte multi sunt et vehementes. Exhibetur vero cortex vel in pollinem contritus tenuem, vel specie infusi, et haec quidem forma imbecillioribus aegris accommodatior videtur, quoniam in debili corpore pulvis difficilius soluitur subigiturque. Infusio autem sit vel frigida vel feruida aqua affusa. Si prior modo medicina paratur, adhiberi vinum vel aqua potest a cardiacis destillata. Si feruida sit infusio, quaedam ex supra dictis adiiciuntur et bulliens aqua affunditur. Quibus pulvis magis placet, hi eum cum syrupis, conferuis et roob variis miscere atque sic electuarii speciem componere possunt. In ipso autem vsu corticis, qualicunque, videndum, ne alui fluxus, si quis sit, vires deiciat. Sapienter enim CELSVS dudum dixit, gangraena affectorum *ventres esse comprimendos*. Quod si igitur cortex fluxum alui faciat neque iam ultima aegro infirmitas est, cum cortice aliquo ex liquido laudano Sydenhamii, vel simili opiato dari debet. Sed vero corticis vsus ad id genus gangraenae, quod a primis viis crudo et putrido obfessis, in caritate annonae aut aliis inepta vorandi occasionibus nonnunquam fit, inutilis est ab initio, nisi cum eo aluum perpurgantia simul adhibeantur, aut haec antea data sint.

§. 206.

Extrinssecus autem ad vitiatum locum conuertendus incitandusque sanguinis impetus est. Membrum itaque

taque erebrius perfricandum, ei aptandae imprimendaque cucurbitulae, imponendae cantharides sunt. Super vitiatum vero locum superhaberi potest emplastrum molliens, quod acriori stillatio oleo conspergi potest. Proficiunt enim prae caeteris olea caryophyllorum et cinnamomi spiritu vini excipienda, quae loco, qui inter vitiatum et integrum est, et ipsi etiam crustae, prius concisae, illinuntur, et post cataplasma emolliens superdatur.

Vid. illustr. HOFFMANNI Dissert. de Sphacelo ex causa interna feliciter curato, Halae, C1810CCXVII.

§. 207.

Si acre et penetrabile frigus membra adurit (180), illud humores omnes cogit, eorumque figuram mutat, fibras vero adstringit coarctatque, quibus tandem omnis vitalis motus sistitur. Vbi vero extremae partes sic inalgescunt et congelantur, maior sanguinis vis fertur ad cerebrum, in quo vasa distenduntur rumpunturque, unde sopor, et tandem lethalis apoplexia oriri potest.

§. 208.

Protinus opitulari debet chirurgus membris frigore rigentibus, illaque in viuum calorem reuocare. Hoc vero fit admotis quibusdam, quae paulo maiorem calorem in se habent. Vfus enim docuit, si gelu praefricti humores magno calore repente solvuntur, eos rarefactos rumpere vasa, et sic membro immedicabilem noxam mortemque adferre. Calor paulo maior, quam in glaciali frigore rigentibus membris, est in omni, etiam frigidissima, aqua, modo haec nondum congelata sit, nec non in niue; quare membra gelata vtiliter in frigidam demittuntur, vel niue aliisque gelidis operiuntur, quae contractos densatosque humores pedetentim et ita solvunt, ut motu vitali iterum cieri possint. Nec multo igne percalefactum

cubiculum sit, in quo aeger curatur. Expedit etiam membris, postquam regelata sunt, frictionem adhibere et sic cutim intentione infirmatam durare. Intus mat aeger vinum meracius feruens, vel cereuisiam lentiolem feruentem, quae potionem aromatate condere debent. His, quae vires recreant et restituunt, adhiberi possunt alexipharmaca, quorum salubris effectus est, sudorem per omne corpus diffundunt. Huius causa etiam aeger continere se debet et stragulis co- tegere.

† Pars gelu adusta et post calore subitaneo excepta multum admodum intumescit, rubet, liuet, dolet, atra fit, et per varia frigoris vehementia, vel extrinsecus tantum vel per- tissime corrumpitur. Ne tum quidem omittenda sunt quae Auctor praecipit.

†† Aqua frigida et nix, et haec quidem praecipue non modo singula membra gelu acri adusta, sed et totum corpus omni sensu motuque priuatum atque adeo mortuum visum reuocare ad viuum possunt. Si nix non est, aquae subinde ad- iicitur glacies, ne aqua nimium tepescat. Si totum corpus ita curatur; os et nares, maxime si aqua utimur, extra hanc emineant. Vtroque etiam casu cauendum est, ne rudior tractatione partes cartilagineae aut ossa longa frangantur. Frigus enim nimium ossa fragilia reddit vel in bene valentibus. Atque hac prudentia maxime opus est, si partes congelatae, niue non modo conteguntur, sed et simul frictione vis eius efficacior redditur. Si his factis signa quaedam vitae animaduertuntur, naribus offertur aliquod irritans, v. c. spiritus salis ammoniaci, initio eminus postea cominus; nares faucesque irritantur plumula, aer per os, compressis naribus, inflatur, fumus herbae nicotianae in aluum mittitur. Auctis iam vitae signis frictio corporis fit, et aqua paulo minus frigida adhibetur, et paulatim homo in conclaui paulo temperatiori et lectulo ponitur, fiuntque reliqua a PLATNERO dicta.

§. 209.

PERNIONES autem fiunt, si frigus non ita valenter infestauit membra, et vitium in cute consistit. Modico dolore, intolerabili pruritu et ardore vexantur aegri, id quod etiam accidit, si quaedam membra, quae olim gelu riguerunt, iterum subito frigore excipiuntur.

tur. Haec etiam grauiter plerumque afficiuntur, si tempestates mutantur, illaeque non aequales sunt, sed multum variant. In his enim non sanguis gelu densatur, sed alius humor, qui minoribus fistulis continetur, lymphæ, et, quod per cutim excernitur, serum. Inde, si malum paulo altius insedit, pustulae oriuntur, et post exulceratio, quae difficiliter sanescit.

† Perniones facile contrahunt homines debiliores, infantes, foemellae, iuuenes, otiosi, corpus nimio calore et vestibis continuo fouentes, itemque cacochymici. In omnibus enim his sanguis eiusque riuuli facile a frigore congelante in principia sua dissoluuntur, et gelu consistentes in vasis suis quiescunt. Vis frigoris solidas fibras contrahit etiam. Subito admissus deinde calor repente expandit quiescentes humores, a quibus vasa minora et fibrae aut rumpuntur, aut saltem robore suo priuantur. Si hoc fit, tantummodo tumores oriuntur, si illud, cutis pustulis exasperatur, quae saepius in vlcera abeunt, quae non pus, sed mucosi quid habent, et curationi pertinaciter resistunt, ad cicatricem perducta facile refricantur, et interdum non nisi accedente calore vernali ad sanitatem perueniunt. Perniones quoque sequente hyeme plerumque redeunt. Si malum vehemens est, pars non modo laborat et ad vsum inepta est, sed et vniuersum corpus afficitur, maxime si ampla et diuturna vlcera accedunt. Cum iis etiam ossium caries est. Auertuntur perniones vitando causas supra dictas. Si iam partem tenent, nix aut si ea non est, aqua gelidissima, aut vegetabilia congelata aliquoties die imposita, multum prodesse solent, nisi fortasse frigus quosdam offendat et tussim ventrisque dolores moueat. Si per haec tumor non refedit, sanguis crassus, e parte affecta euocari potest, vel hirudines vel cruentas cucurbitulas adhibendo. Praeter medicamenta a PLATNERO proposita laudantur balsama naturalia quacuis vitello oui soluta, seuum ceruinum, butyrum, nucleorum cacao aliaque oleosa et pingua, cera et resina, quae inter se remixta in speciem cerati, vnguenti, emplastri varie componuntur; item aqua vegetabili-mineralis, aqua traumatica Thedenii, Spiritus camphoratus crocatus, essentia succini, spiritus saponatus multaue alia. Siccioribus et pernionibus durioribus priori, laxis et pernionibus mollioribus postremo loco dicta conueniunt. Vt ne hyeme sequente perniones redeant in pedibus, hos per aestatem, autumnum et hyemen aliquoties in hebdomade aqua calida fouere cubitum iturus debet, et aduersus frigus diligenter nunquam non munire. Hoc a CELSO nostro laudatum

datum remedium opem mihi ipsi certam attulit. Hi qui vel iam ante admissum frigus prauitate succorum laborarunt, aut ab eo ita laesi sunt, sanguinem purgantia intus sumant. Quodsi perniones in vlcera abeunt, pars quiescat; aduersus frigus diligenter custodiat, molliter habeatur; vlcus purgetur balsamo Arcaei, impletum siccetur vnguento vel emplastro quodam saturnino. Si in vicinis locis tumores sunt, adhiberi iis quaedam possunt ex antea dictis. Si diuturna fuere vlcera, fonticulus in loco aliquo necessarius est, aut certe adhibenda ea, quae sanguinem purgare dicuntur, itemque aluum purgantia, diuretica et sudorem moventia.

§. 210.

Auerti potest hoc malum, si membro, quod olim gelu infestatum fuit, eo tempore, quo hybernium frigus impendet, illinitur oleum petrae, vel oleum terebinthinae, cui aliquid olei adijci potest, quod ex semine raparum exprimitur. Simile oleum etiam chartae illitum super locum commode imponitur. Si autem frigus iam illud adussit, et pustulae ortae fuerint, *ἐμπόγισον* est, si rapae congelatae conteruntur et imponuntur. Rapae etiam temperari possunt oleo lini, vel alio molliente, vel butyro non salito, quae igne liquecant, donec habeant linimenti temperaturam: Vlcers si fiunt, illa curantur, vt mox de ambustis dicemus.

§. 211.

Si tanta frigoris vis fuit, vt membrum seruari non possit, illud praecidi oportet. Non omittenda observatio est, aliquando maximum et penetrabile gelu etiam ossibus vitium attulisse, maxime, vbi illa iuxta articulos rariora sunt. Difficilius haec sanescere dicuntur, nisi etiam ex osse illud, quod gelu adustum est, tollatur,

Illud crebrius obseruatum fuit in Suecia post reditum exercitus ex Noruegia, resque ibi Anno huius seculi decimo octauo minus feliciter gestas. Magnus enim numerus militum frigore periit, plures alii truncos artus habuerunt. Vid. Laur. ROBERG Dissert. Chirurg. de Pernionibus, Vpsaliae.

liae, Anno CIOIOCCXXII. Addita est tabula, qua ossa frigore adusta vitiatque expressa sunt.

† Id quod illo tempore accidit in plerisque aliis expeditionibus bellicis accidere solet, quae hyeme fiunt; neque nunquam pacis tempore in singulis hominibus penetrabile frigus membra tam grauiter adurit. Ad ressecanda autem membra non protinus festinandum, sed antea incidendo carnes et adhibendo putredini aduersa curandum est, vt vis vitalis in partem reuocetur. Quae sine tum quidem redierit, id quod seruari nequit, ressecari debet.

§. 212.

Gangraenae, quae a compressis dilaceratis arteriis (181), venis (182), nervisque (186) enata fuit, vel nullam, vel non aliam curationem recipit, quam, si id, quo vitales humorum motus impediuntur, tollitur. Si vero gangraena membrum occupat, quod ferulis adstrictioribusque fasciis compressum et fere aridum factum est (183), illud aliquando, nisi penitus emortuum fuerit, sanescit, si digerente vnguento superinungitur et simul manibus leniter pertractatur, post vero adhibita eadem perunctione crebrius diuque perfricatur *. Si membrum, ex hac occasione iam sphacelo occupatum est, non ita ad chirurgiam illam arduam, qua membrum praeciditur, festinandum, quia saepe id, quod emortuum est, ab integro sponte soluitur. Os etiam, quod detectum fuit et vitiatum, vltro plerumque a parte sana recedit.

* Vid. singulare huius rei exemplum in C. A. R. Sc. MDCCII. p. 270.

§. 213.

Si scorbutus adeo inualuit, vt membra gangraena aborent, parum ad salutem proficiunt medicamenta, nisi adhibeatur victus conueniens, ad cuius rationem cura medentis potissimum transferenda est. Est tamen in hoc morbo etiam quaedam diuersitas. Si enim hominem, qui scorbutus aeger est, febricula extorret, quae sitim accendit, et animam foetidam reddit,

dit, si vlcera etiam impura nigraque sunt, horumque caro corrupta est atque mali odoris, si vrinam crassam mittit atque foetidam, conducunt iuscula pullorum cohortalium, cum quibus miscetur acidus succus citreii mali, vel herbarum recentium acetosae et acetosellae. Praestari etiam copiosior ptisana debet (64), cui similis succus horaeorum vel hydromel adiectum est. Aluvus etiam, si per vires id licet, tamarindorum decocto (63) crebrius ducenda. Vbi autem scorbutus sine febre est, vlcus vero sordidum et pallidum, cochleariae recentis, vel nasturtii et fumariae, trifolii fribrini, et aliarum herbarum, quibus a scorbutico nomen est, decocta opportuniora sunt. Nihil vero salubrius, nihilque magis necessarium est, quam aeris mutatio. Nam pessimum est aegro caelum, quod aegrum fecit. Extrinsecus fomentis et cataplasmatis etiam addi possunt illae herbae, et adhibenda auxilia, quae ad locum affectum humores euocant. Fomenta melius ex vino coquuntur. De gangraena ex morfu venenato (185) vid. infra de vulneribus venenatis.

† Gangraena vero scorbutico laborantibus vix non semper minatur mortem; neque facile ita aegrotantes alui solutionem ferunt, adeo ut nec illa acriora sic dicta antiscorbutica salutem afferant, si aluum nimium mouent. Ad id ipsum igitur animus aduertendus est, si herbae eae recentes iusculis incoctae aegro dantur. Si aliis generibus cacoehymiae nomen scorbuti imponitur, eis accommodanda medendi ratio est, petenda quidem a natura vitii, quo humores inquinati sunt. Alui solutio autem necessaria esse potest in iis, quorum primae viae crudis putridisque laborant, ut in militibus gregariis non raro fit.

§. 214.

Quod si sphacelus sedes occupat carnosas (190), membrum autem praecidi nequit, aliquando vitiatum tolli potest, si maior vis adhibetur. Hic vero nihil interest, an satis tutum praesidium sit, quod vnicum est. Maior autem spes esse solet, si vitium a non ita mala

ma causa ortum fuit. Concidere itaque oportet id, quod inter integrum atque vitiatum est, et ipsam etiam crustam ad viuum vsque, per plagas vero demittere medicamentum, quod putrem carnem vehementius erodit atque exest. Inter haec extollitur acre lium, quod paratur ex calce viua et cineribus clauellae inter se in loco subterraneo liquatis. Etiam adhiberi potest spiritus salis ammoniaci cum calce viua, quor Bellostii (201), butyrum Antimonii. Veteres limoto ferramento locum semel iterumque adusserunt, qua efficaciori chirurgia id, quod vitiatum est, aridum fit. Si sphacelus constitit, vlcus purgandum, attriendum, et ad sanitatem perducendum est.

† Ad animum hoc loco reuocari debent, quae supra praecepimus, h. e. incidendum quidem esse vlcus tale putridum ad viuum vsque, sed tamen sic, ne cruentatio fiat. Si multa humiditas est, in plagas factas pulueres sicci amarorum demittantur, epithematis vero adiciantur alumen, vitriolum, plantae adstringentur. Quae et adhibenda sunt, si homo laxioris habitus extremas corporis partes gangraena valde humida, tumore insigni concomitante, affectas habet. Si in valde carnosae gangraena altius descendit, licet quosdam sequi, qui superiora vlceris, valde putrida, secando tollunt. Sed ne tum vulnerari viuae carnes debent. Denique verbum in fine huius capituli adiicio de amputatione artuum gangraena affectorum. Si omnia, quae haecenus praecepimus, frustra adhibita fuere, rationi conuenit resecare, quae seruari nequeunt. Resectio autem tum demum locum habet, cum iam stat gangraena. Et quia homo ita affectus viribus vitae non abundat, et resectionem in viua parte vix fert, in limitibus mortuae partis resectio fieri debet. Separatio enim mortui a viuo a sola natura expectari non potest, nisi in articulo fortasse serpere desierit gangraena. Resectione autem saltem hoc consequimur, ne putror reliquo corpori denuo noceat. Si in media artus parte steterit gangraena, vellesne committere rem omnem viribus naturae? et rusticus expectare, dum defluet omnis?

A D V S T A.

§. 215.

Cum non magnum discrimen sit inter adusta et inflammata, et cum similis etiam curatio iis adhibeatur, sequi videtur, vt de his dicamus. Corpus vnum vero adurant ignis, fulmen, pulvis pyrius, ignem concepit, metallum quoduis candens et liquatum, calx, si illa aqua accenditur, omne fluidum feruidum atque liquatum, aqua, oleum, butyrum, sanguis, cera, pix, et similia. Omnia haec corpora, tum fluida, tum solida, quo maiorem ignis vim habent, et quo magis solida sunt ac densa, fluida vero, quo magis tenacia ac crassa, eo vehementius atque celerius corpus adurant. Multum etiam interest, si membrum igni et corporibus, quae ignescunt, propius fuit ac motum, et si iniuriae illi vel diu, vel parum, fuit expositum.

§. 216.

Ast et adustorum magna diuersitas est. Si enim leuior noxa est, pars rubet, non tam dolet, quam vehementer prurit, nec epidermis abscedit, quamuis frictio adhibeatur. Quae sic adusta sunt, ab inflammatione non differunt, et ea similis curatio ad sanitatem perducit.

§. 217.

Plus mali est, si in membro tumor est, intolerabilis ardensque dolor, cutis vero exasperata, pustulisque maioribus impleta. Haec species difficilior, et non, nisi pure moto, sanescit.

§. 218.

Vehementior noxa est, si et cutis et adeps aridae sunt, siccae, et aeger earum intensionem sentit, si pustulae subnigrae sunt, et sub his vlcus nigrum vel liuidum

um, cutis fere sine sensu est. Haec eam curationem desiderant, quae in gangraena necessaria est. Vitium enim ab integro resoluendum est.

§. 219.

Membrum, si igne ita perustum fuit, ut ei, si etiam os usque scalpellus demittitur, nullus sensus sit, phacelo laborat.

§. 220.

Inter haec tamen aliquod etiam discrimen est. Si oxa infertur candente liquatoque metallo, vel igne, et fulmine, omnia densantur et crusta fit arida, contracta intentaque. Si vero illud sit aqua, vel alio ruidi liquore, vlcus magis humidum fit, exulceratio ucosa.

§. 221.

Loca nervosa, membranae, nervique maiores, si lacerantur, propter summum dolorem maius periculum habent. In glandulis, multum humorem habentibus, mala vlcera fiunt. Pueri, senes, et quibus mas corporis habitus est, difficilius ad sanitatem perveniunt. Si oculus, et praecipue tunica cornea, aduentibus laesa fuit, lumen amittitur. Si totum corpus, tamvis non ita vehementer, ambum est, illud multum periclitatur, quia omnis perspiratio tollitur. Vbi leps comburentibus exesa est, illa haud renascitur (70), et cicatrix concaua fit atque foeda.

§. 222.

Aduersus primam speciem (216), et si parum adhaeret et integra cutis saltem rubet pruritque, expedit; totius membrum igni eminus adiouere, vel in ferulam demittere, quae res efficit; ut humores, qui concurrere coeperunt, soluantur. Proficiunt etiam primentia (76. 77.), acetum acerrimum, atramentum et vitriolum aqua solutum, nec non acetum, ex quo

quo lithargyrium decoctum fuit, item sal cum aceto vel vino. austero, vel etiam spiritu vini. Fere optimum est, si vulneraria aqua admouetur et linteolum ea madens imponitur. Si liquor talis deest, spiritus ardens cum multa aqua misceatur et superhaberi poterit. Spiritus enim ardentes valentiores densant contra huntque cutim, huiusque vascula (194). Si iam cutis pustulis minutis plena est, imponi possunt cataplasmata emollientia, ex aqua cocta, quibus parum spiritus ardentis adspersi potest. Si malum leuius est et parte exigua, illud vix intus sumenda medicamenta considerat. (62. ad 70.)

† Si pars adusta ardente dolore tantum afficitur, ea quae in lideis partibus robur addunt, profunt, ut illa ab Auctore laudata, itemque solutio sacchari saturni, aqua Goulardi, aqua traumatica Thedenii. Si dolor nimis vehemens vel in parte sensibili vel homine teneriori et mobiliore est, lenientia adhibenda sunt v. c. cremor lactis acidus dictus a nostratibus h. e. is, e quo butyrum paratur, itemque oleum lini, si non est in promptu, aliud quoduis recens, non rancidum, identidem admotum. Si pars adusta latior est, necessaria esse potest sanguinis missio. Atque sola lenientia applicanda sunt in locis, ubi cuticula in vesicas eleuata est, si haec quidem antea incisae sunt, *relicta* tamen *epidermide*. Felicitum quoque optimum est, oleum lini, aut vnguentum quoddam saturninum, sed et id recens paratum esse debet. Nisi ipsa subiecta cutis destructa simul sit, epidermis renascitur, sine cicatrice. Sin cutis in locis quibusdam altius adusta est, vlcera fiunt, ubi adeo cicatrices fiunt. Nec haec loca irritantibus medicamentis ab initio, dum multus dolor curanda sunt, sed lenissimis.

§. 223.

Vbi vero maiores peioresque pustulae sunt, vnde cutis arida contractaque (217), pus moueri necesse est. Ad id valent vnguenta. Inter notas compositiones est vnguentum nutritum, quod ex aceto felicitum quod lithargyrium excepit, cui additur oleum. Felicitum etiam alia compositio, quae nomen ab autore, Barbezie, habet. Cepae etiam, si cum butyro non salito felicitunguntur.

untur, vel, si illae miscentur cum sale et sapone Veto, atque haec oleo quodam, ad id idoneo, v. g. raurum, liliorum alborum, et adipe excoquuntur, imoni queunt. Super vnguenta vero, vitiatu loco illi, vel mediante linteolo imposita, dari possunt cata-lasmata, quae emolliunt. Si omnia putrida sunt, et maioris corruptionis metus est, adici possunt, quae corruptis medentur. (193. ad 196. 200.) His omni-is enim efficiendum est, vt pus moueatur, vitiatum mortuumque a sano resoluatur, et vt dolor leniatur.

§. 224.

Quod si vero ignis magna et penetrabilis vis penis descendit (218), necesse est, vt crusta cadat, et pus purum fiat, ad quod eadem auxilia adhiberi possunt, quae (198. ad 201.) praecepta sunt.

§. 225.

Vbi vlcera purgata sanescunt, necessaria sunt, quae carnem alunt et vlcus implent, aliena vero, quae siccant et reprimunt. Enitendum enim est, decoris cau-, maxime in facie, vt cicatrix, quantum fieri potest, crescat, et vt laesum membrum sanitatem, qualis esse potest, recipiat. Vlcus vero nutriunt balsama, et etiam aliiis myrrha cum albo oui liquata.

† Liquamen myrrhae, quod dicunt, solum id, ego quidem ad vlcus nutriendum non adhibuerim; nimium enim siccatur. Vnguenta balsamica praeferenda sunt.

§. 226.

Si digiti ambusti fuere, illi aliquando, propter communem exulcerationem, nisi congrua adhibeatur fascia, coalescunt. Non alia vero fascia idonea est, quam, quae figuram chirothecae habet, vix illa habena, quae febrioribus circumductionibus digitos comprehendit. Haec enim sine graui exulceratarum partiumensione haud iniicitur. Si concreti sunt digiti,

oportet eos scalpello diducere. Crebrius etiam ea mala cicatrix curuos reddit, id quod vel tendinum, vel cutis, vitium est, in quo casu tentanda sunt mollientia. Confert itaque quantum id dolor permittit, digitum mouere atque extendere, et eos, etiam curatos, crebrius in tepidam aquam vel oleum demittere, illosque oleo, vel vnguento, multum perfricare. Eadem curatio etiam cicatricibus concauis, nec non articulis, adhibenda est, si iis ex simili noxa rigor mansit.

† Digiti adusti non modo a malis cicatricibus curui redduntur, sed quoque a liberali vsu aquae vegeto-mineralis Goulardi.

§. 227.

Si ad ambusta vehemens inflammatio accedit, circum ipsum vlcus imponi possunt reprimentia (76. 78.), discutientia (79. 80. 81.).

§. 228.

Oculum si materia quaedam ignea laesit, in illum demitti debet cremor ex semine cydoniorum paratus, quod cum aqua rosarum terendum est. (137.) Si corneae pustulae insident, hae incidendae sunt vel acu, vel ferramento ad id aptato. *Fig. VI.* Si accedit grauius inflammatio, alia auxilia requiruntur. (Vid. de Ophthalmia.) Vlceribus, si in cornea manent, prodest vnguentum de tutia.

† Ad ambusta valde laudatur aqua traumatica Thedenii; eius vsu omnino videatur THEDENIVS l. c.

†† Si oculus et palpebrae adustae sunt, et pus alunt sumopere cauendum, ne palpebrae inter se vel cum oculo concrecant; interponenda est particula vesicae tenuior (*Gold-Schläger-Blase*). Si partes genitales ita affectae sunt, simili prudentia opus est. Si collum ita laesum est, cauendum est, ne obstipum fiat. Itaque statim atque per dolorem licet, adhibita fascia caput, quam fieri potest, erectum praestandum est, antequam vlcus ad cicatricem perueniat.

AMPVTATIO MEMBRORVM.

§. 229.

Membrum, quod totum vitiatum est, et seruari non potest, resecandum est, ne pars sincera trahatur.

Si os immedicabili carie, vel παιδαρθεροάκκη exesum est. Si maior arteria, vel vena, dissecta fuit. Si post subitam causam, ictum grauiorem, os penitus collisum, magna inflammatio et gangraena metuenda est, saepe praestat, ad hanc chirurgiam protinus confugere, quam illam infractis viribus suscipere.

§. 230.

At enim haec chirurgia non prius experienda est, nam, si tantum mali subest, vt medicamentis vinci non possit. Neque tamen illa omni tempore, neque omni vitio, experienda est. Nam si gangraena, vel alignum vlcus et ossis vitia, adeo inualuerunt, vt omnes in corpore succi iam corrupti sint, si aeger iam debecillus factus est (176), vel, si ex longo morbo eum debiles male habet, nec haec chirurgia eum ad salutem reducere potest, sed mortem maturat. Quandoque tamen satius videtur, anceps remedium experiri, quam nullum.

† De amputatione artuum maiorum vel necessaria vel non necessaria et inutili legatur, BILGVERI *Diff. de amputatione artuum varius instituenda seu potius abroganda*; maximeque SCHMVCKER in *miscellaneis obseruationibus* Tom. I. (*Vermischte chirurgische Schriften, herausgegeben von Joh. Lebrecht Schmucker; im ersten Bande.*) His a SCHMVCKERO propositis nonnulla opposuit IO. GOTTL. RICHTERVS, Vir Cl. in *Biblioth. Chirurg.* T. IV. Sed ad haec SCHMVCKER quaedam reposuit in praefatione Tom. II eiusdem libri. Ad scriptiones istorum virorum, doctas illas, equidem iam lectores remitto, ne prolixo sermone in libro generis compendiarii fastidium creem iunioribus, cramben bis coctam si apponam. Non otiosum prorsus auditorem huius; nostra aetate de amputatione agitatae controuersiae me fuisse, haud pauci norunt. Sed etiam legi possunt, quae de materia hac scripsit Auctoris nostri Filius ERNESTVS in Supplementis Parte prima.

G 3

§. 231.

§. 231.

Si vero membrum praecidendum est, semper aliquid ex sana parte excidi oportet. Nonnulli veterum qui vasa haud comprimere nouerant, et qui metuerunt, ne aeger sanguinis profusione sub ipso opere moreretur, aliquid ex aegra parte reliquerunt, et haec post factam praecisionem vehementius adusserunt, quod verò et periculosum est, et crudele.

Vid. de varia methodo membra amputandi Comm. A. R. MDCCXXXII. p. 285.

§. 232.

Digitus tollitur, si is scalpro excisorio submittitur et hic malleo ligneo percutitur. Vel praeciditur forcipe *, vel, id quod optimum est, scalpello, quo articulus exciditur. Excidendi ratio haec est. Alius horum cutim a digito, quantum potest, reducit. Nam expectat, hanc sub eiusmodi curatione laxam esse, ut post sectionem os nudatum quam maxime ea contineatur. Incidenda sunt scalpello omnia, ad os usque, sic, ut haud contra os sanum eiusque cartilagineos capitulum id fiat, sed potius aliquid ex osse, quod commendum est, excidatur. Sectio incipit a supremo digito, qui prius inflectendus est, ubi vero scalpellum ad medium usque articulum venit, digitus sub ipsa sectione extenditur, et, id quod superest, praeciditur.

* GARENGEOT *des Instrumens* T. II. p. 237.

§. 233.

Si digitus totus demendus est, cutis et reliquae quae inter metacarpi ossa sunt, findi prius debent. Cutis, quantum fieri potest, seruanda, quare sectio propinquior fiat digito vitiato, quam ei, qui seruandus est. Contra quorundam digitorum articulos posita sunt ossicula, quibus nomen a sesami semine est. Illa etiam excidenda, non relinquenda sunt. Quia praecidenda sunt musculi

musculorum tendines vaginis suis, quibus comprehensuntur, constringuntur (143), quae res magnam morere potest inflammationem, commodissimum est, vaginam secti tendinis forfice paululum findere.

§. 234.

Non ita periculose fluit sanguis, in cuius cursu duersus inflammationem auxilium est. Si tamen pro-
usionem timet chirurgus, satis ad sanguinem sup-
nendum valet alcohol vini. Arteriae iniectis pannis
e latere comprimendae sunt, vt ora praeclusa habeant.
Si necessitas postulat, illae apprehendendae et deligan-
lae sunt. Nocent alia, quibus vulgo sanguis sistitur.
Vid. de vulnerum haemorrhagia.)

† Non tamen semper possumus sanguinem sistentibus carere.
Non semper enim licet retracta vasa e latere comprimere;
neque nimis morbidorum corporum vasa patiuntur sese
constringi; rumpuntur enim; itaque iniicienda tum est fa-
rina multa pulueri gummi arabici mista, et si sanguis valde
resolutus est, intus danda incrassantia, tanquam idem gum-
mi, farinosa et similia, cum spiritu vitrioli.

§. 235.

Supra frontem ossis integri cutis inducitur, vt ea
quam maxime vndique contegatur, reliquum linamen-
tis, seu puluillis, contegitur, superque hos ponitur
pannus multiplex paulo densior, superdatis spleniis,
quae vulnus in speciem graecae literae X decussant.
Super haec autem iniicitur fascia, quae latitudinem
digiti habet. Ea incipit a carpo, adscendit ad vulnus,
dque decussatim contegit, et imposita linamenta at-
que splenia deligat. Sub finem fascia per brachium
ad humerum adscendit. Amplectitur enim splenium,
quod contra arteriam brachialem imponitur, quo ni-
nius sanguinis aditus ad vulnus ipsaque inflammatio
uertitur. Brachium mitella excipiendum est, quae
angustis capitibus collo iniicitur, vt brachium ita com-
mode ex ceruice suspensum sit.

§. 236.

Si manus refecanda est, fecatur vlna et radius: duos latos digitos ab articulo, nunquam metacarpus vel carpus. Si gangraena iam vltra manum processit, praecidi potest medium brachium.

† Manus ex articulo exsectionem praefert TRE COURT, eaque chirurgiam feliciter adhibuit. Vid. *Mémoire et Observations de Chirurgie par TRE COURT. Paris 1769.* Et: resectione artuum aliorum ex articulo probabiliter dirigit BRASDOR in *Mémoires de l'Académie de Chirurgie* Tom. V.

§. 237.

Ante omnia necesse est, vt apparatus, qui ad hanc chirurgiam requiritur, ordine dispositus in promptu sit. Sunt vero necessaria: 1) Fascia tortilis, quae componitur α) ex habena glomerata, quae arteriam brachiali obicitur, β) ex splenio, quod et brachium et istam habenam comprehendit, γ) funiculo, vel fascia contorta, quae bis circa brachium illudque splenium remissior voluitur, et post nodum accipit, charta glutinata densiori (*Pappe*), vel duriori corii super quod intorquetur ϵ) bacillum. Quia hoc vitaturae genus non arteriam solam premit, sed totum membrum valentius constringit, a PETITO * machina inuenta fuit, quae nunc torcular appellari consuevit, quod vero post ab aliis varia ratione immutatum et emendatum fuit.

* Vid. Comm. A. R. Sc. MDCCXVIII. c. 252. In ea machina desiderari posse videtur stabilitas. Ea enim membro imposita fere vacillat, et leuiter commota penitus inclinatur, id quod non sine periculo foret. Eam immutauit MORANDVS. Vid. GARENGEOT *des Instr.* T. II. Cap. XI. p. 351. Haec vero machina nimium pondus habet. Vide alias figuras in Celeb. HEISTERI *Instit. Chirurg.* P. I. L. I. Cap. I. Tab. V. fig. VI. et Tab. VI. fig. I. His superaddo aliam (*Fig. VII.*), quam apud nos Chirurgus rerum suarum intelligens atque peritus, Mich. Arn. HAGEMEYERS, construxit, quae reliquis fere aptior, et ad comprimendas arterias accommodatior visa fuit.

§. 238.

Praeter illam fasciam, vel machinam (237), requiritur 2) lorum, vel alia fascia, quae arctius ea parte circumdatur, qua carnes praecidendae sunt. Nam iuxta eius oram cutis, vna linea, in orbem ducta totumque membrum circumeunte, inciditur. 3) Culter, siue scalpellus maior falcatus *, 4) scalpellus anceps, vel alius rectus, quo carnes et membranae, quae inter duo ossa sunt, inciduntur **. 5) Linteum ex vna parte scissum, quo, dum ferrula trahitur, praecisae carnes conteguntur. 6) Serrula. 7) Forceps tenacior, qua arteriae vinciendae apprehendi et adduci possunt. Gallis *Valet a Patin* ***. 8) Acus incurvae fila cerata trahentes pro iisdem vinciendis ****.

* Quia hoc maius ferramentum aegrum terrere potest, vbi carnes non ita multae sunt, prout in brachio, in eius locum substitui potest culter rasorius, vel scalpellus rectus paulo maior, qualis delineatur ab HEISTERO c. l. T. XIII. fig. I.

** GARENGEOT c. l. p. 195. repudiat scalpellum anceps, quod eo facile findi possint ora praecisorum vasorum.

*** Vid. GARENGEOT T. II. p. 221.

**** Veteres vsi sunt ferramentis candentibus, quibus arterias adusserunt. Nec opus est glebis ex vitriolo, quae linamentis obuolutae festis arteriis obiciuntur, nec pulueribus, nec liquoribus, ad sistendum sanguinem valentioribus. Si arteriae recte vinciuntur, et illarum praeuinsecta ora paulo valentius, super ea fultis linamentis comprimuntur, maior securitas est, et vulnus alienis non offenditur.

† De apparatu instrumentorum rerumque aliarum ad amputationes deligationemque necessarium vid. I. L. SCHMUCKER in miscellaneorum supra allegat. T. I. Nonnulla quoque obseruatu digna habet BROMFIELD in *chirurgical Observations and Cases*; qui quidem tractatus versus est et inscriptus: *Chirurgische Wahrnehmungen, durch WILLIAM BROMFIELD. Leipzig 1774.*

†† Si fieri potest, vt puluerulentis carcas facile, omittenda ea quidem sunt. Verum non semper iis commode caremus. Quandocunque sanguis ex minimis vasculis tanquam ex spongia exsudat, farina tenuis et pura, sat multa adspargenda est.

§. 239.

Vbi vero truncatum brachium deligandum est, necessaria sunt: 1) duo puluilli, quibus ossum frons quam ferrula exasperauit, contegenda est. 2) Tres panniculi minores densi, qui imponi debent arteriis filo vinctis. 3) Linamentorum manipulus, vel glomus pulchriori, ast nimis operosa arte, constructus (*u. gateau*) v. Fig. III. 4) Pannus ex linteo simplici quadratus, cuius anguli lineis inter se transuersis decussatim incisi sunt (*Maltheser - Creutz*). 5) Panniculus e linteo complicato, densus, quadratus, qui non maior esse debet, quam frons membri truncati, quae eo contegitur. 6) Splenia tria oblonga, quae super illud decussatim iniiciuntur. 7) Habena in vnum caput glomerata. 8) Mitella, qua brachium ex ceruice suspendendum est. (235.)

§. 240.

His recte dispositis, oportet aegri animum, quantum potest, a sollicitudine abducere, et, si quis eius metus est, probabili sermone lenire, eique paucum meracioris vini dare, post cum in sedili humiliore ita collocare, vt a ministris, quorum plures adesse debent, possit contineri et immobilis praestari. Arteriae brachiali, cuius ictus in superiori humero eiusque parte interna percipiuntur, obicitur habena glomerata (237), α) quam, vt et humerum, comprehendit splenium. β) Hoc splenium amplectitur funiculus, γ) qui medius primum iniicitur externae humeri parti, et post duabus manibus in vtramque partem ducitur sicque supra humerum voluitur. Vbi vero capita iterum super externum humerum venerunt, ea nodum accipiunt, nodus tamen non penitus ex aduerso arteriae esse debet, sed paulo e latere. Intra splenium et funiculum vero e regione arteriae immittitur corium, vel

vel charta conglutinata densior, *δ*) superque hanc tra-
 icitur bacillum, *ε*) quod a ministro contorquetur et
 manu tenetur. Vel loco huius fasciae tortilis adcom-
 nodatur torcular. (237.) Alius minister cutim, quan-
 tum potest, reducit, brachiumque tenet, et chirurgus
 super eam partem, quam incidere vult, iniicit lorum,
 vel fasciam (238. 2), quia cutis paulo valentius ad-
 stringitur. Inter haec brachium moderate extenden-
 dum est. Chirurgus, qui brachii interiori parti ob-
 versus stat, primum scalpello recto, vel falcato (238.
 3), circumsecat cutim et adipem, sectione in orbem
 ducta, iubetque, ut is, qui brachium tenet, cutim ma-
 gis, et quantum potest, reducat. Post, iterata se-
 ctione *, proxime a cute in membro relicta, secat
 omnem carnem ad os usque, et ab hoc, mediante scal-
 pello, subsecando radendoque periostrium versus id,
 quod vitiatum atque tollendum est, reducit, osque nu-
 dat. Superest inter utrumque os caro, quam etiam
 scalpello ancipiti, vel recto (138. 4), disseccari ossaque
 etiam hac interiori parte nudari oportet.

* Iterata hac sectione illud efficitur, ut laxa maneat cutis, qua
 frons praecisi membri maiorem partem contegitur, cuius
 ideo curatio longe expeditior esse solet.

† Fere omnes olim cutim ab inferiori parte eius lori vel fa-
 sciae, *qua cutis valentius adstringitur*, incidere consuevere;
 hodie vero quidam ab eius lori superiori parte incisionem
 fieri iubent, ut retrahi satis et facile cutis possit.

†† In resectione artuum praecipua cura chirurgis est, ne
 postea os longius exstet e carnibus. Ideoque non modo
 iteratam sectionem adhibent, sed carnes etiam qua licet vi
 retrahunt, antequam ossis resectio fit. Sed saepe numero
 non quod exspectant, inde sequitur, verum suppuratione
 consequente, os illud multum prominere. Hoc nonnulli
 denovo rescant, eo tamen fere protrahunt curationem, quo-
 niam etiam haec pars ossis exfoliatione ab reliquo osse
 secedere debet. Prolixè de hac re disseritur in *Mémoire*
de l'Académie de Chirurgie.

§. 241.

His peractis, in vulnus demittitur linteum (238. 5), ea parte, qua illud scissum est, quo carnes operiuntur. Post ossa ferrula (238. 6) ita praeciduntur, vt haec primum ducatur super radium, qui plenior est, post vero vna super vtrumque os, vt vtrumque eodem tempore confectum sit. Vbi sectio ad finem properat membrum, quod famulus tenet, paululum inclinari debet.

† Cum linteum id ferram, dum ea ducitur, remorari queat, praestat eius loco adhibere corii id genus, quod a nostratibus *Pergament* vocatur.

§. 242.

Praeciso sic brachio, tollitur et linteum (238. 5), et lorum, vel fascia (238. 2). Fascia tortilis, vel torcular (237), parum relaxantur, vt sanguis erumpat et ostendat, quae vasa vincienda sint. Linum ceratum per acum (238. 8) admodum curuatam iuxta arteriam ita ad imas carnes demittitur, vt illud non solum arteriam, sed etiam aliquid ex carne comprehendat, sicque valentius haereat, et, dum adstringitur, arteriam haud abrumpat. Linum bis traicitur, quod sic quadrangulam quasi figuram repraesentat, et omnem arteriam comprehendit. Lini enim capita in nodum connectuntur et adstringuntur. Cauendum, ne, dum acus traiectatur, arteria intus plagam accipiat, quare illa sic demittenda, vt eius pars excauata arteriae obuersa sit, non vero gibba. Arteriam recte deuinctam esse, cognoscitur, si, laxata fascia tortili, ex ea nullus sanguis prorumpit.

§. 243.

Quo arteriae melius deuinciri possint, nonnulli eas illa tenaciori forcipe (238. 7)prehendunt atque adducunt. Haud vero expedit, filum in nodum implexum super forcipem adductae nudaque arteriae iniicere, eam-

eamque solam sine comprehensis carnibus deligare. Si enim filum valentius adstringitur, abrumpi potest arteria, si laxior vincitura fuerit, metus est, ne impetus noti sanguinis eam resoluat et filum diducat.

† De arteria recte vincienda huiusque rationis medendi vtilitate omnino legatur BROMFIELD l. c. Is enim hanc, quam PLATNERVS improbat, rationem vincendi vehementer laudat. Cum BROMFIELDIO consentiunt alii chirurgi aetatis nostrae.

§. 244.

Si qua arteria recte deuinciri non potest, et sanguis ex ea periculosius fluit, vltimum auxilium est, eam paulo valentius comprimere. Imponenda itaque et super arteriam fulcienda sunt quam plurima linamenta mannique, et omnia famulorum stationum vices permutantium manibus ita apprimenda, vt omni temporis momento aequalis pressio fiat. Confert vero, linamenta inordinata esse, non in puluillos (19) digesta et complicata, quae etiam ita adaptanda sunt, vt arteriam latere potissimum premant. Praecluduntur enim arteriarum ora, ipso sanguine in his quiescente coacto, atque durato, ex quo vulneribus quasi opercula fiunt*.

* Vid. Comm. A. R. Sc. MDCCXXXI. p. 122. PETITVS, Chirurgus celebris, eo loco machinam delineauit, quo arteriam cruralem in praeciso femore, quae quod iam vitriolo excisa esset, iterum vinciri non poterat, ita compressit, vt hac sola impetus ruentis sanguinis fuerit cohibitus aegerque seruatus. Haec machina non solum frontem secti femoris, sed superius sub inguine etiam arteriam cruralem comprimit, et loco fasciae tortilis adhiberi potest. Vid. fig. VII. VIII. Confer de sanguine, sola compressione sistendo, eundem autorem l. c. An. MDCCXXXII. p. 335. MDCCXXXV. p. 591.

† Sunt nostra aetate non pauci, qui vasis compressionem vinciturae praeferant; vid. SCHMUCKER l. c. vbi et docet modum rationemque componendi corpusculum arteriam comprimens figuram pyramidis, vel coni truncati referens.

†† Aduersus eos, qui rationem cohibiti fluxus sanguinis ex arteriis faucibus in thrombo quaerunt, non contemnenda disputat POUTEAU in *Melanges de Chirurgie*. Dubio non caret,

caret, vasa seu compressa seu filo constricta intus concretis parietes habere.

§. 245.

Tandem, quo brachium deligari possit, illud paululum inclinandum flectendumque, cutis vero adducenda est, quo ea carnes contegantur. Super arteriam ita praeuinctas iniiciuntur minores panniculi (239. 2) qui ex alcohol exprimi possunt. Super ossum frontem puluilli ficci (c. l. 1). His imponuntur linamenta sicca * (c. l. 3), et haec omnia inuoluuntur pannu quadrato (c. l. 4) **, qui ita adduci debet, vt omni recte contineat, ipsumque membrum arte comprehendat ***. Huic superimponitur panniculus quadratus (239. 5), et tandem huic tria illa splenia oblonga (c. l. 6). Fascia autem ita iniicitur, vt caput eius primo bis comprehendat infimam partem membri truncati ****, post in cochleam serpat, et sursum feratur super olecranon. Fascia hac, quae sic aliquoties super frontem praecisi ossis et olecranon fertur, vulnus decussatim obuoluitur et imposita linamenta valentius apprimuntur. Tandem illa per sinam descendit, et per asciam iterum sursum tendit atque reuertitur ad humerum, in quo splenium arteriae brachiali oppositum comprehendit.

* Plerumque linamenta conspergunt puluere ad suppressendum sanguinem valentiori, quod superuacuum videtur. Necessarium esse potest, vbi femur sectum fuit, quia multus sanguis etiam ex minoribus arteriis ruit. (Vid. de Vulnere haemorrhagia.)

** Sunt, qui loco huius panni vtuntur emplastro, eodem modo figurato, vel vesica, quam madidam admouent.

*** Accepimus, CHESELDENVM, celebrem inter Britannos Chirurghum, loco huius panni superinducere mitellam textilem, seu acu contextam, (*eine gestrickte Schlaf-Mütze.*) †

**** Sic enim non solum melius et e latere premuntur arteriae, sed etiam prohibetur, quo minus adeps adeo inflari possit, id quod subinde accidere solet.

† Loco mitellae textilis vesicam vrinariam bouillam scite adhibet SCHMVCKER. l. c. Nam haec sanguinem aliquando ex vase aliquo effluentem non vt mitella illa, exsudare finit; is igitur retentus et in coagulum versus obturat vas istud.

§. 246.

Membrum sic deligatum per aliquot horas a sinistro imposita manu comprimitur. Illud etiam ita collocandum est, vt erectum sit, haud vero dependeat. i profusionem sanguinis timet chirurgus, relinquio test fascia tortilis (237), ast relaxata, quae, si res ostulat, mox iterum a famulo adstringi potest. Aer curandus est, vt grauiter vulneratus, et, si pro modo vulneris parum sanguinis fluxisse videtur, vena incidenda est. (62. 68.)

† Nerui cum a tam aspera curatione valde commoueantur, omnibus ante recte actis et aegro in lectulo reposito paululum consopendi sunt; ideoque homini misero illi recte datur mediocre praebium Laudani liquidi Sydenhamii.

§. 247.

Deligatum sic membrum, nisi sanguis cum impetu uens, inflammatio, vel aliud quid, hoc exigant, in iem tertium, quartumue, continendum est. Vbi vero fascia solui debet, prospiciendum est, ne sanguis iterum uat. Igitur oportet in promptu habere ipsique prius membro accommodare fasciam tortilem, vel torcular (237). Propter eundem metum linamenta, quae suprimendi sanguinis causa iniecta fuerunt, ibi relinuenda sunt, nunquam vi diducenda. Caetera ita facienda, vt infra de vulnere docebitur. Ab inferiore rasperatoque osse plerumque aliquid soluitur. In iunioribus, quibus ossa multo succo abundant, et, si la a carnibus fatis conteguntur, aliquando vulnus ita uescit, vt nulla ab osse testa secedat. Ossibus omnia ere medicamenta, humida pinguiaque, aliena esse, in ra ostendam. Iis admoueri possunt olibanum, mastix, elemi

elemi, quae contrita et molli puluillo excepta imp
nuntur, post vero alia medicamenta curandis carnib
apta supra dantur. Nec in hac curatione illa lo
giori fascia opus est (245), sed breuiori, qua me
brum inuoluitur.

§. 248.

Si pes praecidendus est, sunt aliae quaedam obli
uationes necessariae. Fascia tortilis, seu, quod l
magis opportunum est, torcular (237) admouetur p
pliti, vel etiam supremo femori, sub inguine, vbi ar
ria cruralis deorsum fertur. Dum popliti accomm
datur, membrum inclinatū flexumque esse oportet
quo tempore vero carnes ossaque praeciduntur, nec
se est, illud extendi. Chirurgus stat inter vtramq
aegri tibiā. Nam sic fibula melius ferra findit
Incidenda scalpello falcato caro est sub tubere ossis
biae. Si enim praeciduntur musculorum sartorii, ge
cilis, femineruosi, semimembranosi, tendines, mag
mouetur inflammatio, dolor et suppuratio, quae cur
ri vulnus prohibent. Si autem os inferius praeci
tur, periculum est, ne secetur arteria, quae per tibi
posteriorem partem ad eius medullam fertur. I
hac enim quandoque sanguis periculosius fluit, qui e
iam, quod arteria ossi inhaerens nec contrahitur, n
vinciri potest, vix conquiescit *. Vbi incidendae ca
nes sunt, mucro scalpelli falcati adprimitur angulo i
terno tibiae. Serra ita ducitur, vt prius incidatur
bia, post vero cum hac etiam sura **, vel fibula. Ha
enim, quae hac parte tenuior est, prius, quam tib
consecanda est. Arteriarum plures vinciendae su
quare etiam frons praecisi membri, laxata fascia torti
sedulo detergenda, vt arteriarum ora conspici queat
Membrum etiam inflectendum, et post simili appara
(239. 245.) deligandum est. Fascia enim super ger
vulnu

unusque sursum ac deorsum fertur. Etiam hoc manu comprimendum et membrum elatius, inflexo guine, collocandum est.

* Vid. Obseruat. PETITI in Comment. A. R. Sc. MDCCXXXII. p. 539. qui ostendit, sanguinem ex hac arteria profluentem etiam commode coerceri, si ei imponantur et super eam fulciantur linamenta.

* Ita dicitur hoc os CELSO Lib. VIII. cap. 1.

† De resectione pedis, quam fieri potest, proxime ad talos, legatur: *Cases in Surgery with Remarks. Part the First.* By CHARLES WHITE. London 1770.

§. 249.

Nec aliam animaduersionem desiderat humerus, si colli debet. Si vitium ad medium humerum usque processit, arteria sub ala comprimi potest. Praestat tamen, hoc paulo inferius, loco supra dicto (240), fieri. Fascia, quae longior esse debet, ita inuoluitur, ut eius ut semper per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas feratur, rursusque ad praecisi humeri caput reuertatur, et ab hoc ad vulnus tendat, illudque scapulis per pectus et scapulas circumeundo contegat.

§. 250.

Maximum periculum ex sanguinis profusione oritur, si femur resecari oportet, neque hoc, nisi in eius anteriori parte, experiendum est, cum accidere possit, neeger sub ipso opere moriatur. Fascia tortilis (237) inuoluitur supremo femori. (248.) Non solum vena, sed arteriae, sed imponi etiam possunt medicamenta, et ad suppressum sanguinem valentiora sunt (245. *). (Vid. infra de vulnerum haemorrhagia.) Fascia, quae et amplior, et longior, esse debet, circum eam femoris truncati partem ter voluta in cochleam serpit, et sursum fertur, post coxas comprehendit, et ab his iterum atque iterum ad vulnus reuertitur, illudque eadem ratione (245) contegit.

† De ratione deligandi lege, quae BROMFIELD habet l. Sunt prolixiora et artificiosiora, quam quae locum l. commodè inueniant.

§. 251.

Experimento LE DRAN, Chirurgi inter Galli clari, cognitum est, humerum totum inciso articulo ligamento demi posse, si is totus vitiatus ferra praecidi nequit. Acus maxima incurua, linum trahens certum, duplex, triplexque, sic tortum, vt vnitas in eo facta sit, perforat cutim carnesque sub ala, et ita ab vtroque in oppositam partem compellitur, vt quam proximè sub osse inter hoc et vasa, quae sub alis deorsum currunt, traiciatur. Summopere enim cauendum est, ne haec vulnerentur acu. Linum adstringitur, quod, recte factum esse, significat arteria, si illa profusa et per totum brachium quiescit. Praeciditur per reducta prius cute, musculus deltoides, ad latum circiter digitum ab articulo, et inciso etiam ligamentum humerus, qui parum attollitur, ex articulo emouetur. Superest, vt inferius refecentur carnes, id quod in istam vincturam fieri necesse est. Tandem minori ac etiam linum traicitur, et vinciuntur arteriae ad latum circiter digitum supra linum, quod prius iniectum fuerat, et quod nunc resoluitur. In cauitatem glenoideam, quae, quantum fieri potest, relictis carnibus contegitur, et supra vulnus coniiciuntur multa linamenta, quibus, et pannis, et fasciâ supra vulnus decussante, etiam sanguis sistitur. Ardua haec et periculosa plena est chirurgia, nec temere a quouis inexercitato suscipienda.

* Vid. LE DRAN *Obs. XLIII. T. I. p. 315.* GARENGEOT *Operations T. III. p. 455.* SAM. SHARP *in the Treatise of the Operations of Surgery p. 221.* historiam dedit de homine molis operam dante, cui rota et humerum et omopla tam extorserat et a corpore distraherat. Is enim seruatus fuit. Nam sanguis, cum hominem vires defecissent, seorsum vltro conqueuit. Clariss. Vir ELIAS FRID. HEISTERVS

statur, brachium mulieris, quod igne totum combustum erat, sine adhibita fascia, aut simili machina, sed vinctis ea ratione sub ala vasis, fuisse amputatum. Ast os non ex articulo excisum, sed ferrula praecisum fuit. Vid. Diss. de Noua brachium amputandi ratione, Helmst. MDCCXXXIX.

† De humero ex articulo excindendo bene scripsit BROMFIELD l. c. ac praeterea IOS. MOHRENHEIM *Beobachtungen verschiedener chirurgischer Vorfälle. Erster Band. Wien 1778.* vbi nouum instrumentum ad compressionem arteriae subclauiae idoneum describitur. Atque haec quidem chirurgia quamquam periculo et horrore plena aliquando felicem exitum habuit. Illa vero quae post Platneri tempora ab Academia chirurgica Parisiensium proposita fuit, exsectio femoris ex acetabulo, tot difficultatibus septa est tantumque cuique humano chirurgo horrorem incutit, vt hactenus nemo ausus sit, eam administrare. Vid. de ea praecipue, *Opuscules de Chirurgie par MORAND, Premiere partie. Paris 1768.* nec non *Mémoires sur les Sujets proposés pour les Prix de l'Academie Royale de Chirurgie. Tom. IX. Paris 1778. Medical Commentaries. Vol. VI. London 1779.*

† Non in omni malo humeri superioris opus est ex articulo resectio; sed saepe licet humeri partem superiorem nudare, et ossis superiorem partem corruptam ferrae praecidere. Qua de re legantur *Sceances publiques de l'Academie de Chirurgie etc. Paris 1779.*

§. 252.

Aliam rationem crura amputandi proposuerunt Chirurgi, PETR. ADR. VERDVINVS et SABOVRIUS, quae vero, quia nec a grauioribus periculis tutas, nec sine summo dolore est, iam fere euiluit.

Vid. *Nouvelle Methode pour amputer les membres par P. A. VERDUIN, à Amst. MDCLXXXVII. Conf. RVYSCHII Epist. XIV. et Iudicium I. SALTZMANNI in Dissert. de nouo membra amputandi modo, Argent. MDCCXXII.*

Laudat hanc rationem LVCAS in *medical Observations and Enquiries* Vol. V.

§. 253.

Si iunioribus membra praecisa fuerunt, iis vel is detrahendus, vel crebrius sanguis mittendus

SCIRRHVS ET CANCER.

§. 254.

Ex inflammatione interdum scirrhum oriri, sunt (58. 59.) retuli. Est tumor durus, sine inflammatione, et, si non aliud vitium accessit, sine dolore. Sedes frequentissima, et fere propria, est glandula, pars, quae huius naturam habet. Adeps etiam quodque ex valenter retenta materia induratur, et, translata verbi significatione, scirrho laborare dicitur.

† Scirrhī notionem vagam quodammodo et ambiguum non hodie aut nudius tertius demum innouit, ideo Auctorem nostrum non latuit. Optime fit, si durum a limbo discernitur, doceturque quae partes et e quibus consistis facile indurescant, et vel tumorem simul concipiant, non concipiant, et quae symptomata alia eam duritiem concomitentur aut consequantur.

§. 255.

In scirrho tumor est a valenter retenta materia. Aliquando tamen incidere potest, ut aliqua pars tantum sit atque minor, quam naturaliter esse debet, et tamen dura et scirrhusa, e. g. si subita euacuatione viscerum collabuntur, et per *συνίησις* concresecunt, id quod in visceribus post grauem sanguinis profusionem fieri obseruatione compertum est. Durus caeteroquin tumor a coacta siccataque materia, asperior a vasculis. Nullus dolor est, quia nervi ab eadem materia comprimuntur.

§. 256.

In glandulis fiunt scirrhī ab omni causa, ex qua illis obstructio nascitur. Si ex varia et sibi contraria causa coguntur humores (39. ad 42.), si vasa ampliantur (45.), vel si angustantur (37. 44.), et si ex his causationibus orta inflammatio curatur reprimentibus frigidis, siccantibus, discutientibus et humores coguntur.

bus. His enim impositis, ex humidis dissipantur
 puosa et mobilia, adunantur compingunturque crassa
 terrestria, quae cum fistulis, in quibus haerent, con-
 crescant. In abscessu et vulnere, quod ad suppurationem
 spectat, scirrhus manet, si impositis rebus, quae
 tularum ora praecludunt, suppurationi cohibetur.
 Si enim tumor pus alit, vel vulnus collisum est, omne
 aesdium ab hac petendum esse constat. Si pus exi-
 nequit, et illud cum vasis concrevit.

† Ad scirrhos concipiendos hominem praedisponit varia et
 diuersi generis prauitas humorum. Veteres succum me-
 lancholicum fere vbique adduxere; neque, vt videtur male.
 Nam crassus et nigricans sanguis ex istorum hominum ve-
 nis emittitur. Caeteroquin et humor in corporibus labe
 venerea, arthritide, scrophulosis affectionibus scabiosisque
 varie peccans praedisponentis causae vice fungitur. Fere
 etiam ii, qui animi corporisque sensilitate insigni praediti
 sunt, scirrhos facile contrahunt. In his enim facile et cre-
 bro fiunt spasmi, a quibus in glandulis fistulisque minori-
 bus obstructions efficiuntur. Neque in corporibus istis
 humores laudabiles esse solent.

§. 257.

Frequentius itaque scirrhi in mammis fiunt, quia
 lius humoris tam facile coagulum est, quam lactis.
 Cui enim ex omnibus humoribus minime subactum
 nondum in animale naturam conuersum est, sed
 idum, et, si ab assumptis vegetabilibus ortum habet,
 scens. Mammae etiam variis iniuriis expositae
 sunt (114). Non ita prompta, satis frequens tamen,
 gulationis est salivae, seminis, muci, aliorumque hu-
 morum. Quibus in omnibus totius corporis fluidis
 idum est, quale esse solet in iis, qui rhachitide, hypo-
 chondriorum morbo, et scorbuto laborant, nec non
 in iis, quibus haemorrhoides sanguinem fundere soli-
 tae suppressae sunt, et foeminis, quibus menstrua non
 veniunt, saepe vitio intus orto scirrhi fiunt. Non
 minus etiam confert malus victus, si pueri, et quibus
 H 3 corpus

corpus infirmum est, leguminibus, oleribus, falfamentis et panificiis aluntur, quae valentissimi generis sunt et multum acorem faciunt. Si haec aliaque cibae ex vasis aeneis, stanno non incrustatis, coquuntur, potioni datur cereuicia tenuis coacescens. Et si eiusmodi teneriora infirmaque corpora nullo motu atque exercitatione recalescunt, sed moerore quotidiano cerantur conficiunturque. Ob hanc enim causam orphanotrophis pueris, et in monasteriis monialibus virginibus, quae inuitae castitatem patiuntur *, scirrhi frequentiores sunt.

* Vid. de his FORESTVS Obs. Lib. XVII. Obs. 26. p. 129.

§. 258.

Fiunt autem scirrhi in interioribus sedibus visceribusque, quorum curatio, si qua datur, a medicis requirenda est. Chirurgus scirrhus curandos accipit: palpebris, glandula lacrymali, glandulis Meibomii, runcula, quae in cantho interno sita est, in labris, lingua, parotidibus, maxillaribus, sublingualibus glandulis, in glandula thyreoidea, in qua sedes strumarum, in mammis, testibus, sub alis, in inguinibus, in utero et ubique, ubi maiores, vel minores, glandulae sunt. Tunica adiposa et cellulosa in omnibus corporis sedibus indurefcit.

§. 259.

Si scirrhus, qui exteriorem aliquam sedem occupat, non a subita causa ortus est, sed per se, et inter longo vitio, incepit, metus est, ne viscera et interiores partes simili vitio laborent. Hic nec medicamen-
facile curatur, nec tuto secatur. Tumor enim ex-
sus, post inductam etiam cicatricem, vel priori,
alio loco, reuertitur.

§. 260.

In quibusdam tamen sedibus maius periculum esse solet. In mammis enim, si scirrhus irritatur, is protinus in cancerum degenerat. Quamvis etiam in muere, cui caeteroquin integerrimum corpus est, tumor ulla imprudentia agitetur, is tamen plerumque contatur eo tempore, quo per aetatem menstrua sistuntur. In lingua labrisque etiam maior metus est, quia hae partes et multo humore redundant, et assidue re motibus agitantur.

§. 261.

In aliis vero corporis sedibus, parotidibus, tonsillis, glandulis maxillaribus, glandulis thyreoideis, saepe tumor increfcit atque magis indurefcit, sine alio morbo, iam, quod propria glandulae functio laedatur. Nisi tamen magnitudo et deformitatem adfert, et mortem *. Si etiam talis scirrhus nimium extuberat et excalescit, tandem iunctas ei partes premit, quae inflammatae exulcerataeque cum scirrhus nonnunquam coalescunt. Laeduntur etiam harum iunctarum partium functiones. Si scirrhus maiores arterias premit, fert atrophiam, si venas, tumores oedematofos et inflammationem, si neruos, stuporem atque torporem in atrophiam.

* Vid. magnos eiusmodi tumores delineatos in VERDUIN *Obs. Chirurg.*

§. 262.

Quamdiu vero in scirrhus perfecta vasorum obstructio est, et vasa, quae cum retenta ficcataque materia vnum quasi concreta sunt, integra manent, humores vero boni sunt et sine acritudine, scirrhus benignus existitur, qui, ut res quasi aliena, et quae sine vita est, is vitam habentibus adhaerescit. Si autem ex quacunque causa humores, qui in vasis circa scirrhum continentur, haec tandem rumpuntur. Humores

vero, qui sine noxa quieuerant, iam hoc motu et attritu cientur, calore putres fiunt et acres, qui proximi adhuc sana, rodendo sinuant. Et sic tandem scirrhus in malignum verumque cancerum degenerat.

§. 263.

Sunt vero, quae scirrhum irritant, omnia, quae nimis agitant. Inter haec partis adfectae motio *, pressio et fricatio, omneque fere, quod imponi solet, medicamentum, maxime, si illud acre, roderet pingue, rancidum, resinosum, spirituosum, vel aquosum et molliens est. Omnia calida, quae intus fumuntur, victus etiam talis, et, quae inter cibos potusque valentioris generis malique succi sunt, aromata, fallimenta, vinum, vinum adustum; praeterea vehementiores animi perturbationes, voluptates venereae et larum desideria, quae, ut et omnia vehementia, irritare mouere debent, qui scirrhus laborant et cum hoc fenestram peruenire cupiunt.

* Nullum exercitationis genus mammarum tumores scirrhusque magis concitare potest, quam, quo brachia multum iactantur, quia pectoralis musculus sub mamma situs est.

† Diu saepe antea quiescens scirrhus non alia de causa malignum vertitur, quam quod foeminae fluxus catameniorum per aetatem cessat. Alioquin omnis quoque alius morbus in corpus scirrhus affectum incidens eum exasperat malignumque reddit. Sponte etiam et sine noua causa data scirrhus malignitas accedit, si corpus iam ante scirrhum ortum humoribus acerbis scatebat; aut si sedes ipsius tumoris in partibus sensibilitate insigni conspicuis est, aut ipse totus homo ex vehementiori mobilitate neruorum lenioribus causis irritantibus facile agitatus vix vnquam quiescit.

§. 264.

Scirrhum malignum factum esse, ex notis quibusdam scire licet. Ab initio dolor modicus, prurigo maior, et circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur. Dolor indies increscit fitque pungens, fodiens, prurifans, acris, urens, et sub finem fere intolerabilis, quod hominem

omo diffinetur et multum exeruciatur. Duritia in-
r haec et asperitudo augentur, color ab initio non
ius est, mox ruber, liuidus et nigricans, et venae,
nae etiam liuent, circa tumorem multum inflantur,
e quasi recuruantur. Tandem humor vitiosus * ve-
mentum, quo scirrhus comprehenditur, et quod a
andulae tunica ortum videtur, nec non supremam
atem exest, ex vlcere humor fertur putridus malique
doris, et verum factum est καρκίνωμα, seu cancer
pertus.

* In cancro occulto saepe in medio tumore reperitur ca-
vum acerrimo et foetido humore plenum. Vid. DEIDIER
des Tumeurs Cap. VI. p. 103. et G. HARRIS Dissert. X. p. 168.

† Notae, quae scirrhum haecenus benignum ocyus serius in
malignum abiturum esse praenunciant, praeter illas antea
propositas fere haec sunt. Insignis durities seu ab initio
tumoris seu processu temporis. Subito increfscens moles,
maximeque si per longum tempus stare et quiescere quasi
visus erat. Quibus notis existentibus cum festinatione qua-
dam rapienda sunt auxilia, si qua in imedentium potestate
sunt.

§. 265.

Vbi vero malum eo usque processit, omnia exaspe-
antur, ex vlcere fertur sanies, quae mali odoris, tam-
que acris est, vt ea etiam cutim impositaque linamenta
irrodant *. In omni enim cancro humor ex putri,
qualis in sphacelo emortuis esse solet, et rodente, qua-
lis ex malis vlceribus exit, quasi compositus est, quare
vitium, quod et putrefaciendo et rodendo vlterius ser-
pit, insanabile est. Hoc humore etiam illud inferius
velamentum, quo tumor comprehenditur, exeditur,
vascula, quae lympham ferunt, indurantur, cum qui-
bus hoc vitium altius in infra sitas carnes descendit et
quasi altiores radices agit **. Ob hanc causam, si vi-
tium mammas infestat, glandulae, quae sub alis sunt,
intumescunt, et, quia vasa premunt, brachio etiam tu-
morem doloremque acerbissimum cum stupore adfe-

runt. Ora vlceris et proxima cutis tumida et dis-
scabraque fit et colorem habet ex rubro subnigru-
vlcus continuatur et odoris foeditas indies augetur.
Putris etiam caro increfcit, quae multum tumet et
netque. Acutiffimus acerbiffimusque dolor aegru-
die nocteque fatigat. Febricula lenis oritur, quae
iam, cum quieuit, tamen repetit, aegrumque extorret
corpus extenuat et ad summam maciem perducit. 2.
vltimum homo, qui per multum faepe tempus mi-
rum spiritum trahit, omni sentiendi facultate amif-
crebrius animo linquitur, quandoque conuellitur, ta-
deinque extinguitur. Subinde etiam hominem fa-
guinis profufio interimit, fi is, ex qua arteria, venaque
paulo maiori, et ab acri humore erofa, cum impet-
ruit et fupprimi nequit.

* Teterimus, quem corruptus humor exspirat, odor naribus
eorum, qui aegri curam habent, adeo inhaeret, vt quando-
que nulla re elui et dispelli poffit. Vid. G. HARRIS l.
Hic in exemplum adducit medicum, cui poft vxoris ex can-
cro exulcerato obitum, virulentus odor femper in naribus
ita manfit, vt tandem etiam is confectus obierit. Nec mi-
nus animaduersione dignum eft, quod de chirurgo propo-
nit, qui, cum occultum cancerum extirpaffet, pellucidum
humorem, quo veficula in mamma plena erat, degufta-
aufus eft, fapor vero huius acerrimi foetidiffimique humo-
ris adeo linguae inhaefit, vt tandem et is ex infuperabili
naufea tabidus factus fuerit et extinctus.

** Hoc pluribus demonftrat GENDRON *des Cancers*.

§. 266.

Quid vero de his omnibus fperandum metuen-
dumque fit, fcire non difficile eft. Scirrhus, qui re-
cens eft et nondum occalluit, et qui non a mala caufa
ortus, non nimis magnus et fcaber eft, et vbi vafa non-
dum intumuerunt, qui etiam mobilis et fine dolore in
corpore integro eft, aliquando medicamentis vincitur.
Scirrhus benignus, fi ei nulla vis adhibetur, ifque nec
medicatione, nec aliis (262. 263.) concitatur, faepe
ad

vitalis finem sine noxa tolerari potest. (Confer. 261.)
 Scirrhus benignus, qui nec medicamentis vinci, nec
 clari, potest, nec non omnis malignus, scalpelli ope-
 m desiderant; nec tamen ii tuto semper secantur.
 enim metus est, ne nervus, ne arteria maior, ne
 na incidatur, si tumor altiores egit radices, isque sub-
 tis partibus valentius adhaeret, si a vitio, quod intus
 corpore est, ortum habet, vel, si corpus, in quo hae-
 et, mali habitus est, et viribus a senio aliaue causa de-
 ctum, et vbi cancer mammas infestat, si iam glandu-
 sub ala intumuit *, nec sectio prodest, et ii, qui
 ro malum tollere tentant, plerumque celerius ho-
 minem occidunt. Si etiam curatio ab initio satis feli-
 ter cessisse videtur, malum tamen reuertitur. Vbi
 mel scalpellum frustra admotum fuit, in eius usu
 unquam certa fiducia est. In omni scirrho et cancro
 rum auxilium superuacuum est.

* Foeminae, quae mammarum scirrho, vel cancro, laborant,
 si iis catamenia non recte procedunt, vel, si purulenta ex
 genitalibus cum menstruis feruntur, saepe vterum habent,
 quem scirrhus, vel carcinoma, infestat, id quod etiam dolor,
 quem hac regione sentiunt, significat.

† Triplex ratio medendi scirrhosis tumoribus est. Aut enim
 spes aliqua est, scirrhum posse resolui per intus sumta et
 extrinsecus medicamenta applicata aut haec spes decollat,
 scirrhus vero per conditiones suas permittit resectionem
 §. 366. aut neutra ratio locum habet. Si nec resolui nec
 sectione tolli posse videtur, vitandum sedulo est, quicquid
 aliquem maiorem humorum motum in vniuerso corpore
 copiosorem adeo et impetuosiores appulsus humorum ad
 tumorem concitare, aut acrimoniam humorum gignere, vlla
 ratione modoque potest. Itemque quicquid extrinsecus
 premere,ungere, nimium mouere, aut vt omnia verbo
 complectar, irritare potest. Ab iis enim facile aut tumor
 ipse aut vicinae partes inflammationem concipiunt, qua
 concitata scirrho malignitas accedit, aut certe, inflamma-
 tione sedata, et magnitudo et durities tumoris augetur.
 Raro enim fit, vt res feliciorem exitum habeat, vt verus
 scirrhus suppuratione benigna liquatur. Itaque ne illorum
 aliquid fiat, usus rerum non naturalium curiosius instruit,
 tumor autem ipse mollissime haberi, aduersus omnem caus-
 sam

sam vlla modo irritantem diligentissime custodiri, pellic aliqua, molli admodum, perpetuo foueri debet. Excretiones autem omnes prudenter, lente, blande promouenda alimenta blanda, succulenta, potulenta tenuia, non acris, parum aut non spirituosâ assumenda, et omnis nimie cance et angue peior, vitanda sedulo est. Si haec diu sapienterque seruata sunt, aliquando scirrhus sponte arescitur et euanescit, aut suppuratione non maligna quiescit, aut magnitudine saltem minuta minus molestus, aut non mutatus ad ferros vsque annos sine alia graui noxa tanquam pars vita carens corpori adhaerere potest.

§. 267.

Ergo, vbi spes est (266.), scirrhum, qui externi corporis sedes infestat, tolli posse, super tumorem data sunt, quae aliquantum molliunt, retentam materiam mobilem reddunt, ast simul putredini resistunt. Sedulo enim et in his curationibus tenendum est quod supra, de glandularum tumoribus resoluendâ (113), praecepi. Inter emollientia prima sunt emplastra ex gummi parata et ex cognitis compositionibus malacticum et diachylon, tum simplex, tum compositum, adiecto diaphoretico Mynsichti, nec non gummi galbanum, sagapenum, opopanax, quae gummi vitello oui excipi et superdari possunt. Expedit vero haec satis crassa alutae illinere, et cum hac super dare, emplastra vero manibus in magnitudinem tumoris dilatare et imponere, subinde etiam calefactoriam tegulam super habere. Nec, si vitium recens est, aliena sunt cataplasmata (131.), quae tamen minime maderere oportet. Ex his fere commodissimum est, quod paratur ex caricis pinguibus, conquassatis, vstulatisque, donec temperaturam pulticulâ habeant. Profunt vapores ex aceto bene calido, si in illud igniti filices coniiciuntur, et super vaporem locus collocatur. Levis etiam frictio, maxime si alia, quae adnota fuerunt, tumorem iam aliquantum immutauerunt, multum proficere solet. Plures extollunt emplastrum Vigonis cum

in mercurio, de quo supra (125.) dixi. Fere commodius est, vnguentum Neapolitanum tumori illinere, imponere plumbeam laminam, quam argentum um permanauit. Argentum viuum prodesse potest si vitium ex venereo morbo enatum est, raro prodest in mammis, si ex alia causa induratae sunt. Neque vero est, si eo uti velimus, ut subinde detur catharticum, ne mercurius ad salivae glandulas conuertatur et oriatur ptyalismus. Nam et hoc curationis genere, quod plures scirrhus adhibuerunt, hunc rarissime tolli, obseruatione cognitum est: Intus dari debent cutientia ex radice sarsaparillae, bardanae, chinae, iuninis, et ex illis, quae nomine radicum aperientium constant. Nocent cathartica, quae corpus nimium vacuant, resoluentia, quae humores nimium citant.

Si illis ad §. 267. dictis vsus medicamentorum adiungere velis, praeter illa externa interdum profunt; malagma ex extracto cicutae gummi galbano, quod oui vitello solutum est, et puluere herbae cicutae compositum; aut emplastrum ex succis herbarum cicutae et hyoscyami et mucilagine seminum lini et foenu graeci, oleo oliuarum et q. s. cerac paratum; proficit etiam cicutae succus expressus, herba recens confusa, puls ex foliis siccis et lacte; folia recentia solani, illius quod hodie vocatur, belladonna, confusa illa quidem vel ex lacte cocta in speciem pultis, vel puluis foliorum siccatorum emplastro aut cerato illi e cicuta parato adiectus; gummi ammoniacum ex aceto in speciem malagmatis coctum. Sed huius et aliorum calidorum, cutim irritantium vsus magnam animi attentionem a medico exigit. Quodsi vel emplastrum vel vnguentum vel amalgama mercuriale tumori ampliori imponitur, metus est, non modo, ne fiat salivatio, sed omnino, ne sanguis dissoluatur nimium, et acrimoniam singularem contrahat; quod, etiamsi cathartica subinde data humores dissolutos per aluum eiiciunt, non minus immo vero magis fit. Fere tantum admittuntur mercurialia, si scirrhus vel ex venerea labe vel scrophulosa ortus est. Electricitatis efficacitas et vtilitas est dubia admodum. Verum sola extrinsecus adhibita raro ad curationem sufficiunt. Intus igitur fumenda quaedam sunt, quae vel diluendo vel resoluendo humorem in tumore quiescentem in motum dare, et inertia vascula ad nouas contractiones et relaxationes vicissim per

peragendas reuocare possunt. Ex argento viuo parata ne conueniunt, nisi causa vel scrophulosa et venerea morbu fecerit. Gummi ammoniacum vel solum vel cum extracto chaerisfolii, taraxaci, graminis, vel cum sapone alicantis venetoue in pilulas redactum efficaciter quidem resolut sed aestum facile concitat. Eius igitur vsus prudenter medicum esse iubet. Nostra aetate extractum citutae primo a STOERKIO in libro singulari post eum et ab aliis laudatum fuit, ab aliis vero culpatum. Alii extracto illi adieciere mercurium dulcem. A paucis granis ordiendae curatio est; sensim augenda dosis, quoad eius fieri potest, scilicet ita ut nulli mali effectus interueniant. Simili laude a maiori mactant puluerem foliorum siccatorum herbae, quam Belladonnam hodie vocari dixi. Ne encephalon neruique animusque commoueatur, initio grana duo vel tria dentur, mane et vesperi. Simul cum cicuta vel belladonna diluentia decocta eademque aperientia et diuretica assumi possunt. Decocto radicis graminis, meraco illi quidem, nonnulli multum tribuunt, si vel solum id sat diu et largitus potetur. His, qui atrabiliario sanguine laborant, ut ad alios affectus eius generis, ita quoque ad tumores scirrhusos profunt tartarus tartarifatus, mel, succi inspissati fructuum herbarum dulcissimorum et maturrimorum, extracta chaerisfolii, taraxaci, graminis, aut seorsim data aut varie mixta sed larga manu dari debent. Alia tum intus sumenda tum extrinsecus applicanda, minus fida ea, silentio premittimus. Omnium autem seu intus seu foris adhibitorum auxiliorum effectum salutarem fore speramus, si scirrhus magnitudine atque duritie paulatim minuitur, aut si breui temporis intervallo insigniter mollescit, et signa instantis suppurationis animaduertuntur. Sin ea, quae §. 264. dicta sunt accedunt, desistendum est a medicatione illa, neque differenda resectio tumoris, si ea quidem locum habet. Cum autem nullum ex supra propositis remediis omni dubitatione vacet, et scirrhusus tumor, qui benignus erat, sub vsu medicamentorum malignitatem non raro contrahat, facile patet, scirrhus benignos, quos per rationem loci extirpare non licet, non sine trepidatione quadam medicamentis adgrediendos esse tentandosque, verum fato suo relinquendos molliterque habendos, ut ad §. praec. dixi.

§. 268.

Vbi vero haec tumorem nihil mutauerunt, isque nec desit, nec mollior factus fuit, ad scalpelli curationem veniendum est. Medio tumor vna linea, vel duabus transuersis, vsque ad tunicam, qua scirrhus inclusus.

est, inciditur, diducta parumper cute. Tumor vel
 cipe HELVETII *, vel duabus lineis transuersim acu-
 lectis, vel, id quod fere optimum est, digitis, addu-
 ar, et ab integro corpore digito separatur, totusque
 n velamento suo eiicitur. Si enim sic glubendo
 nitur, radices, seu durati nerui, vasaque lymphatica
 ius extrahuntur, nec adeo metuenda est sanguinis
 fusio. Sanguis enim ex sectis vasis maiori cum
 petu ruit, quam ex ruptis ac dilaceratis. Siccis li-
 nentis vulnus implendum est, supraque imponendi
 ni iniiciendaque fascia. Nec protinus sanguis, nisi
 iori impetu ruat, suppressendus est, in cuius cursu
 ersus inflammationem auxilium esse supra retuli.
 o valentioribus opus est, quibus sanguis sistitur.
 l. de vulnerum haemorrhagia.) Si quando autem
 ica eximi non potuit, illa concidenda est et insper-
 da superdandaque adurentia, et alia sunt, quae pus
 uent. (vid. de vlceribus et fistulis.) Si enim eius
 uid super vlcus relinquitur, omne id in pus verti
 et, ne putris caro excresecat vitiumque reuertatur.

Vid. Eius Epist. ad REGIS de natura et curatione canceri
 p. 153.

Omnium tutissima medendi ratio est, qua tumor scirrhusus
 a corpore separatur et abiicitur. Potest autem et benignus
 et malignitatis notas habens sectione tolli, si non nimis ma-
 gnus, si in parte inferiori non nimis late non nimis pro-
 funde partibus subiacentibus, si non vasis et neruis maiori-
 bus cohaeret; facilius quoque et sine latiori cicatrice ex-
 scinditur is, qui non cum cute latius cohaeret. Ita sepa-
 randus est, vt nihil eius relinquatur. Non modo enim
 crescit relicta pars, sed quoque in carcinoma mutatur.
 Quamquam autem chirurgia haec per se tuta videatur,
 alia tamen possunt incommoda circumuenire, malus corpo-
 ris habitus, senectus decrepita, morbi pectoris, tussis, asth-
 ma, lippitudo chronica, varia illa quidem, morbi imi ven-
 tris huiusque durities et tumor; morbi vteri, vel suppressus
 vel irregularis vel dolorosus fluxus catameniorum, sensus
 ponderis in hypogastrica regione, effluxus saniei e parti-
 bus naturalibus. Chirurgiae huius administratione cutis
 in media tumoris parte, vna linea secatur sat longa, si sic
 quidem

quidem totus tumor separari commodè potest, et tumor non adhaerescit. Quodsi maior tumor est, fiunt autem lineae se mutuo decussantes ut Auctor noster praecipit, duae figuram literae T referentes. Cutis cum tumore adhaerens et alienata, seu duritie seu aliter, seruari potest, tota igitur, quanta alienata est et cohaerens si cum subiecto tumore abicienda est. Plerumque tunc est, cutem duabus lineis curuis diuidere coeuntibus sic, abicienda pars cutis figuram qualem referat. Ab ea pars cutis, quae seruatur, etiam a caeteris ambientibus partibus tumor separari debet aliquam vim adhibendo, ut Auctor docet. Si digiti non sufficiunt operi, adhibendus cur obtusior, aut cultri manubrium ex ebore, latius illud acutum. Reiecto tumore, chirurgus totum vulneris autem digitis suis diligenter, et attente perscrutetur, ut, si quid duri relictum fortasse sit, intelligat. Quodsi sic habet id protinus tollendum est; adhibendo tenaculam et scissilem, aut certe concidendum est, seu statim, seu in posteris deligationibus. Omnibus actis, si nihil alieni relictum videtur, cutis, sana ea ipsa, apprimitur vulnere interiore. Antea tamen ex ea id resecandum est, quod abundat, ut adhaerentia vulneratae cutis sese mutuo contingant, haud verò iterum tegat alterum. Itaque recte adducta cutis sine cicatrice cum subiectis partibus conglutinetur coalescit, nulla magnopere mota suppuratione. Verum hoc fieri nequit, si sanguis non sponte conquieuit, et velut aut vinculo constricta aut agarico carptisue linteis compressa sunt, aut aliquid duri relictum fuit. Haec enim conglutinationem promptam prohibent. Impleatur tumore curvum linamentis, citeturque pus. Quod fit, si vehemens inflammatio per usum remediorum supra propositorum accenditur. Vulnus recte deligatum tertio demum die retegatur, nisi aliquid interueniens, tanquam sanguinis fluxu aliud prorsus iubeat. Quodsi in prima vel posteris deligationibus aliquid alieni relictum esse patet, id vel resecandum, vel scalpello incidendum, vel adurentibus et suppuratione absumendum est.

§. 269.

Alia vero curatio est, si scirrhus malignus factus est (260. 262. ad 265.), et cancer, vel occultus, vel apertus, mammam occupat. Nam haec vitia etiam raro ferro sanantur, maxime, si aliquid eorum in corpore est, quae haec, ut supra exposui (266.), sanare prohibent. Si vlcus adhuc sub cute est (264.), tumor autem

tem durus, aut mobilis, is quandoque eadem ratione carne et cute, digitis, vel scalpelli manubrio, dici, vel iuxta radices excidi et inuiolata tunica eiici test (268). Si vero superior cutis iam sui coloris non est, sed alienata, inferius autem tumor mobilis, neque a carne et aliis ei iunctis separari potest, ita tamen, ut quantum ex cute vitiatum est, etiam forfice, scalpello, praecidatur.

§. 270.

Vbi vero cancer totam mammam infestat, illa tota praecidenda et a musculo pectorali ita separanda est, potius huius aliquid excidatur, quam, ut aliquid remanenti omittatur. Dum vero praeciditur mamma, scalpelli acies ab inferioribus versus superiora procedere debet. Sanguis paulo valentioribus, praeuinctis tum pressisque arteriis, supprimitur, vulnusque curatur. Sub ipsa curatione, et post superatam inflammationem, intus danda sunt medicamenta, ad sanguinem aliosque corporis succos purgandos idonea, et per haec, leniora cathartica. Nec homo alium cibum, quam modicum et salubrem, capiat, vitatis cibibus acerbis. Potui danda est ptisana ex farfalla, aliisque, quae sanguinem purgant. In quo ieiunium et abstinentia, etiam post curationem, per longum tempus perseverandum est, cum nunquam metus sit, ne vitium recrudescat.

Multum proficere victum ex solo lacte paneque candido, exemplis probavit DEIDIER l. c.

In hac curatione 1) aegrotans ita collocetur, ut ne, si vel timidula est vel prae dolore et sanguinis fluxu syncope afficitur, ex sedili deorsum feratur; itaque et pedibus aliquid subiiciatur, cui inniti pedes possint, et pone foemina homo minime meticulosus stet, qui truncum contra sedile immobile praestet; in maiori metu lapsus alius genua aegrotantis firmiter retinere potest. 2) Est alio ministro opus satis intrepido, cui committatur humerus affecti lateris, ut eum tum cum in fine operationis pars

tumo-

tumoris ad axillas spectans et eius loci cutis separanda retrahat, ne arteria subaxillaris vulneretur. 3) Si glan-
 larum subaxillarium aliqua tumida est, ea relinqui
 debet. 4) Cutis potest quoque ita incidi, ut culte
 superiori thoracis parte versus mediam faciat plagam
 plam cutis semicircularem, deinde manus sinistra mam-
 paululum eleuat, atque chirurgus cellulositatem aliquan-
 soluit, ut digitos sinistrae manus dare sub scirrho possit
 carcinomate, ut eum postea partim vtendo digitis pa-
 scalpellum adhibendo ab subiectis et vicinis part-
 separet, eandem viam a superiori regione versus inferio-
 et simul versus exteriora sequens. Si quis ramus ex
 mariis internis cruorem proicit, ei a ministro apprim-
 agaricus, dum desinet operatio; separata mamma, quid-
 duri et alieni relictum videtur, separari etiam debet. U-
 que nisi appressus agaricus sufficere videtur, vasa ampli-
 vinciuntur, multis linteis carptis vulnus contegitur, et
 quantum potest adducitur, et adducta pluribus empla-
 retinetur, splenia imposita fascia satis longa firmantur;
 tusque is apparatus a manibus ministrorum vices
 mutantium continuo apprimitur. Reliqua sunt sic,
 supra dictum est. Ut aliquod dolorum lenimen-
 aegrotae datur cyathus paruus vini et Laudani liq-
 Sydenhamii aliquantum. In posteris deligationibus or-
 supra dicta obseruantur, maximeque costae, si quod vit-
 ex adhaesione tumoris in iis natum est, purgantur scal-
 lum vel scalprum adhibendo.

Est autem idem prorsum agendum, siue scirrho beni-
 maligno ve siue cancro tota mamma affecta tolli debet.
 que haec medela est vere rationalis; nam vel re aliena
 quando vehementius nocitura, vel iam valde nocente
 pus liberatur. Ideoque ea caeteris medendi rationi-
 quibusque praeferenda est. Si tamen chirurgia haec loc-
 non habet, aut aegrotus a tam efficaci medicina abhor-
 et a medicamentis auxilium sibi expetit, aliquid audens
 quidem est, verum tamen non certa spe aegroto prop-
 cum remediorum adversus cancos laudatorum nullum
 quod aut semper aut multo saepius votis medentium
 spondeat. Omnia, quae supra a nobis exposita sunt,
 etiam loco adduci possunt. Pharmaca ex hydrargyro pa-
 initio canceri eius, qui a causa scrophulosa vel venerea
 factus est, non raro profunt; in progressu morbi et si-
 valde putrida sanguinem dissolvente et vlcus crebrius
 entante aut fungis in eo luxuriantibus, adeo non profi-
 ut etiam noceant: Nec larga manu, neque post breu-
 temporis spatia exhibeantur. Extrinsecus aqua pha-
 daenica, verum dilutissima tum vlcus purgat. Decocta
 lenientia, lac, neque acria vlla, iungenda. De ci-
 STO

STOERCKIUS legatur, sed cum grano salis. Cicutae extractum intus primo dosi exigua bis die, deinde aucta sensim datur, foris infuso vel decocto herbae vlcus eluitur, purgatur, paulum diluto extracto ope penicillorum, denique emplastro de cicuta contegitur. Pulueris herbae Belladonnae graua tria, quinque et progressu temporis plura intus, puls aut decoctum meracius vel folia recentia tusa extrinsecus adhibentur. De Belladonna passim RICHTER in *Biblioth. chir.* De aconito STOERK in libro singulari de *Stramoneo, Hyoscyamo et Aconito*. De succo *osopordi acanthii* GODOFREDVS in *materia medica*. Ibidem et in HERMANNI *Cynosura* et passim in Botanicorum scriptis priorum temporum legantur, quae de succo digitalis purpureae, indeque parato vnguento referuntur, saepe relata. Laus verrucis equinis data superstitionem olere mihi videtur. De arsenico vid. *Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aertzte, Zweeter Band. Viertes Stück*. Aqua calcis viuae intus cum lacte, extrinsecus sedulo adhibita, si ventriculus non offenditur, prodesse potest. Non raro enim vsus eius vlcera internarum partium sanauit. Neque nego, ab illis, quae aduersus scirrhum a causa atrabiliaria ortum valere supradixi, posse aliquando sanationem canceri praestari, si cito, h. e. antea quam sanguis a sanie cancrrosa penitus corruptus est, medicina paratur. Et tum simul iteratoque adhibitae vomitiones aluique purgationes leniores iuuare possunt, grauioribus vero morbi conditionibus existentibus malum per ea augetur, et mors maturatur. In tanta miseria palliatio curationibus eradicantibus praefertur. De hac autem paulo post. Itaque nil addo de Phytolaccae herba, de alumine, similibusque. Cortex chinae solus vix sanat, aliis tamen vel roborandi vel putredini resistendi causa iungi potest.

§. 271.

In labris si canceri fiunt, hi protinus ita excidendi, ut semper aliquid ex sana parte tollatur. Quia o hoc sine labrorum mutilatione fieri nequit, orae lucendae inter se, suendaeque sunt, traiectis et ibi etis acubus. (vid. inferius de labrorum vulneribus).

Vidimus aliquem, qui sine praegressis verrucis inde cancrum lethalem tandem, contraxerat, quod labrum inferius saepius, et fere quotiescunque de aliqua re stuperet dentibus non morderet quidem sed tamen vehementius comprimeret.

De cancro nasi curato ab empirico legi meretur epistola descripta in *Bibliothec. Chirurg. T. IV. p. 587*.

§. 272.

Vbi autem vitium in quauis fede penitus descendit, et, vel certa desperatio, vel gravior metus hominem sectione saluum praestari non posse prudentis chirurgi, hunc, quem seruare nequit, m attingere. Nouum igitur petendum consilium et adhibenda sunt lenia auxilia, quae quasi blanditur morbumque trahunt. Primum itaque ad vi rationem curatio transferenda est, et ab ea ordin dum, vt aeger omnia vitet, quae, quod aliena sunt supra proposui (257. 263). Carnes etiam, quae mis succosae aut pingues sunt, v. g. suillae, nocent. Si sanguis in corpore abundat, is subinde subtrahendus et alius etiam, sed non, nisi lenioribus, rhabbaro, tamarindis, cremore tartari, mercurio duplici pilulis Becheri, nunquam valentioribus, ducenda est. Vitanda enim summopere omnia sunt, quae humores citant. Potioni ptisana (270) idonea est. In proxima parte fonticulus excitari potest.

* Quantum noceant purgantia, vid. in DEIDIER c. l. p. 1.

§. 273.

Quamdiu vitium adhuc sub cute delitescit, si omnia, quae imponuntur, aliena sunt. Locus contra frigus omnemque iniuriam, quae exterius accidere potest, custodiendus. Et fere optimum est, illum plumbea lamina, aut tenuata minimeque graui, co tegere. Si dolor nimis acerbus est, quandoque super haberi possunt hyoscyami herba et papaueris flores qui cera excipiuntur, vel emplastrum saturninum Mynsichti. Pingua enim et resinosa inimica sunt.

§. 274.

Vbi autem vlcus adaperturn est, pauca etiam medicamenta inueniuntur, quae sine noxa imponi possunt.

ni, si vis adhibetur, malum irritatur et inorescit. que contentus esse debet medicus lenioribus, quae purgant, et prohibent, ne id nimium serpat, supercrescat. Ad id fere idonea est aqua phagedaica dilutior, quae putrem carnem satis continet, nec nimium serpere patitur. Si vero maior cortio cum foetore est, ei adiici potest parum essentiae succini, quam tamen minime acrem et sine sale compositam esse oportet, vel admisceri potest aqua meraria. Subinde etiam linamenta sicca imponenda sunt, quae tetros humores quasi bibunt, illaque solo mutanda. Si dolor vrget, cremori, qui ex coniorum semine cum aqua plantaginis paratur, addi potest plumbumustum, et vlceri illini. Idonea compositio est, quae habet acetum, quod argenti nam excepit, et oleum rosarum, quale vulgo linimentum nutritum appellant. Ex emplastris, quibus continentur, fere optimum est Mynsichti. Vlcus quando deligatur, auertendus est omni studio aeris contactus, quo illud grauiter afficitur.

Quodsi neque resectio tumoris locum habet, neque medicamenta intus forisque adhibita quicquam profecerunt, PLATNERI quidem consilia sequi possumus; verum ab saturninis validioribus abstinendum est. Etenim ea tantummodo constringunt cutem et ei proxime subiectas partes; interiora non mutant. Atque sic sub usu talium nouimus, abnormem in modum aliquando increuisse scirrhosum tumorem.

Ad putrorem foetoremque imminuendum prodest quoque spiritus acidus salis muriatici ita aqua dilutus, vt rodere nullo modo queat. Vlcuseo medicamento vel eluitur quotidie vel contegitur linteis eo madentibus. Hac loco postremo dicta ratione adhibitum dicitur radicatus curauisse cancerum. Si sanies nimium abundat, myrrhae liquamen et putredini aduersum est et siccat. Aluminis solutio in laxioribus adhiberi potest. In aliis aqua calcis viuac. Verum his omnibus ita vtendum est, vt ne effluxus omnis saniei cohibeatur, increscunt enim dolores. Puls radicum dauci hortensis rasarum, seu cruda seu initia fermentationis subiciens, aliquando plurimum ad reprimendam putredinem potuit.

potuit. Doloris vehementiam lenit opium et sal sedativum et extrinsecus impositum decoctum cicutae, hyoscyami, folani, caput papaveris. Unguentum nutritur magis lenit, si oleum seminum hyoscyami ad parandum in adhibetur. Omni modo curandum est, ne cutis vicina hactenus integra ab acri sanie corrodat. Contegendum igitur est emplastro diachylo simplici, cui saturninum aliquot remixtum est. Sanguinis effluxum ex corrosis vasculis difficilius reprimimus, neque semper tuto cohibemus; cum sanguine enim pars acris saniei effluit. Si tamen aegrotus debilitatur, et lintea carpta vix sufficiunt, agaricus, qui plus potest, etiam spem fallit, styptica vero dolores creant intolerabiles, neque validiorem appressionem linteorum admittit vehementia doloris, vasorum constrictioque per vincturas fieri nequeat, si ea macerata et arrosa sunt; tum ex periunda sunt cauteria actualia, quae tamen et dolores faciunt, neque diu cohibere sanguinem possunt, cuius fluxus, cadentibus crustis, repetit. Itaque futurum est, vix variis illis adhibitis, homo miserum spiritum efflet.

De cancro legi prae caeteris merentur PETRI BIERCHER *sermo de signis diagnosticis canceri* lingua suecica conscriptus et ab ADOLPHO MURRAY in teutonicam versus et inscriptus: PETER DIERCHEN'S *Abhandlung von den wahren Kennzeichen des Krebses*. Göttingen 1775. *Dissertation Académica de cancro* etc. Auct. PEYRILHE, Paris 1777. GOOCH *Tractatus in Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte*, zweiter Band. *Traité sur le virus cancreux*, par M. DVPRE DE LISLE. Paris 1774.

OPHTHALMIA.

§. 275.

Variis et ingentibus casibus oculi patent, quorum plures ad inflammationes pertinent, vel ex illis nascuntur. Si enim oculorum tunicae inflammantur, morbus ophthalmia, vel lippitudo, dicitur, cuius varia genera, variae etiam causae, atque tempora sunt, in quorum omnium cognitione curationis summa est. Ophthalmiae enim plura communia sunt cum inflammatione, quare etiam ab huius potissimum cognitione medendi ratio trahenda est.

Prae

eter haec discrimen est, si exteriores tunicae la-
ant, vel, si aliae, quae intus in oculo sunt, inflam-
ntur.

Non omnino consentiunt autores de harum externarum
tunicarum numero et denominatione. Plures tunicae ad-
natae, vel coniunctivae, vel albugineae, nomine omnes
comprehendunt. PORTERFIELD in *Medical Essays Vol.*
III. Obs. XII. p. 161. tunicam albugineam in duas diuidit,
quarum alteram, internam, deducit a perioestio orbitae, per
quod, vt notum est, dura cerebri membrana oculi tunicis
iungitur, alteram ab illa membrana, qua interius palpebrae
conteguntur. His superaddit aponeurosin vel epidermi-
dem, (*Aponeurose or Surpeau*) quae his omnibus, et corneae,
innata esse dicitur, id quod ex pustulis saepe in cornea
ortis probat. Nullam mentionem facit illius, quae a mu-
sculorum tendinibus orsa sub adnata sita est. Existima-
uerim, commode has tunicas diuidi posse in intimam, quae
aponeurotica et albuginea dici potest, et a musculorum
tendinibus venit, in adnatam, quae partim a perioestio or-
bitae, partim a tunica palpebras interius contegente, edu-
citur, superque hanc fertur, nec non in epidermidem, seu
extimam tenerrimam, qua omnes, etiam cornea, con-
teguntur. Inter has membranas tenerrimum et cellulosum
contextum esse, et inter eas etiam arterias venasque omnis
generis discurrere, ostendit quaeuis inflammatio, ipsaque
chemosis. Non semel in tunica cornea, maxime si illa
exulcerata fuit, cernere potui arterias minores rubicundo
sanguine confertissimas. Operae pretium videtur, has par-
tes paulo accuratius distinguere.

De oculorum morbis sanum iudicium laturus fabricam et
oculi ipsius et partium ambientium cognitam perspectam-
que habeat necesse est. Optime de ea expositum est in *De-*
scriptione Anatomica oculi humani iconibus illustrata Auctore
IOH. GOTTFR. ZINN. Göttinguae 1775. Itemque in *Mé-*
moires & observations anatomiques, Physiologiques & Phy-
siques sur l'Oeil. Par JEAN IANIN, a Lion & a Paris 1772.

§. 276.

Τάραξις dicitur, si tunica adnata parum rubet,
tumore ac dolore, quod genus saepe a rebus
tur, quae extrinsecus oculum laedunt, solis aestu,
no, puluere *. Si vero non solum tunica adnata,
etiam aponeurotica, seu albuginea, quae a muscu-

lis oculum mouentibus venit, valde inflammata et hae tunicae adeo intumescunt, vt super corneam ferantur, *χῆμωσις* nomen est **, Est vero haec magna cum inflammatione, acerbo dolore ac nocturnis vigilia, caput etiam multum dolet, calet, et in grauitas sentitur. Et hoc vitium quandoque oculo solet a subita externaque causa, non raro vero per febres aliosque morbos, si horum materia in oculum conuertitur et hanc periculosiorem inflammationem mouet.

* Inflammationis initium dicitur GALENO in Lib. VI. Et Hippocr. Comm. V. Textu III. T. IX. p. 515, Vid. PAVLVS AEGINETA Lib. III. c. 22.

** Conf. PAVLVS AEGINETA l. c.

‡ Si taraxis pro leuiori genere inflammationis habetur, ea differt aliud malum eo leuius, ubi scilicet in albo oculi plerumque versus canthum externum, macula quaedam rubens, definitae figurae, nascitur, sic, vt homo faciem non animadvertat, nisi vel ab aliis vel speculo monitus. Fit crebro in iis, quibus aliqua humoris prauitas est, si vel austrina tempestas est, vel corpus a calidioribus commouetur, aut plenitudo collecta est. Crebro etiam in medico quodam vidimus, qui cum per plures annos specie quadam morbi caduci affectus esset, tandem e oculis discessit. In eius capite, eo quidem haemisphaerio, ubi maculae saepe existerant, magna vomica purulenta repleta est. Similis fugillatio non raro a variolis, in fine morbi itemque a leuiori causa externa progignitur. Rubore circumcusso, sponte plerumque, per aliquod tempus relinqui macula flauescens.

‡‡ Si chemosis est, oculi bulbus et in eo quidem tunica aponeurotica cum exterioribus ita intumescit vt in limbo albi et nigri oculorum seu in limitibus corneae aliam eminentiam sit, et cornea quasi in sinu quodam posita videatur. Simulque albida sit et non perlucida. Saepe palpebrae sine dolore diduci possunt.

§. 277.

Lippitudo, proprie sic dicta, seu ophthalmia humida, est, si ex oculo inflammato copiosior lacryma pellucida, calida et acris profluit, quae et corneam

ex

ulcerat, et quandoque genas, per quas defluit, rodit. Put calet, dolor, qui a temporibus ad oculos pergit, magnus est, cum graui prurigine, oculus omnis is impatientissimus. Nonnunquam etiam palpebris partibus, quae circa oculum sunt, superuenire soletumor, qualis fere in erysipelate esse solet, et saepe inis cutis exasperatur exulceraturque. Tunc pituita lrymae miscetur, illaque crassior fit, et palpebrae per se glutinantur. Tandem omnia siccantur et uerius palpebris inhaeret crusta arida, quae tandem contracta ex cute decedit.

§. 278.

Ξεροφθαλμία, seu arida lippitudo *, dicitur, oculi neque tument, neque fluunt, sed rubent tantum, cum dolore quodam fere leui ac prurigine graues sunt, palpebrae citra duritiam ullam noctu prae graui pituita haerescunt. Frequens esse solet iis, qui aestate anni grantissima vel apricantur, vel per puluerulentas is iter faciunt.

Sunt verba CELSI Lib. VI. C. VI. §. 29. conf. PAVLVS L. III. C. 22. AETIVS L. VII. Cap. 75. et 77. p. 136. Edit. Ald. Gr.

§. 279.

Σκληροφθαλμία est, vbi oculus et palpebrae dures sunt, nec sine molestia mouentur aperiuntur. Dolent etiam ac rubent, nullus vero pituitae rrfus est, sed angulis et palpebrarum cartilaginibus haerescunt gramiae, seu *λήμαι* paruae, siccae et dae. Nec palpebrae inuerti possunt. Saepe haec hthalmia oritur in ardentibus febribus, aliquando, oculo multa spirituosa fuere imposita, et si lacryalis glandula scirrho laborat *.

* Vid. AETIVS c. I. Cap. 74. et 77.

§. 280.

Ψωροϕθαλμία dicitur, si oculi scabri sunt, qui maxime in angulis et palpebris esse consuevit. Angulus cum multa prurigine rubent. Humor enim ex paucis, falsus, acer, qui omnia exasperat. Enascitur si ex variis causis lacrymae calidae acres factae sunt *

* AETIVS L. c. 76. 77.

§. 281.

Vbi autem inflammatio etiam interiores oculi membranas, et praecipue choroideam, occupat, phlegmone nomen est. Hoc malum peius est, caput calet, et dolor est fere intolerabilis cum febre, neque eterna vigilia et delirio. Haec ingens inflammatio maxime, si a subita causa orta fuerit, saepe tanto impetu erumpit, ut oculos e sua sede propellat, id quod quia oculi procidunt, πρόπτωσιν * Graeci appellant.

* CELSVS L. VI. c. 6. n. 8. PAVLO vero L. III. c. 23. p. 33 dicitur Ἐκπιεσμός, qui πρόπτωσιν retulit ad staphylomatia genera.

§. 282.

Est etiam magnum discrimen inter ophthalmiam acutam, quae cum inflammatione est, et, quae acutum summum per vnum alterumve mensem durat, plerumque vero celerius finitur, et inter lippitudinem longam. Prior enim plerumque oritur, si mala materia ex corpore in oculum vertitur et in hoc inflammationem mouet, vel si ex aliis, etiam subito enatis, causis hoc accidit. In chronica vero nunquam siccescunt oculi, sed semper humore tenui madent, qui ex leuibus momentis inflammationes excitat, et saepe totam vitam hominis infestat.

Praeter

§. 283.

Praeter haec, si in totius corporis humidis ali-
quod vitium est, aliquando diuturna lippitudo enasci-
tur. Est enim frequens ophthalmia iis, quibus cor-
poribus vitiatum est, nec non, quos venerea lues
tauit *. Nonnunquam ophthalmia plures inuadit,
epidemica est, aliquando periodica, quae certo
tempore reuertitur.

Certis obseruationibus compertum est, ophthalmiam ex
gonorrhoea virulenta, repente cohibita, ortam fuisse, vbi
bituita copiosior, crassior, flauens, humori purulento fere
similis, qualis per vrethram ferri consuevit, maiori impetu
erupit et ex oculo effluxit. Idem testatur St. YVES P. II.
L. IV. Art. X. p. 187.

Ex gonorrhoea maligna repressa ophthalmiam humidam
simul et acrem nasci vidi, quam quia recens orta erat, re-
fricata gonorrhoea, facile post paucos dies profligare datum
fuit. Videatur etiam ALEXAND. CAMERARII *dissertatio
de ophthalmia venerea*. Tubingae 1734.

§. 284.

Ex supra dictis clarum est, oculos inflammari, si
per sanguis in minores arterias, quae aliis teneriori-
bus pellucidis humoribus accommodatae sunt, trans-
mittitur (34). Id vero etiam ex variis et sibi contra-
causis incidere solet. Extrinsecus interdum ictus
oculi sic laedit, vt eius membranae, quae tenues
sunt et neruosae, inflammentur. Ei quoque, nec non
in aliis partibus, vulnera inferuntur, quandoque casu,
quandoque manu chirurgi. Si etiam caluaria fracta
est et eius exterior interiorue membrana laesa et in-
flamata fuit, etiam in oculo inflammatio se ostendit,
quae adnata a perioestio orbitae incipit, hoc autem cum
membrana dura aequae, ac perioestio externo, commit-
titur. Etiam omnia acriora, ignis, externus et ad-
iutus calor, fumus, oculum offendere et inflam-
mationem mouere solent. Pueri, quibus nares hu-
mides

mentes non emunguntur, saepe turpiter lippire: lent. Quandoque sub partu obstetricia manus oculi grauius afficere potest.

† In pueris quoque ex mucosa et abundante lymphâ, quâ alioquin varia exanthemata in facie, labiis, auribus et per capillata capitis, gignit, fit lippitudo, etiamsi nihil eorum admissum est, quae, ut Auctor in §. seq. dicit, prohibent.

§. 285.

Sunt vero aliae quaedam causae, quae oculi ophthalmiam adferunt. Ex his potiores sunt, si tarrhi et sudationes repente fuere cohibitae, et, si caput calens frigus adspirauit. Vel, si tempestates non aequales sunt, sed multum ac repente variant, et insensibilis expiratio coercetur. Si scabies, porrigi seu squamulae, quae inter pilos surgunt, neque non varia aliaeque cutis vitia, ex toto medicatione prohibentur non raro mala materia in oculos vertitur et mouetur lippitudo. Interdum etiam per vlcera exesae sunt glandulae Meibomii, id quod iis accidere solet, qui ex variolarum morbo conualuerunt. Si enim oculi variolis infestantur, palpebrae vero, inter se per purulentum humorem glutinatae, diducuntur et, meditatione imprudentia, impositis variis medicamentis agitantur, manent vlcera, et chronica lippitudo, quae in quibusdam nulla ope sanari potest; utque sic, quod per se exiguum est, maius imprudentia curantis fiat. Huic valetudini etiam obnoxii sunt pleniores et sanguine abundantes, quibus haemorrhoides fluere solitae et menstrua suppressa sunt, quibus aluus non respondet, et quibus in capite vel grauior dolor, vel longae imbecillitas est. Vbi oculus, vel crebrius, vel diutius hac valetudine vexatus fuit, illa, si etiam admotis auxiliis cessit, saepe ex leui occasione reuertitur, quia oculorum membranae multum infirmatae sunt.

* Crebri

Crebra animaduerfione cognitum est, oculos, quos variolae infestant, optime custodiri, si palpebrae inter se glutinantur. Sic enim lux et aer auertuntur, quae neruolarum oculi membranarum inflammationem maxime concitare atque accendere solent. Non solum itaque superuacua, sed etiam nocentissima curatio est, si variis rebus palpebrae superinunguntur, vel vaporibus fouentur et fibrae laxantur, vel, si, diductis palpebris, multa medicamina in oculi angulos inferuntur, ut natis variolis medicamenta inducantur. Vix vnquam haec profuere, quae, quod oculum agitant, variolas longe nocentiores reddunt. Nam hae, si nulla adhibita medicatione tolerantur, finita suppuratione, sine noxa decidunt. Si enim variolae malignae sunt et rodenti humore plenae, nec quidquam esse puto, quod noxam auertere possit.

Sunt tamen, qui hac de re aliter sentiant; in quibus est RVDOLPH. *Augustin.* VOGEL in libro inscripto: *Academicae Praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus.* Götting. 1772. Quemlibet suo quidem ingenio et audacia abundare facile patimur, non possumus tamen non monere, humorum affluxum ad palpebras, anteaquam variolae aridae fiunt, diductas fere semper augeri. Si ad canthos oculorum pus colligi videtur, linteolo molli vel spongia inbibendum est subinde.

§. 286.

Leuior lippitudo et tunicae exterioris inflammatio in phlegmonem (281) verti potest, si oculo superantur medicamenta, quae refrigerant *, reprimunt, et non spirituosa, quae et teneriores humores cogunt neruolas tunicas grauius offendunt.

Vidi phlegmonem, et ex hac intus ruptum ac foras procedentem oculum, cum empiricus leui ophthalmia laboranti oculo candidi panis interiorem partem ex gelidissima aqua subactam per aliquot dies superimposuisset.

§. 187.

Orta vero lippitudine, ex certis indiciis scire licet, id euenturum sit, quorum quaedam omni lippitudini communia sunt, quaedam vero propria. Inter communia nemo ignorat, omnem inflammationem, quae

quae altius descendit et interiores oculi membrana occupat, id quod in phlegmone fieri supra (281) tulit, periculosiorem esse, quam illa est, quae in exterioribus consistit, et cui non magnus dolor accessit. Maior autem metus est, et caecitatis periculum, si ophthalmia magnam febrem adfert, vel, si hac febre veniente ophthalmia exasperatur. Plerumque et febrem *, nec non alui profluuium **, ophthalmia sequitur. Deiectiones autem, quae medicamentis nimis valentibus petuntur, perniciosae sunt et corneae membranae mucosam exulcerationem adferunt. Si lippitudinem praecedit cephalaea, aut, si haec superueniens pertinaciter inhaeret, saepe lumen amittitur. Si vnus oculus ophthalmia infestatus est, is magis dolet, quam, si vterque laborat. Non raro tantum, si vnus a causa etiam subita male adfectus est, et a inflammatione corripitur. Citius sanescunt oculi vltorum, et quibus bonus corporis habitus est, quam infantum, senum, et alio morbo conflictantium.

* HIPPOCR. Coac. Praenot. §. 130. T. I. Edit. Lind. p. Conf. DVRETVM in Coacas L. II. p. 129.

** HIPPOCRATES Sect. VI. Aphor. XV. *περὶ κελσιῶν* sub fin. Ed. c. p. 447. in Coacis p. 542. Conf. DVRETVM p. 139.

*** In Coacis Edit. Lind. p. 542. DVRETVS c. I. p. 130.

§. 288.

Inter ea vero, quae certo lippitudinis generi propria sunt, de phlegmone (281) et chemosi (276) commentum est, ex iis saepe luminis caecitatem oriri. Phlegmone quandoque orto hypopio finitur, et, maturius auxilium cum quadam temeritate rapiat, oculus suppurat atque rumpitur, (vide de hypopio) *Ξηροφθαλμία* (278) fere sine periculo est, *Σκληροφθαλμία* (279) in gangraenam, suffusionem et atrophiam tendit, ac nonnunquam perpetuam caliginem adfert.

§. 289.

In humida ophthalmia (277) calida, tenuis, falsa lacryma rodit corneam, quare magnum periculum ulcerum est; vbi vero pituita lacrymae misceri coepit, nec longae valetudinis, nec exulcerationis magnus metus est, certa autem fere fiducia, si crassa pituita mollisque esse incipit, eaque media palpebrae inter se coalescunt, nec non, si palpebrae, et his iuncta carnis, multum intumescunt, exterius crusta oculo super incrementum (277). Non sine summo periculo est ophthalmia venerea et scorbutica (283), praecipue, si in orbita os aliquod vitiatum est. Chronica lippitudo, (282. 285) si inualuit, difficulter eradicatur.

§. 290.

Diuerfam curationem desiderant hae valetudines, prout ex variis occasionibus ortae sunt. Quaedam autem in omni lippitudine fere necessaria et communia sunt. Quicumque enim ophthalmia laborat, eum oportet in obscuro esse, vt ab omni luce omnique colorum usu abstineat. Alienum est, oculos lippientes deligari, tanto magis, si pituitae, vel tenuiores et acrioris, vel crassioris, cursus oculum infestat. Periculum enim est, ne palpebrae inter se cicatrice glutinentur, vel oculo inhaerescant. Acrior etiam humor, si non effluere potest, corneam magis rodit et exulcerat. Vbi vero, post adhibitam variam chirurgiam, magis e re videtur, oculum deuinciri, etiam hoc sano oculo fieri, necessarium est, quia is, qui laborat, huius motu sensuque concitatur. Aeris ventorumque afflatus, qui omnibus inflammatis officit, etiam oculos, quos inflammatio occupat, concitare solet. In omni, tum acuta, tum chronica, lippitudine vitanda omni modo causa, quae lacrymas excitat, et acria medicamenta non alio magis nomine his nocent;

nocent, quam, quod lacrymas mouent. Infanti igitur frequens ploratus saepe impedit, quo mirum oculi sic affecti sanescant, in quibus omnium harum valetudinum difficillima curatio est. Nec enim satis est, solam oculorum valetudinem intueri, sed etiam totius corporis habitum, et ad eum, tum omnium curationem, tum victum etiam, a quo magnum praesidium petendum est, dirigere. In acuta et humida ophthalmia, et quae cum erysipellate palpebrarum, si febris accessit, non parum proficiet medicus, si felix ad remedium uti nouerit, quo crudi, tenues, ac acrodesque humores digeruntur, cocti fiunt, crassaeque molles. Alius, si adstricta est, semper valetudinem auget, nunquam autem valentioribus (28) illa, sed lenissimis (63) ducenda, vel potius lenienda est.

† Nisi opus fuerit deligatione ad medicamenta, quae imponi sunt, retinenda; fere optimum est, si oculum vtrumque certe affectum linteum ex serico paratum, coloris viridis laxo contegit, dependens libere a fronte; sic enim et lumen ab oculo arcetur, et is fouetur. Ad communes curationes pertinet quam maxime causarum in corpore haerentium remotio. Itaque morbus quicumque particularis repressus et ad oculos conuersus reuocari ad sedem pristinam debet. Catameniorum fluxus suppressus ciendus est; quo plurimum facit sanguisugarum suctio in labiis rimae externae partium naturalium, et usus pediluuiorum atque frictus plantarum pedum.

§. 292.

Si vero ad singulas species veniendum est, Taraxacum (276) saepe sponte et celerius desinit, modo aeger luce et omnibus, quae oculum concitare possunt, abstineat. Si vitium a causa intus orta enatum est, confert, quod ex frequentissimis collyriis est. Hoc habet parum vitrioli calcinati et tutiae praeparata quae per se teruntur, iterumque miscentur, adiecta post aqua foeniculi, vel rosarum. Si malum tempus statum vitio, et represso sudore, vel ex catarrho ortum fuerit.

it, ei recte succurritur, si aeger horis matutinis fudat. Cauendum tamen, ne hoc, datis calidis medicamentis, et in cruditate tentetur.

† Si hoc genus a catarrho est, febris ratio habenda est, ut vel si levis est eius causa nihil fiat, vel si paulo maior aestus fuerit, diluentia. pulvis ex nitro, sale mirabili Glauberi, cum aquis diapnoicis itemque infusum florum iambuci fumantur. Vtrobique regimine temperato opus est. Post tempora Platneri flores seu cineres Zinci, extractum saturni a multis praeferuntur his, quae sunt ab eo laudata et olim fuerunt ab aliis adhibita.

§. 292.

Extrinfecus si oculum ictus valentior laesit, mox sanguis ex brachio mittendus et auertendus est humorem ad oculum coitus. Ad quod etiam idoneum est, ponere medicamenta modice reprimentia. Oportet i album et aquam rosarum vel foeniculi in vas deindere et adiacere parum tutiae praeparatae atque chari Saturni, idque mediante rudicula, vel spatulaperagitare atque miscere. Vbi facta unitas est, mitti in id debet panniculus, qui hunc humorem accipiat, isque super oculum poni. Panniculus, cum uruit, iterum madefaciendus est. Haec res refrigerando inflammationem coercet, et aliena est, si iam oculum prorsus tenet, quia eam in pllegmonem mutare potest (286). In hoc casu magis opportunum est, si herbae absinthii, hyssopi, rutae, maiorese, ex vino austero rubro coquantur, et sponsia, penicillo, quod ex tali decocto exprimitur, oculus utetur. Nec aliena est aqua vulneraria, quam minimum spiritus habere oportet, cum aqua foeniculi mixta, nec non, si calidae aquae octava, vel decima iter, pars spiritus ardentis admiscetur et oculo ponitur. Omnia spirituosaf valde aliena sunt oculumque durum ac scirrhosum reddunt. Vbi autem oculus induruisse videtur, adiacienda sunt pauca emollientia

lientia. Vitandum vero, ne his fomentis intus permoueatur. Noctu superdari potest pomum coctum vel putre, calidum, cui minimum camphorae cum saccharo contritae adiicitur.

§. 293.

Si paucus sanguis in tunica adnata suffusus est, nihil commodius est, quam locum, vel lacte muliebri vel sanguine calido columbae, inungere, qui ex euulviuo animali penna commode exprimitur.

CELSVS Lib. VI. C. VI. §. 39. PAVLVS L. III. C. XXI. p. 3.

§. 294.

Si fumus, vel aliud acre, oculos laesit, vtendum etiam calido lacte est, quo oculus, adhibito caliculi seu vasculo ad id idoneo, (*le Bassin oculaire*) * elipote est. Lacti parum croci commode admiscetur. Vel plumula in cremorem seminis cydoniorum (22) demittitur, qui hac mediante super oculos inducitur. His, medicamentis optime leniuntur intus in oculi latentia acria. Alii pauciora camphorae grana cum amygdalis contrita aqua excipiunt et in oculum demittunt. Vapore emollientium herbarum oculi fouendus, noctu vero superdandum pomum coctum

* GARENCEOT *des Instr. Tit. XIV. Art. IV. p. 432.*

† Quaecunque fuerit alienum id, quod oculum vexavit, si fumus, seu res puluerulenta, seu insectum, posteaquam vel lenientibus elutum est, aut extergendo exemptum, conveniunt ea, quae §. 292 proposita sunt, maximeque collirium ex aquis ophthalmicis et floribus Zinci. Plethori etiam sanguis detrahi potest: — Si ferri particula inter oculi bulbum et palpebras haeret neque oculis medentibus patet, magnete armato fortius trahente aliquando vtendum est, vt ea foras proliciat protrahaturque. Quod factum si fuerit, simili medicina adhibita vascula roboranda sunt ne sanguinem copiosorem in se admittant. Si res quaecunque aliena diutius vexarit oculos, vt iam inflammatio et prorsus teneret, antea adhibenda sunt discutientia.

§. 295.

Plus negotii est, si lippitudo humida oculum tenet, 77) quae tamen etiam magnum discrimen recipit. enim vitium recens, eiusque maior impetus est cum ore, et lacrymae eunt salsae calidaeque, cum his ro palpebrae intumescunt, illud, quod (287. 290) opofui, tenendum, et febre ad remedium vtendum. Vix enim alio remedio opus est, quam quiete et stinencia. Tenuata enim febricula, et, dum inflammatione, orto in palpebris tumore, externas partes occupat, et ipsa cutis, natis in ea pustulis, exasperatur, uitam mollem fieri deprehendimus, cuius, quo copiosior cursus est, et quo magis ea crassa, palpebrae intumescunt, eo plus detrahitur inflammationi (289). in hoc casu aliquid, praeter abstinentiam et alia, quae intus aduersus febris impetum dari solent, tenendum est, foueri ab initio potest oculus vapore herbarum mollientium, quo ad externas partes euocetur inflammatio. Nocet vero, quam maxime nimius calor. Nec palpebrae, si coaluerunt, diducendae, nec quidquam in oculum demittendum est.

§. 296.

Maius periculum esse solet in ea lippitudine humida, quae non, vt prior, vetustate matura fit, et cui nulla febricula adiuuat. Humor enim, qui non copiosus, sed acrior effertur, cuius vero cursus citius perseuerat, rodit corneam. In hac igitur mala causa sunt, ex quibus oculi per totam vitam caligant. huic vitio medendum est, necesse est, vt, quanta fieri potest diligentia, auertatur mali humoris aditus ad oculum. Corporibus itaque valentioribus, et quibus humoris abundat, plenaeque venae tument, vena facialis in talo incidenda est. Vel, si vires et alia ad id non patiuntur, copia tamen sanguinis ad aegrum

aegrum male habet, tergo aliisque sedibus cucurbitulae, concisa prius scalpello cute, imponendae sunt. Vel cucurbitulae integrae cuti aptandae imprimendaeque sunt, ut diu inhaereant. Utile etiam est, si pedes crebrius in calidam demittuntur, iisque frictio adhibetur, et si alius ducitur lenioribus, satis tamen valentibus, medicamentis. Vbi vero aliquod in corpore vitium est, ubi scabies repressa fuit, porrigo prohibetur, aut, ubi ulcus cacoethium et chronicum curatum fuerit, danda sunt medicamenta, quibus intus humida purgantur, et quae faciunt, ut cutis vitia reuertantur. Ob id etiam expedit, cutem, quae adfecta olim fuerit, panno asperiore fricare. Vitandum vero, ne his nimium citentur humores, quae res etiam humorem in oculo calidum nocentemque reddit.

§. 297.

Maximum vero aduersus hanc lippitudinem auxiliium est in cantharidibus, si illae emplastro excipiuntur et cuti imponuntur. Parum vero proficiunt, minora emplastra nuchae iniiciuntur, pustulae vel incisae mox effuso humore siccantur. Longe magis opportuna emplastro sedes est inter scapulas, cui locum illud, et quidem maius ac valentius, imponitur. Pauca enim asperiori dolore, quo cutis sic vellitur, malum materiae cursus ab oculo auertitur. Ulcera etiam quae sic adusta cuticula sunt, haud protinus siccantur, sed impositis pinguibus mollientibusque diu, et quae quandoque per mensem, tolerare, pusque, quantum potest, mouere oportet. Si etiam haec ulcera nihilominus arida sunt, expeditissimum est, linimento paucos cantharides adiacere et illud loco inducere. Si his malum leuatum, non vero oculo ex toto sanitas restituta est, expedit quandoque, iterum ad hoc auxilium venire, priori etiam ulcere nondum percurato, cantharidibus furae iniicere, et in hac quoque pus commouere.

§. 298.

Solet tamen nonnunquam euenire, vt nec his auxiliis lippitudo cedat, sed vt pituitae rodentis cursus hilominus maneat, quae res paulo acriorem curationem requirit. Veniendum enim est ad illam palpebrarum ξύσιw; quod chirurgiae genus HIPPOCRATES* opofuit, nostris vero temporibus, per plura secula permiffum, Io. Thomas de WOOLHOVSEN reuocavit**. Raduntur cruentanturque palpebrae fasciculo umarum, quae ex spica fecalis euelluntur. Dorsum enim glumae spinam habet exterius copiosissimis et minutissimis spiculis asperatam. Harum glumarum piculus filo constringitur et eo raditur interior palpebrarum in exteriora versarum tunica. Sanguis, qui ex fauciatis vasculis elicitur, et qui plerumque ex aere cogitur, tepida aqua eluendus, et post oculi diligentius vapore aquae calidae, ex qua spongia primitur, fouendus est. Si noctu oculum obligare ait chirurgus, necesse est, vt aliquid demittatur in palpebras, ne illae cum oculo glutinentur. Ad fere idonea sunt hormini femina, quippe quae lacera inter diductas palpebras inferuntur, supraque posito cocto, vel putrido, pomo oculus deuincitur. Nec palpebrarum ξύσις saepe, et tamdiu, interposita tamen semper aliquot diebus, repetenda est, donec remittat inflammatio et pituita crassa, atque mollis incipiat. Hoc proxime futurum esse significat sanguis ex rasis palpebris fluens, si is non tam repte in tenax coagulum vertitur.

In Libello de Visu. Edit. Lind. T. II. p. 353.

* Vide BVRGGARDI DAV. MAVCHARTII ὀφθαλμοξύσιw nouantiquam, seu Woolhusiano-Hippocraticam, Tubingae, clō 10 CC XXVI. et meam Diss. de Scarificatione oculorum, Lipsiae, clō 10 CC XXVIII. nec non Programma, quo Anno clō 10 CCXXXV. sectionem publicam cadaueris indixi, et in quo hanc chirurgiam ab aliorum contemptu vindicaui, et, quale ei pretium statuendum sit, expertus ostendi.

K 3

† Hoc

† Hoc genus palpebras cruentandi non ab imperito neque a perito promiscue aut sine multa deliberatione administrandum esse nemo non videt. In magna vel loci affectu universi corporis sensibilitate vehementer nocet.

§. 299.

Interdum, discussa inflammatione, in albo oculo relinquuntur venae sanguine turgidae et quasi vacuosae, quae, quia ad corneam etiam perveniunt, efficiunt, imo, si in hac mala ulcera sunt, haec curant et maiora reddunt. Hoc potissimum accidit, oculo super data fuere refrigerantia atque reprimentia (286. 292). Commodissimum est, his venulis acuto vel hamulum acutum paulum mucrone intus recepto subicere, illasque adductas minori scalpello percipere, sanguinem vero pati fluere, donec conquiescat. Interea vero oculo adhibere spongiam ex aqua calida expressam. Hoc chirurgiae genus nonnulli *Φλεβοτομία* oculi appellant.

§. 300.

Quod si haec perodiosa lippitudo his tandem expugnata fuit et omnis pituitae cursus constitit, reliquias discutiant collyria, quae supra (291) propolae seu aliud, quod sit ex lapide, sic dicto, diuino, cuius pauciora grana aqua rosarum excipiuntur. Opportunum etiam est malicorium et herba absinthii, si ex vitra austero coquantur et ex horum decocto calido expressa spongia oculo subinde admouetur. De ulcerum curatione infra dicendum.

† Lapis diuinus vere nomine suo dignus est. Paratur ab omnibus eodem modo. Alii enim aequas partes nitri vitrioli de cypro, et aluminis conterendo miscent, deinde in vase figulino ad ignem liquefaciunt, denique paulatim refrigerato addunt comphorae spiritu vini contritae partem quasi tricesimam. Alii idem propemodum agunt, verum nihil nitri adiiciunt. Sufficiunt vero, si oculus ipse huius medicamenti sentit, pauca grana eius cum vncia

aquae ophthalmicae cuiusvis; sin sola externa clausis palpebris fouere velis, fons efficacior fiat.

§. 301.

Ξυροφθαλμία laborantibus oculis succurritur etiam vapore ex herba meliloti, maluae, floribus verfici, chamomillae, semine lini, additis absinthio acta, qui vapores non alia ratione, ac mox (300) retuli, mouentur. Intus dari debent lenia, et quae humida luunt; ptisana, cui cornu cerui raspatum adiici potest, iuscula, lac, amygdalae ac papaueris semen cum aqua contusum, aquae minerales Selternae, vel solae, et cum lacte.

§. 302.

Aduersus σκληροφθαλμίαν (279. 288) vix idonea auxilia inueniuntur, quam et cantharides et ξύσις (98) valde exasperant. Haec timeri potest, si cum calore ardente est, vel cum glandulae lacrymalis scirrhus, enim (297) primum incidit, metus est gangraenae, postea, carcinomatis. Ex utroque vero vitio lumen amittitur et oculus emoritur, imo quandoque et morbus mortem maturat. Si febris est et maior inflammatio, ei intus datis congruis succurrendum est, et, si malum vehementius urget, multus sanguis ex arteria in temporibus incisa mitti potest, super oculum vero imponenda mollientia ac resoluentia.

§. 303.

Vbi autem glandula lacrymalis induruit, et fere scirrhusa est, propterque id, quod nullus humor ad oculum fertur, is dolet atque caligat, ei succurrendum est lenioribus mollientibusque remediis. His opportunum videtur, quod veteribus crebrius in usu fuit, esypum, seu sordes, lanis pecudum adhaerentes *. Confert etiam radix liliorum alborum et herba acetosel-

lae cum butyro, sine sale, frixa et imposita. Intus danda sunt, quae mox in *Ξεροφθαλμία* commendantur (301). Si morbus inueterauit et glandula prorsus induruit, superuacua curatio est.

* Vide DIOSCORIDEM Lib. II. Cap. 84. PLIN. L. XXIX. C. 12. p. 492.

§. 304.

Υεροφθαλμία (280) vix aliam curationem desiderat, quam *Ξεροφθαλμία* (301). Adhibenda intus sunt, quae leniunt, et humores diluunt, et extrinsecus in oculum demittenda, quae supra (301) praecepi.

† De Pſorophthalmia diligentius scripsit IACOB WARE *Remarks on the Ophthalmie, Pſorophthalmie and purule. Eye etc. London 1780.* Versa in vermaculam nostram haec scriptio legitur in collectione illa: *Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aertzte, Band VI.*

§. 305.

Si *Φλεγμονή* oculum tenet, et symptomata vrgentia mature rapienda cum aliqua temeritate sunt auxilia. Expediit, protinus sanguinem ex iugulari vena, et iterum ex talo, mittere, aluum ducere medicamentis idoneis (63), satis tamen valentibus, lotionibus etiam in aluum immixtis; cucurbitulas occipitio atque tergo concisa etiam cute, admoovere, pedes crebrius in calidam demittere et fricare, palpebras vero iterum atque iterum et multum scarificare, iisque imponere medicamenta discutientia, quae aduersus inflammationem sunt, et quae diuersis huius temporibus accommodari debent. Si corpus plenum laxumque est, cantharides etiam vtiliter adhibentur. Sedulo oculus contra aera omnemque lucem custodiendi sunt. Saepe tamen his omnibus auerti nequit, quo minus oculus, orta suppuratione, rumpatur.

§. 306.

Curationem, etiam difficillimam, requirit ophthalmia, si illa chronica facta fuit (283), maxime ea, quae post variolas manet (285.) Si aliquod vitium per totum corpus diffusum est, huic ante omnia congruis mediis succurrendum est. In omni fere malo prociunt decocta sarsaparillae, chinae, parreirae brauae, seminis foeniculi. Alius quoque ducenda est paulo lentioribus, ad quod idoneae sunt pilulae de succino ratonis, vel si extracto panchymagogo Crollii mercurius dulcis et resina ialappae adiiciuntur. In victu hibendi lenes et glutinosi cibi, omnia vero acria atque acida, nec non et valentiora, remouenda sunt. hac valetudine inurenda sunt humeris, vel nuchae, ceras, quae fonticulos appellamus. Nullum vero auxilium efficacius est, quam, si per cutim in nucha fissam lina xyлина plura ita torta traiciuntur, ut in unitas sit. Haec lina in ulcere relicta bis in die sic incuntur, ut ulcus subeat pars, quae superior fuit. Num enim sic adductum mordet et exasperat ulcus agnamque suppurationem mouet. Setum vel seceum vocant chirurgi, de quo, et fonticulo, vide infra. Si his tandem euictum fuit malum, sub finem endum est collyrio, quod habet pauciora grana lapidis diuini et croci metallorum. Ocularius medicus inter Gallos, S. yves, alio usus est, quod ipse composuit, et aquam ophthalmicam rubram (*Eau rouge*) nominauit; quod ad dissipandas reliquias opportunum esse existimo.

§. 307.

Si glandulae Meibomii exulceratae sunt, et propter palpebrarum cartilagineas rubent, cum leui pruriginis graues sunt, et noctu pituita inhaerescunt, id quod saepe post variolarum morbum fieri deprehenditur,

superuacua omnis curatio est, nisi vlcuscula satis fuerint purgata. Id autem fieri potest, si his tempera manu admouetur lapis infernalis, vel aliud medicamentum adurens. Ne haec res oculum offendant, is prius alia re inungendus est. Non inutile est vnguentum Woolhusii. Hoc componitur ex flore aeris eloto leuissimo, quod butyro sine sale, vel teneriori axungia excipitur et cum hac conteritur. Nam et hoc curanda vlcera idoneum est.

† Siue phlegmone oculi siue chemosis fuerit, aut alia quavis ophthalmia acuta cum multo dolore, calore et tumore nihil efficacius vasa cruore nimium infarcta deplet et exhausta haurit, quam suctus sanguifugarum, si earum plures maiores palpebris et regioni canthi externi oculi apponuntur, et, deciditibus animaculis iis, spongia aqua calida plena identidem admouetur, vt largus fluxus sanguinis interueniat et promoveatur ex illis vulnusculis. Posteaquam hoc et pro re nata quaedam ex illis a PLATNERO discrete recte acta sunt, cum spe successurae resolutionis adhibetur discutientia et roborantia externa, tanquam acetum lythargyrii aqua ophthalmica quadam dilutum, cui et sal ammoniaci aliquid adiectum est. Si ophthalmia humida fuerit, non sal sed lapis diuinus adiiciatur. Vehementis doloris nimii poscit etiam anodyna, ipsum adeo opium quo quidem remedio h. e. lacryma papaueris veteris teste CELSO nostro, saepius quam recentiores vsi sunt. Neque tamen ab eo vel hi abstinerunt, vt SIEF illud cur opio monstrat. De vsu opii scorsum et praecipue in lipitudine scripsit IACOB. WARE cuius scriptio legitur in collectione illa *Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte, Band VI. pag. 301.*

§. 308.

Nec ophthalmiae, quae ex scorbuto, vel venere morbo, nascitur, mederi licet, nisi expugnato vitio quod in humidis et per totum corpus diffusum est. Animaduersione crebra innotuit, nec eiusmodi ophthalmiae auxilium esse in pyralismo, qui argento viuo concitatur, sed, eo concitato, saepius accidere, vt oculus inflammatus rumpatur, vel, vt acrior humor corneam exedat, et in ea cicatrices, aciem corrumpentes relin-

inquat. Aliena et hic ξύσις (298) est. Si malum coercita gonorrhoea ortum fuit, illudque recens est, ania adhibenda sunt, quae noxiam materiam in interiora depellere et virulenti humoris profluuium ex nitalibus reuocare possunt (124). Inter haec etiam ut alui duktiones, frictiones, balnea et fomenta calida et mollientia genitalibus admota. Super oculum ri potest linteolum ex aqua vulneraria cum aqua eniculi et plantaginis remixta expressum. Adiuuat iam collyrium, quod tutiam habet, et quod malam materiam in oculos decurrentem aliquantum tenet. humor valde acris est et oculum mordet, is cremore minis cydoniorum superinungendus est, vel lacte lido eluendus. Nec alia curatio est, si ophthalmia scorbuto coepit.

† Lippitudo chronica si ab humorum vitio venereo, nostra aetate adeo familiari, scrophuloso aut alio quouis genere spissorum ali videtur, fere absque vsu prouido pharmacorum ex hydrargy non sanescit. Cum decoctis igitur paratis ex radicibus demulcentibus et diureticis, aliquando etiam addito lacte, aut alternis diebus aut quarto quoquedie intus sumi debet dosis mediocris mercurii dulcis, et subinde, maxime aluo parum recte respondente, aluum leniter purgans medicina; ac praeterea crebrior pediluuiorum vsus prodest. PLATNERVS mercurialium pharmacorum laudator parcus fuit.

†† Inter causas internas lippitudinis chronicae iure meritoque ponenda est labes scrophulosa, quae aperientibus, humores mutantibus et roborantibus medicinis antea debellanda est, quam ad externorum vsum progrediari. Initio adhibendum est calomel, cui deinde cortex Peruvianus adiungendus, denique subiungendus est.

††† Tutiae mentio a PLATNERO fit crebrius. Ea autem et tenuiter contrita sit neque adulterina.

VITIA OCVLORVM

EX

INFLAMMATIONE ORTA.

VLCERA CORNEAE

§. 309.

Oculos infestant alia genera morborum, quae fere ex inflammationibus nata, his quoque finitimanent, et diuersam curationem desiderant. Ex humida ophthalmia (277), si falsa calidaque lacryma, vel acrior rodensque pituita, effluit, in cornea vlcuscula fiunt; quae etiam serpunt et aciem corrumpunt. Solent autem illa frequenter oriri, si humentibus oculis super data fuerunt reprimentia, frigida, spirituosa et adhibita collyria aquosa, frigida, vel acria. Vtrobet enim modo si oculi curantur, vel, si illi deuinciuntur comprimunturque, si non velantur, sed frigido aeri et largae luci committuntur, vel, si etiam purgationibus nimis valentibus alius ducitur, mala materia acrior fit, quae corneam adurit atque exest. Vlcera in cornea oriri, intelligitur, si in ea aliquid de nigro albidum factum est.

§. 310.

Corneae vlcuscula etiam saepe ex pustulis fiunt quae iis fere similes sunt, quae igne inferuntur (228). Hae, quas *φλυκταίνες* vocant, leuata epidermide (275 *) corneae, et frequentius huius extremo, vbi adnata finitur, insident. Pustulae cum apertae sunt reperitur intus exulceratio colore humori suo similis *.

Vbi

i primum hoc vitium notatum est, oportet protius et inter initia pustulam acu, vel instrumento, (8. fig. VI.) aperire, et humorem, qui subest, emitte, vlcuscula vero recentia lenibus medicamentis tritare. Commodissimum est vnguentum, quod paratur ex tutia, quae crebrius candefacta in vinum detritur et extinguitur, post autem teritur, donec murescat, et axungia quapiam excipitur. Adici test aliquid gummi Arabici.

Vid. AETIVS L. VII. Cap. 31. p. 121. Edit. Aldi.

Vnguento e tutia parato substitui potest vnguentum de Floribus Zinci.

§. 311.

Vlcerum autem plura genera sunt, quibus etiam acribus varia nomina imposita fuerunt *. Singularem animaduerfionem meretur illud, quod ἀργεμον fuerunt. Hoc plerumque ex pustula fit (310), quae aliqua parte extremae corneae, vbi cum adnata immittitur, nascitur. Vlusculum vero in circulo, intus vnea, seu rhagoides, scleroticae inhaerescit, pit **. Hoc vlcus, si profundius descendit et coram exest, laedit fibras motum pupillae praestantes, quibus, in humore aqueo fluctuantibus, perpetuus mor oritur.

Vlcus minime profundum et a mala pituita, epidermidem, qua cornea contegitur, rodente ortum, dicitur veteribus ἀχλὺς, seu caligo. Vid. AETIVS L. VII. Cap. 27. p. 127. Edit. Aldi. in Collect. H. STEPHANI p. 308. conf. GALENO adscriptum librum, cui Medicus titulus est, Cap. XVI. qui vero hunc affectum ad cicatrices referre videtur. HIPPOCRATI in Coacis, Edit. Lind. T. I. p. 578. τὰ ἀχλυάδεα etiam dicuntur caligines ex intus natis imbecillitatibus ortae. conf. DVRETVM p. 482. Ab hoc vlcere non multum differt τὸ νεφέλιον. Vid. GALENI Definit. T. II. p. 269. Edit. Charter. et in Medico c. I. nec non AETIVM c. I. βόθριον est vlcus cauum, purum et rotundum. Καίλαμα est latum, minus profundum. Ἐγκαυμα vel ἐπίκαυμα, (haec duo distinguit etiam AETIVS) vlcus dictum fuit impurum, sordidum,

fordidum, et quasi adustum. Vide GALENUM, AETIUM
PAVLVM cc. II.

** Sic describitur a GALENO in Medico c. I. et ab AESCULAPIO
c. I. Cap. XXIII. Edit. Ald. p. 127. ap. H. STEPHANVM
Cap. 26. p. 308. Aliam definitionem habent Autor Definitio
c. I. p. 265. et EROTIANVS in Dict. T. II. Charter. p. 11

§. 312.

Horum vlcerum curatio superuacua est, nisi praesens
inflammatio leuata, atque salsae calidaeque lacrymae
et acrioris pituitae cursus cohibitus fuerit. Nulli
itaque nouam curationem desiderant, sed faciem
omnia sunt, vt mala materia, quae in oculos inclinat
est, adhibitis communibus praesidiis, auertatur, vtque
ipse humor, si copiosior, vel acrior, ex oculo defluat
vtraque parte fiat moderatior. Ad id vero valent sanguinis
missiones, cucurbitulae, et si pedes crebrius
calida continentur, fricationes (296), cantharides
(297), simul datis medicamentis, quae sanguinem
purgant (296. 306). Aduersus haec vlcera vero ne
praesentius vllum auxilium esse opinor, quam palpebrarum
ξύσις (298), quae, nisi totus corporis habitus
vitiatus sit (283. 308), oculo adhibenda iterandaque
est. Hac enim acris humor ab oculi membranis auer-
titur et in palpebras euocatur. Nec minus necessarium
est phlebotomia oculi, si turgida vasa ex adnata
vlcera pertinent (299).

§. 313.

Vbi vero his dissipata est inflammatio et oculi
siccescere incipiunt, fere sponte ad sanitatem peru-
niunt vlcera. Multum tamen illa adiuvantur, si vnguentum
Woolhouffii (307) in oculum coniicitur *.

* Praestare certe arbitror, si collyria, seu medicamenta oculi
idonea, vnguento, non vero aqua, excipiuntur. Nemini
enim ignorat, humida ac frigida omnibus inflammatis per-
niciosa esse, tanto magis, si vlcera etiam, quae curari debent
humida ac purulenta sunt. Ex his intelligitur, quantum
noceat

noceant illae aquosorum collyriorum compositiones, quae ophthalmia laborantibus oculis, nullo obseruato discrimine, admouentur. Vbi vero vnguentum quodpiam in oculum coniiciendum est, id commode fit, si eo vesica repletur, illaque lino constringitur, post vero eius inferior pars acupertunditur. Dum enim vesica medicamento plena oculo admouetur, digitisque premitur, illud per foramen exprimitur et in oculum coniicitur.

Quae PLATNERVS in hac notula de effectibus collyriorum aquosorum dixit, ea ad vnguenta etiam pertinerent, si de vere inflammatis sermo esset et iis pingua adinouerentur. Nihilominus tamen ad vlcera oculorum curanda praeferrimerentur vnguenta, etenim vis medicamentosa eorum melius et diutius adhaeret locis affectis, quam quae in aquosis collyriis inest.

§. 314.

Ad vlcera vero sordida purganda valent aliae compositiones. Vnguentum nobile est, quod rubrum vocant, et quod habet ceram albam tenuemque cum styro sine sale liquatam, addito pauco mercurio praecipitato rubro. Vel vlceribus, mediante penicillo, tali pictores vtuntur, illini potest sic dictus lapis albus aqua solutus, vel aqua viridis Hartmanni. Necessesse est, vt hoc temperata manu, nec crebrius, vt ne noua inflammatio nouaque lacryma his acerbis concitetur.

Quaquam multa laudantur ad ea vlcera purganda, faciendum tamen est, mercurium praecipitatum rubrum in pollinem impalpabilem contritum, seu quod dicunt, laeuigatum aliis omnibus esse anteponendum; atque ita fere omnes nostrae aetatis medici ocularii sentiunt. Vlceribus purgatis, prodest vnguentum ex floribus Zinci; caeterum si acerbis illis vti velis, antea circumspectiendum est, num quis dolor in oculo vsum eorundem prohibeat.

§. 315.

Est vlceris quoddam genus, quod Graeci *αιγίδα*, *αιγιάδα* appellant. Oritur, si crassa multaue vitula cum collyriis in oculum inditis concreuit et corneae exulceratae inhaerescit. Hoc vlcus sanescere nequit

nequit, nisi prius emollitis ac quouis ferramento, scalpelli manubrio, extritis sordibus.

* Ἀγίς inter corneae fordes ab HIPPOCRATE refertur P. dict. L. II. §. 28. T. I. Lind. p. 508. et in Coacis c. I. 541. Aliae HIPPOCRATIS editiones habent c. I. αἰγί. LINDENIVS scribit αἰγιάδας. Ἀγιάδες membranas, vel si albidas cicatrices, in oculis denotant. Vid. Etymologicum Magnum p. 28. et H. STEPHANI Thes. Gr. L. conf. L. meam de fistula lacrymali. Nam inde αἰγίλωψ nomen habet quia oculus purulento humore, qui ex punctis lacrymarum exit, foedatur.

§. 316.

Tunicam corneam quandoque non vlcera solum infestant, sed illam etiam mali humores emolliunt, turgidam efficiunt, quae res etiam aciem minuit. In tali casu vnguento de tutia adiici potest viperarum axungia. Vtiles sunt suffusiones ex olibano, mastice et benzoe, quae tamen oculo, non, nisi eminus posita excipiendae sunt.

CICATRICES CORNEAE.

§. 317.

Ex vlceribus necesse est cicatrices fieri, quae, si corneae membrana perlucens, sunt, aciem hebetiorem reddunt, et, si crassiores fiunt, omnem corneam rumpunt. Quare opera danda est, ut, quae tolli non queunt, extenuentur. Compertum vero est, minime altas leuesque cicatrices, si infantibus obtigerunt, perdetentim, adolescente aetate, sponte extenuari, quod in adultis, nec operosa arte, obtineri potest. Haec curatio longa esse solet et anceps, nec adhiberi potest, nisi prius omnis inflammatio conquieuerit.

§. 318.

Si cicatrix recens est et minime crassa, illam digito tollitque medicamentum, quod paratur ex meli
H

neceſſe eſt, vt excipiat plurimas formicas, cum
 ſolis, vel elibani, calore coquitur.

Si melle, quod formicas exceperit, potiri nequeas, mel
 paulo vetuſtius haud dubie ſimilem effectum edet.

§. 319.

Παράλαμψις *, vel λέυκωμα **, eſt citatrix craſſa
 ſplendens, quae ex variolis, vel vlceribus cauſis, re-
 quitur. Nunquam talis tolli poteſt, aliquando,
 recipue in pueris, extenuari. Hoc potiſſimum fieri
 teſt, ſi praeter craſſitudinem illa intus caua eſt, id
 od fit, vbi minores tunicae, ex quibus cornea com-
 ita eſt, inter ſe receſſerunt. Vbi illud deprehendi-
 in locum, qui ſubtus cauus eſt, infigitur vel recta,
 incurua minorque acus, vel aliud, quod magis
 ortunum et huic chirurgiae accommodatum eſt, in-
 umentum. Fig. IX. Lamella ſic perforata leuatur,
 quantum eius fieri poteſt, ab inferioribus diducitur.
 oculus vero vtiliter demittitur et ſuper cicatricem
 ucitur mel cum formicis (318). Subinde etiam,
 diante penicillo, illini poteſt lapis diuinus aqua
 tus, vel aqua Hartmanni, et poſt mel ſuper dari.
 nia haec ea moderatione fieri oportet, ne noua
 citetur inflammatiō. Nec haec, ſi non ſtatim pro-
 unt, ſtatim remouenda ſunt. Si enim paulum ſal-
 iuuant, ſpes eſt, profeſtum tempore expletum iri.

GALENVS in Lingu. HIPPOCR. Explicat. T. II. p. 99.

Idem in Def. c. I. p. 269. in Medico p. 592. AETIVS c. I.
 p. 130. in Coll. STEPHANI p. 315.

Ad cicatrices tunicae corneae extenuandas delendaſque
 maculas bilem hepaticam anguillae fluuiatilis (*Aalraupen*)
 vehementer laudat ANTON DE HAEN in Ratione medendi
 in noſocomio etc. T. IX. et T. X. Memini equidem, chi-
 urgum quendam eorum, a quibus in adoleſcentia profeſci,
 i ſucco plurimum tribuere. Sed alius piſcis fel non mul-
 o minoris efficaciae eſſe crediderim.

V N G V I S.

§. 320.

"**O**^{υυξ}, f. Vngnis, morbus est, cui figura nomen dedisse videtur. Si enim inter minores, ex quibus cornea composita est, tunicas pus coit, illud vnguem, vel vnguium praesegmina repraesentat. Oritur id plerumque a subita causa, et, si grauior ictus oculum laesit. Esse solet cum vehementi inflammatione, quae etiam omnia auxilia requirit, quae aduersus hanc potissimum profunt (305.) Inter haec vtile est, si etiam arteria in temporibus inciditur, sanguis detrahatur. Ad ipsam vero chirurgiam peragendum est, et pus quamprimum ex sede, qua haeret, euocandum. Illud itaque instrumentum, quod mox in extenuanda cicatrice proposui, vel acus, suffusio curatur, demittenda est recta per partem elatiorem et quae intus caua deprehenditur. Vbi pus ventum est, paulum inflecti debet acus, et per se euocari. Hoc vero ut commodè exire possit, cubitus pronus necessarius est. Metus enim est, ne vlcus altius et ad interiora serpat. Necessaria sunt etiam fomenta quae aduersus inflammationem sunt. Caeterum in curatione similia his esse debent, quae in aliis inflammationum (295. ad 300), vlcerum (312. ad 318) ac cicatricum (318. 319) generibus praecepi.

* Maxima ambiguitas in his vocabulis est, quae apud veteres auctores diuersos intellectus habent. Nec veteres, a quibus omnis autoritas peti solet, inter se consentiunt. CELSEUS L. VII. C. VII. n. 4. Graecorum πτερυγιον, quod membranam nervosam, corneae supercrescentem significat, et vnguem chirurgiam describit, vnguem appellat, quem secus est AEGINETAEE interpres. Nisi forte legendum sit vnguis id quod WOOLHVSIVM suspicatum esse inuenio. Τῶν πτερυγίων fere idem color est, ac vngulis animalium. PAVLVS L. III. Cap. XXII. Edit. Gr. p. 34. in Coll. STEPHANI p. 436. ὑπόπυον ita describit, ut vtrumque vitium, et ὑπόπυον et τὸν ὄνυχον comprehendisse videatur. Nec

clara est definitio hypopyi in libro, qui GALENO adscribitur, cuius titulus Medicus est, Cap. XVI T. II p. 592 nec illa, quae sub titulo πυώσεως legitur in GALENI Definit. c. I. p. 269. At vero in L. XIV de methodo medendi Cap. XIX. T. X. p. 343. GALENVS τὸ ὑπόπυον ita describit, ut vix cum vngue, seu onyche. possit confundi. Eo loco enim illud comparat cum suffusione, seu cataracta, (μετὰ τῆ ὑποχύματος) et docet, fuisse ocularium medicum, IVSTVM nomine, qui, ut hypopyo mederetur, caput succussit, et pus deorsum praecipitavit. Hoc vero in hypopyo fieri potuit, ubi pus in aqueo humore natans graue, si haud adeo multum est, in illum locum descendere potest, qui sub pupilla est, non vero in onyche, ubi pus inter corneae laminae haeret. GALENVS etiam docet, τὸ ὑπόπυον per chirurgiam, et incisa cornea, curari posse. Nemo autem melius τὸ ὑπόπυον καὶ τὸν ὄνυχον distinxisse videtur, quam AETIVS, in Edit. Graeca L. VII. Cap. 30. p. 127. et in H. STEPHANI Collect. Tetrab. II. Serm. III. C. XXVIII. p. 309. qui vtrumque genus sub nomine πυώσεως comprehendit. Legendus vero textus Graecus est, quem addere non dubito, quia Graecus AETHI codex prae aliis inuentu rarus est: Αἱ γινόμεναι ἐν τοῖς ἔλκεσι πυώσεις, διαφόρῃ προσηγορίᾳ τετυχήκασιν. Ὀνύχια μὲν γὰρ λέγεται ὅταν ἀπὸ βαθυτέρου ἔλκεος τὸ πύον ἀπορρέεν, καὶ μεταξὺ τῶν χιτῶνων παρεμπεσόν καὶ σχηματισθὲν τῇ κύκλῳ τῆς ἱρεως, ὁμοίαν ἔνυχος ἀποτομῇ φαντασίαν ἀποτελέσει. πλείονος δὲ συσάντος πύον. καὶ τὸ ὕμινυ τῆ μέλανος ἀπολαβόντος. ἢ καὶ δι' ὅλη τῆ κερατοειδὲς διαυγμένῃ, ὑπόπυον εἶναι λέγομεν τὸν ὀφθαλμόν. γίγνεται δὲ ταῦτα καὶ χωρὶς ἐλκώσεως κεφαλαλγίας προηγησαμένης. ἢ ὀφθαλμίας. συμβαίνει δὲ καὶ φλεγμονῆς προγεγεννημένης, διὰ τὴν πλείονα πλήρωσιν τῶν ὑγρῶν ἐγγενέμενων τινῶν ἀγγείων. καὶ τῆ ἐξ αὐτῶν προχεομένης αἵματος πυομένης. Est itaque ὄνυξ, ubi pus intra corneae lamellas haeret. Πτερύγιον membranula est super corneam crescens, quae, quia quasi expansam alam repraesentat, ita dicta fuit. Ὑπόπυον vero est, si pus haeret sub cornea, ubi secundum naturam humor aqueus est, et plerumque ex sanguine intus in oculo ex venulis emissio, si in pus vertitur, oritur. Aliud est τὸ ὑπώπιον quod significat suffusionem sub oculo ortam, et, si sanguis sub oculis effusus, liuidus sit, est species τῆ ἐκχυμάματος, ad quod hoc etiam retulerunt GALENVS de Compos. medicam. secund. locos L. V. c. I. T. XIII. p. 457. et PAVLVS Lib. IV. Cap. 30. in Cod. Gr. p. 66. in STEPHANI Collect. p. 517. Rursus mentionem fecit HIPPOCRATES in morbis internis T. I. p. 211. Omnes vero Editiones HIPPOCRATIS hoc loco mutatae sunt, si eam excipias, quam CHARTERIVS edidit T. VII. p. 647. Hic enim recte scribit: τὰ ὑπὸ τῆς ὀφθαλμοῦς ὑπώπια ὀνύχια. Nam Editio ALDI p. 84. MERCVRIA-

LIS in Classe III. p. 63. et FOESII Sect. V. p. 98. scribunt ὑπόπυον. LINDENIVS vero recte habet τὰ ὑπώπια, ast omisit nescio. cur, verba; ὑπὸ τῆς ὀφθαλμοῦς. FOESIVS tamen errorem emendasse videtur in Oeconomia p. 647.

HYPOPYON.

§. 321.

Hypopyon 320 *) solet esse cum graui febre, quae concitata continuat, donec oculus, vel ruptus vel a chirurgo adaperatus, pusque effusum fuit. Dolores vehemens vrget, ex quo etiam vigilia et delirium nascuntur. Easdem causas habet, quas oculi phlegmone (281). Nam, ex hac plerumque hypopyon fieri, supra retuli (288). Frequens tamen occasus est in chirurgia suffusionis, seu cataractae, si minime arteria, vel vena, in choroidea acu discinditur laceraturque, ex qua sanguis exit, qui, si eius maior modus est, necessario in pus vertitur.

§. 322.

Si parum sanguinis effluxit, isque transparentem membrana conspicitur, non protinus ad scalpellum veniendum est, sed expedit ante experiri medicamentum. Is enim plerumque discutitur. Ad id vero iuuat sanguinis missio, maxime, si eius multum ex vena iugulari detrahatur. Eodem tempore superhabenda sunt instrumenta, quae ab initio ex reprimentibus (76. 291) post ex discutientibus (79. 292), componi possunt. Et in hoc casu nimius calor et nimium frigus nocere possunt.

§. 323.

Si vero his sanguis discussus non est, et si febris cum dolore increscit, mature ad efficaciorum curationem deueniendum. Aeger in aduerso sedili collocandus est, loco lucido, lumine auerso, ut con-

chirurgus paulo altius sedeat; a posteriore autem arte minister caput eius, qui curabitur, contineat, immobile praestet. Tum admouendum est anceps mucrone longo ac tenuato scalpellum, seu phlebotomus. Ne vero mucrone, dum cornea inciditur, tus aliquid laedatur, et nouum oriatur periculum, uicroni subiiciendum emplastrum est, quo scalpellum uoluitur, et quod illud altius descendere haud finit*. emittendum vero scalpellum recta est loco inferiori, a, ut nec intus iridis fibrae, quae ex choroidea ad tremam corneae oram educuntur, laedantur, et ut iam liberum maneat corneae medium, quod e regione pupillae est. Necessesse postea est, ut aeger sit prono ac in anteriora flexo capite. Si pus propter assitudinem exire commode nequit, plaga, demisso r eam specillo, paulum potest ampliari. Emissore, vulneri induci debet vnguentum de tutia, cui rum balsami de Mecha adiici potest. Plerumque tis ad glutinandam plagam est oui album. Ne vero ulus, quem deuincire oportet, palpebris adhaescat, expedit, in frustulum tenerioris vesicae vnguentum illinere, et hoc inter palpebras inferere**. nec curatio, si in tempore suscipitur, et mox omnem dolorem febremque tollit, et oculo aciem reddit. ex aliqua causa multum sanguinis in oculum effluisse, nec spes est, illum discuti ac resorberi posse, protinus, et antequam dolor atque inflammatio mouentur, hanc chirurgiam et scalpelli operam confugiendum, sanguis euocandus est***.

WOOLHOVSIVS utebatur acu triquetra, cuius mucro inflexus est. Vid. figura in Diss. mea de fistula lacrymali et in celeberrimi HEISTERI Chirurgia T. I. Tab. XVIII. fig. 13. Magis commodum est scalpellum anceps.

* Necessesse est, ut vesica tenerissima sit et laeuigata, qualis esse solet ea, quae inseruit bracteariis, qui aurum in bracteola tenuant.

** Vid. Exemplum in H. A. R. Sc. MDCCIX. p. 16.

L 3

† Post

† Post tempora PLATNERI chirurgia cataractae, quae fit incidendo corneam et extrahendo opacam lentem crystallina primo quidem a DAVIELIO administrata, deinde ab alia varia ratione exculpta est, de qua infra dicendum erit. autem incisio corneae quae hypopyi causa fit, eo confiditius quod corneam ab iride satis remouet vel sanguis effusus vel pus collectum. Neque igitur alio scalpello opus esse puto, quam aliquo eorum, quae ad corneae incisionem ab illis cultoribus chirurgiae illius inuenta sunt.

P T E R Y G I V M E T P A N N I C V L V S.

§. 324.

Extrinfecus quaedam oculis supercrescunt, quae ad corneam veniunt, ei officiunt, aciemque minuunt. Ex horum numero pterygium est, membrana tenuis, nervosa, quae colore parum a cornea differt, etiam aliquantum perlucida est. Incipit pariterque a narium parte et caruncula lacrymali, rarissime a parte temporum, crescendo vero peruenit ad corneam, quam etiam contegit.

† Dicuntur vitia haec aliquando initium ducere ab palpebris vel superiori vel inferiori. Si a parte canthi interni oriuntur, videntur quasi processus membranulae semilunaris.

§. 325.

Maior crassitudo accedit panniculo, seu pannulo qui multo crassior, etiam plura vasa habet sanguine rubro conferta. Nomen enim habere videtur, quod fere rubro panniculo similis est.

§. 326.

Vtrumque vitium ex humoribus enascitur, qui ex oculo oculi membranis exstillant, et a variis extrinsecus accedentibus causis concresecunt. Frequens enim occasio est, si oculi igne aliisque acerbis afficiantur.

, vel, si illi lippientes, collyriis frigidis, rodentibus, ibus, puluerulentis curantur.

Ab acribus humoribus coeuntibus partes has solidas, fere organicas enasci posse mihi non videtur verisimile Pterygium, si non ex panniculo praegresso eodemque mutato existit, videtur a coniunctiua ab inferioribus soluta, cuius vascula nullum sanguinem receperunt, fieri. Panniculos aut ex arrosis aut sanguine repletis expansisque vasculis luxuriare puto.

§. 327.

Hae membranae penitius ad oculum haerent, et, nueterauerunt, medicamentis haud discutiuntur, pello difficiliter tolluntur. Experienda tamen is sunt medicamenta, quae non alia sunt, quam, e in extenuandis cicatricibus proposui (319). od si vero haec vitia his non cesserunt, ea scalpelli ram postulant. Ad hanc vero non temere propedum est, cum res in ipsa curatione aliquod tormentum habeat, et raro ad sanitatem instaurandam e oculorum aciem satis proficiat. Superuenire un solet magna inflammatio, quare etiam nunquam e chirurgia satis tuta est, nisi ophthalmia omnis is fuerit discussa. Ea etiam vere esse debet, aut dio autumnò, fractis iam aestibus, nondum vero is frigoribus.

Linimentum multae famae aduersus vitia ista oculorum videas in *Actis Physico-Med. Acad. Nat. Cur. Tom. X. Append. pag. 287.* Pannum identidem admoto Spiritu frumenti resolutum post biduum vide in commerc. Litter. Norimberg. Ann. XXXIX. pag. 346. Prodest quoque, quam ST. YVES laudauit, solutio lapidis diuini vel et medicamentosi Crollii, itemque Aqua quaedam ex ophthalmicis, in cuius vncia vna soluta vitrioli gr. VI. vel III. Sed si quae prauitas humorum est, ea antea mutari debet. Alia externa ab HEISTERO proposita sunt.

§. 328.

Vbi autem illam curationem experiri statutum est, e, aliquot diebus, chirurgus sedulo oculum, qui

curandus est, contueri debet, aegrum vero iubere, is interea eum huc illuc voluat. Videndum enim num sub his motionibus in panniculo vel pterygia qua parte ruga fiat, quae significat, eo loco id vitium oculo non ita adhaerere. Nam ibi in ipsa curatione primum membranulae apprehendendae sunt.

§. 329.

Si vero illud, quod supercreuit, excidendum aeger supinus in lectulo debet collocari et a ministro contineri. Acus incurua minor linum ceratum tenens per illam panni et pterygii rugam traiecit. Posita acu lini capita apprehenduntur, et per ea membranula erigitur, oculus immobilis praestandus est instrumento, quod speculum oculi vocant, et quod alius minister admouere debet. Quia hoc, sic dictum speculum impedimento esse potest, fere melius si minister diducit superiorem palpebram, chirurgus vero inferiorem, inter quae aeger monendus, ut stat et irretorto oculo sit. Leuanda post membrana vel lino, vel mediante hamulo acuto, vel alio composito, quem *WOOLHOVSIVS ἀραχνοπόδιον*, (*Pa d' Aragnér*) vocare consueuerat *. Necessesse vero est, ut hoc temperata manu fiat, ne aliquid ex oculo secetur. Praestat enim, aliquid relinquere, quod per medicamentis resolui potest, quam oculi tunicas lacerare, quae difficilem curationem recipiunt. Caue dum est, ne ex angulo caruncula abscindatur, ne illa, dum vehementius id, quod exciditur, ducitur, sequatur ac decidat. Si enim abscissa, vel auulsa patefit in angulo foramen, per quod postea semper humor descendit, quod vitium *ἐνὰς* dicitur **.

* Vid. HEISTERI Tab. XV. fig. 30.

** Vide CELSUM L. VII, C. VII. §. 4. TRALLIANVM L. C. 7. p. 52.

Si haec oculorum vitia cum inflammatione aliqua complicata sunt, neque chirurgia haec, neque antea dicta medicamenta acriora locum habere quisque videt. Firmando retinendoque oculo non satis commode inferuire videntur vulgo nota specula oculi. Fortasse maiorem commoditatem praestat vncus ille a CASAAMATIO inuentus vel digitabulum a RVMPELTIO celebri Praefessore ac Directore Scholae veterinariae Dreidensis propositum; de quibus infra.

† Si his vitiis malignitas quaedam est, chirurgiae huius administratio locum non habet. Malignitatem autem prodit durities, asperitas, color valde liuidus, dolor inde saepe ad tempora protensus.

§. 330.

Exciso vero panniculo, vel pterygio, sanguis satis altus fluere solet, maxime, si prior exsectus fuit. In vero neutiquam coercere oportet, sed interea alium calida eluere ac fouere. Si vero, id quod durumque accidit, maioris inflammationis timor est, illam auertendam omne medentis consilium dirigi debet, et adhiberi omne auxilium, quod vel maxime aduersus ea potest (292. 305). Nec ξύσις (298) in priori malo aliena est, sed ad leuandam inflammationem valde utilis. Noctu oculus deuinciri potest, ita tamen, vt aliquid inter eum sit et palpebras, ne cum cicatrice concreascit. Ab initio idonea sunt grana armini (298), post vero vnguentum Woolhouffii (297). Quo etiam cornea purior ac pellucidior fiat, adducit collyrium, cui crocus metallorum admixtus. Nec inutile est saccharum in stanneo vase contritum.

Primis ab hac chirurgia diebus ad auertendam inflammationem mistura aquae et spiritus vini vel frumenti, deinde solutio lapidis diuini vsui externo satis apta est. Nonnulla ad curationes horum morborum pertinentia legi possunt apud de ST. YVES. Fuit enim harum rerum peritissimus et consultissimus. Inspici quoque potest GEORGII CHANDLER, Liber de morbis oculorum, Britannica lingua scriptus et reutonice versus. Is tamen PLATNERVM et HEISTERVM descripsit.

ANCYLOBLEPHARVM.

§. 331.

Palpebrae quandoque inter se non solum pure glutinantur, sed etiam cicatrice coalescunt, ita, oculus non possit aperiri, quod vitium Graeci ἀγκυβλέφαρον vocant. Cui etiam illud subinde accedit, ut palpebrae cum albo oculi, vel cum cornea, cohaerescant. Oritur, si oculi diutius, et sine intermissione, in ophthalmia fuere deligati, vel, si ulcera, tum in palpebrarum extremis, tum in illarum interiori tunica, tum in oculo ipso, negligenter fuere curata.

* G. BARTISCH in ὀφθαλμοδυσεία P. IX. C. VII. p. 185. adducit hominem, cui hoc ex adustione acciderat. Palpebrae per tres annos cohaerentes tandem diductae fuerunt et alius oculus restitutus.

§. 332.

Si palpebrae in ophthalmia humida et erysipelate (277), nec non in variolis (285), solo pure inter se cohaerent, iam supra retuli, nocere in iis diducendis nimiam festinationem, si vero a vulnere, vel ulcere, media cicatrice inter se coalescunt, oportet eas protinus diducere. Hoc, si non nimis valenter si inhaerent, quandoque specillo fieri potest, quod inter eas et oculum inseritur. Experiri etiam oportet filum sericum vnguento de tutia illitum, quod, median acu incurua, obtusa, vel auersa, eadem ratione demittitur. Hoc commode a parte narium fit, cum maiori et interno angulo plerumque relictum foramen sit, et palpebrae aliquantum inter se recedere soleant. Educitur illa lino sequente e parte temporum. Huic filo inferius gleba plumbea innectitur, quae, sic appensa et subinde commota, adducit valentius filum, quo tandem palpebrae inter se diuiduntur.

Vide FABRICIVM, HILDANVM: Obs. Cent. V. Obs. VII.
p. 502.

Periculum hoc concrefcentium palpebrarum saepe ab am-
bustionibus instare, supra iam dixi, et quae ad hoc malum
auertendum facienda sint, proposui. His autem diligentissi-
me vtendum est, quoniam partium concretio, a tali causa
facta, peior est,

§. 333.

Vbi autem hac ratione oculus aperiri non potuit,
endum est specillum minus, fulcum in longum
um habens, super quod demittitur scalpellum
atum parumque falcatum, quo sic palpebrae se-
ur et diuiduntur. Id etiam minori forfice incurua
potest. Post haec autem medicamentum indu-
r idoneum. Optimum est vnguentum de tutia,
parum balsami de Mecha adiici potest. Ne vero,
i oculus deuincitur, palpebrae sauciatae cum cor-
vel albo oculi, cohaerescant, in oculum demitti
et vesica (323), eodem medicamento illita; inter
ebras vero poni possunt exigua linamenta, donec
um exulceratio finita est.

§. 334.

Si vero palpebra qua parte cum albo oculi, vel
a cornea, cohaeret, etiam diduci debet. Fit hoc
mode alio minori scalpello incuruo, cuius mucro
usus est et globulo munitus *. Hoc, temperata
u, inter oculum et palpebras ita subsecatur, vt
que ex palpebra, neque ex oculo, quidquam ab-
idatur, atque, si necesse est, aliquid ex albo oculi
ius, quam ex palpebra superiori; quippe per quam
iores ductus lacrymas ferentes descendunt. Si
em palpebra superior cum cornea cohaeret, huic
e omnia parcendum est. Diducta sic palpebra,
atio non alia sequitur, quam, qualem mox praecepi-
andum enim semper est, ne iterum palpebrae inter
lutinentur, neque iterum oculo inhaerescant.

Vid, HEISTERI Tab. XV, fig. 25.

VVLNERA.

V V L N E R A.

§. 335.

Inter genera in quibus noxa corpori est, sunt et vulnera. Haec vero sunt, ubi partes solidas duras aliquid ita laesit, ut ex vasis exeat sanguis, alius succus.

§. 336.

Discrimen est inter vulnus et vlcus. Vulnus semper ad sanitatem tendit, in vlcere aliquid est, quod impedit curationem. In vlcere enim oscula sectorum vasorum ita immutata sunt, ut ex iis non bonus et nouae carnis incrementum idoneus succus effluat possit, sed tenuior, crassior, vel corrupta facies aliusque humor. Quapropter omne vulnus facile in vlcus degenerat. Et vlcus sanari nequit, nisi prius ita mutatum fuerit, ut naturam vulneris habeat.

* Verustissimis Autoribus, HOMERO Iliad. L. XI. v. 81. HIPPOCRATI, τὸ ἔλκος quamuis continui solutionem significat, et sic et vulnus, et vlcus. Recentiores distinguunt inter τὸ τραῦμα et τὸ ἔλκος.

§. 337.

Omnes corporis partes, si ossa excipias et cartilagineas, vulnera accipiunt.

† Nisi difficilis esse in verbis velis, et ossa et cartilagineas necesse affici posse non negabis.

§. 338.

Haec inferunt omnia dura, quae vel in corpore aguntur, vel corpori moto resistunt.

Vulnus tamen etiam imprimere potest res non ita dura, solum tensum. Etiam vulnera fiunt a grauiori nixu, tum in corpore rumpuntur membranae, vel vasa, vel etiam si membra ita adducuntur, ut rumpantur vasa.

§. 339.

Quia ad plurimas corporis partes arteriae perti-
 , sanguinem per eas diuidentes , vix non omne
 us cruentum est.

Ille tamen vulnus sine sanguine potest, v. g. si secta est cor-
 nea, si solus neruus, vel tendo, praecisus fuit. Minus
 cruenta sunt in infantibus.

§. 340.

Si vulnus non recens cruentumque est, sed iam
 alentem, habet naturam vel abscessus aperti, vel
 ris.

§. 341.

Et genere et curatione inter se differunt vulnera.
 d enim est, quod tantum discissum et a telo
 o pungente secanteque fuit illatum, aliud vero,
 l etiam collisum et a telo, vel corpore quodam
 so, graui, vehementius moto, vel multum reni-
 e, fuit impressum. Alia, quae quidem secando
 erant, ast simul partes lacerant, v. g. vitrum, ensis
 sus, vulnera faciunt, quae a collisis parum disse-
 , et eandem curationem requirunt.

§. 342.

Etiam alia magnaque discrimina recipiunt vulnera.
 uid enim est in natura partis, quae vulnerata fuit.
 d igitur vulnus est in musculo, aliud in glandula,
 l in neruo, aut tendine atque aponeurosi, aliud
 nucro ad grandes intusque conditas arterias, venas
 osque desedit. Nec parum confert locus. Nam
 n animaduersionem desiderat vulnus, quod in
 te est, aliam, quod in pectore, abdomine, artu-
 articulis. Quin etiam modo inter se discrepant.
 nus enim est vel magnum, vel tenue, vel in summa
 e, vel altum, et quod penitius et ad interiora pe-
 netra

netrauit. Aliquando illud, lineae modo, rectum quandoque curuum, obliquum et rotundum. Nonnunquam aliquid ex vulnere excisum, deinde detritumque est, vel ex eo caro aliqua parte ab eo dependet. Saepe etiam vulneri aliquid infixum est.

§. 343.

Vulnera etiam inter se distant, tum propter distantiam ac corpora, quibus illa fiunt, tum propter ipsam generationem et maiorem ac minorem impetum. Enim omittam, quae de discissis et collisis retuli, (alia sunt, quae caesim, alia, quae punctim illata, alia, quae imprimuntur a globis plumbeis, balistae puluere pyrio fufis, alia venenata, et quae ab animalibus venenatis ac rabidis morfu fiunt.

§. 344.

Vulnus etiam aliud est, si illud recens est ac recens, aliud, cui iam vetustas, vel mala curatio cessit, et quod his alienatum fuit.

§. 345.

Sunt etiam plura periculosa, quae vulneribus peruenire consueverunt, et quibus illa etiam multum inter se differunt. Sanguinis profusio, tumor, erysipelas, phlegmone, gangraena, oedema, emphysema, febris, dolor, nervorum distentio, imbecillitas, syncope, vomitus, deiectio. Nec raro alia noxa accedit, quae cum vulnere vel fractum, vel e sede sua motum.

§. 346.

Notae vero vulneris simplicis discissi, et quod aliā partem, quam cutim, adipem carnemque laesit, hae sunt: Post illatam plagam ab initio nihil alienum conspicitur: Mox orae vulneris inter se parum recedunt, quia fibrae illa insita vitali et elastica vi.

ducuntur, et quia sanguis ex fectis vasis erumpit. rae igitur inter se diducuntur. Emicat quasi linea bella, quae latefcit, et tandem ex vulnere patente que hiantē difunctisque oris sanguis effertur. Sanguis, fi per aliquod tempus, pro modo vulneris, fluxit, fonte conquiefcit, quia arteriae praecifae in fe quafi reuēnt, et quia ipfe sanguis aere cogitur. Vtrumque cit, vt pedetentim arteriarum venarumque oscula recludantur. Ob id etiam sub finem non crassior benfque sanguis, sed humor magis tenuis, dilutus, balbidus, exit.

§. 347.

Altero, vel tertio die, pro modo vulneris, citius diusque, superuenire solet inflammatio. Accedit oricula, quae a leui horrore incipit, post quem calor erumpit. Orae vulneris intumescunt, cum maiori aritu, dolore ac calore. Vbi se remittit et inflammatio, et febris, orae vulneris madescere incipiunt, se ostendit suppuratio. Soluta et inflammatione, febre, pus exit, et modo, et magnitudini vulneris nueniens.

§. 348.

At enim in illo humore, qui ex vulnere effertur, qui puris nomine venit, maxima differentia est. o initio, et quamdiu oscula dissectorum vasorum huc per inflammationem contractiora sunt, illud ue est, et non multum a sanie recedit. Sanies mala am ex vulnere prouenit, si quaedam in eo sunt, ae humores exitu prohibent, vel, quae illud irrit, nec non, si ei adstrictior fascia iniecta fuit. Vbi em ora vasculorum his liberata sicque aperta sunt, ertur pus. Illud bonum est, si crassum, albidum, ue, aequale et modo vulneris conueniens, nihil t. Sanefcente tandem vulnere, illud iterum tenuet minus copiosum est.

§. 349.

§. 349.

Ex his autem discitur, et inflammationem, ebreum, ad omne vulnus necessariam esse, quibus cretus humor, qui glutinari vulnus prohibet, invertitur (38.49). Certus tamen modus vtriusque debet.

† Vulnus recens instrumento acuto et puro factum, non penetrans, in quo nulla nobilior pars vulnerata, neque quam alieni est, ad sanationem sine inflammatione et purgatione perducere potest, id quod PLATNERVS non irruit, vid. infra §. 375.

§. 350.

Quia vero in colliso vulnere maior modus creti humoris est, et quia saepe in eo solidae partes haerent, quae penitus conuulsatae sunt ac emortuum vtrumque vero in pus verti, et a viuis integrisque partibus separari debet, ideo etiam maior inflammatio maiorque suppuratio in tali vulnere necessaria est.

§. 351.

Hoc puris genus per inflammationem fit ex quod scitibus, corruptis, fluidis, emortuisque solidis. vero vulnus purgatum, vel, ubi illud prorsus receptum est, id exsudat humorem, quo, per totum corpus uiso, omnes partes aluntur, et qui ex sanguine atque lymphâ constare videtur. Et hunc succum etiam pus referre plerumque solent chirurgi, cuius tamen alius ortus aliaque natura est. Ex eo enim calida crescunt, quibus vulnus impletur.

§. 352.

Cicatrix quasi nouum est, quod oritur, si epidermis cum tunica adiposa concreuit. Obseruatum enim compertum est, cutim, si qua parte sublata non haud renasci. Ex his intelligitur, cur cicatrix null

paucum, sensum habeat, et cur per eam nulla fiat
piratio.

Non modo cutis, qualis antea erat, vulnere sublata, non
renascitur, sed idem quoque de quavis alia parte solida
corporis animalis recte dicitur. Quo tamen nolim cum
nonnullis recentiorum chirurgorum (vid. *Memoires de
l'Academie Royale de chirurgie de Paris*) generationem no-
vae, quam vocant, substantiae in locum deperditae negare.
Ista enim opinio recens testimonio sensuum externorum re-
fragatur. Quis enim est, qui vngues in manibus pedibus-
que renasci, et insignes aliquando massas calli ossei in locum
ossum, vel carie destructorum, gigni ignoret. Estne aliquis
chirurgorum tam negligens et caecutiens observator, quin
in ipsis curationibus vulnorum et ulcerum carnes novas
propullulare videat? Errorem autem istum boni illi viri
errarunt, quod, suppuratione vulnorum inflammatione cor-
reptorum bene et feliciter succedente et vascula in ambitu
vulneris exhausta et adipem solvente, oras eorum sub-
sistere, animadvertunt: Plura de lite hac non addimus.
Alia experimentis in animantibus brutis corroborata videas
in *Dissertatione de consolidatione vulnorum cum deperditione
substantiae*. Auctore GERARDO EYTING. *Argentorati* A.
1770. edita. Nova autem substantia ea fiatne elongatione
et protensione vasculorum et fibrarum, an vero ex lymphâ
adducta fecernantur apponanturque particulae novae
nutrientes, quaestio difficilis est, a nobis hoc loco vix
discutienda.

§. 353.

Sunt praeterea alia quaedam, quae ad vulnorum
curam pertinent. Si ex vulnere sanguis, praecipue
arterialis, maiori impetu, et ita erumpit, ut is quasi per
vulnorem expressus alternis vicibus emicet, arteriam
vulneratam esse intelligitur. Nam ex venâ
arteria maiori is aequali motu profluit †. Minor arte-
ria si tota praecisa est, in se quasi coit et a carnibus
compressitur, ex maiori autem, nisi auxilium prae-
stetur, magna cum festinatione adhibeatur, una cum
sanguine effluit. Quos vero sanguinis pro-
fluxus ex maiori arteria interimit, illi ante mor-
tem animo linquuntur, superueniente nervorum
paralyti, extinguuntur. Si autem maior arteria
vulnerata est, v. g. brachialis, vel cruralis, vulnerata est,
M
aeger

aeger in tuto non est, quamvis sanguis supp-
potuerit. Membrum enim gangraena periclitatu-
in illud per eam solam arteriam, quae vulnerata
sanguis diffundi debet, quare, si locus opportunus
membrum praecidi oportet (181. 182. 229 *).

† Si sub vena vulnerata est arteria paulo maior et vehem-
tiur micans, sanguis etiam subsultim egreditur.

§. 354.

Alia vero ratio est, si arteria non tota praecisa
aliqua parte incisa est. Si ea exigua parte fissam
atque ex plaga sanguis exit, oritur aneurysma spur-
Si plaga autem maior est, sanguis cum maiori pe-
lo fluit, qui non facile supprimitur, nisi arteria
dissecta in se ipsam coire potuerit. Melius est
quae tota praecisa est, comprimitur.

§. 355.

Si maior nervus praecisus fuit, in membro totu-
et sentiendi, et mouendi, potestas, illudque, vel
gangraena, vel atrophia, periclitatur, vel ad minimu-
eo magna manet debilitas (186). Nervus vero
ex toto abscissus non est, sed tamen vulneratus,
si eum scelpellus attigit, vulnere vehementior d.
inflammatio, gangraena, nervorum per totum
pus distentio superuenire solent. Idem fere ac-
si tendo, aponeurosis, membrana et alia pars,
nervosa, vulnerata est, praecipue, si in ultimis
non late patet, sed exigua est.

§. 356.

Vbi glandulae vulnera accipiunt, oriri solet
inflammatio atque dolor, cum etiam ad glan-
plures nervi pertineant. Vulnus assidue hu-
madescit, qui illud fordidum reddit et in-
vertit.

§. 357.

Articulis vulneratis non solum maior inflammatio
cilere solet, sed etiam aliquid, quod iis proprium
cernitur. Effluit enim subinde copiosus humor,
uixit crassior, glutinosior, subalbidus, quem CEL-
* *μελικησαν*, PARACELSVS ** barbaro nomine
nouiam vocauit.

CELSVS Lib. V. Cap. 26. §. 20. Legunt alii *μελικησαν*.
Aliud enim est *μελικηρις*, quod vocabulum significat tumo-
rem, cui liquidior humor, melli fere similis, tunica sua in-
clusus subest. Vide CELSV M L VII. c. 6. Est vero etiam
μελικηρις CELSO L. V. cap. 28. §. 13. vlceris quoddam
genus, quod ita dictum fuit a faui similitudine, et quod
etiam inter capitis morbos describitur et *ἀπὸ τῆς κυρίως* di-
stinguitur ab AETIO Lib. VI. Cap. 60. p. 116. Edit. Grae-
cae. Sic enim legitur in omnibus verustissimis Editionibus
CELSI. LINDENIVS vero textum mutasse videtur, qui legit
κυρίως.

* In Chirurgia minori L. I. c. VI.

De ichore et meliceria CELSI Auctor fere classicus est
FABRICIVS HILDANVS in Tractatu singulari de humoribus
illis, qui in operibus eius exstat.

§. 358.

Pleraque ex vulneribus oculis subiecta sunt, quo
illa melius pateant, protinus cutis, si illa pilis
tegitur, radenda, cruor vero detergendus est. Post
in plagam demitti digitus potest, vel specillum,
sic explorari, quo usque descendat, et quid, vel di-
o, vel specillo, occurrat. Hoc vero fieri nequit,
mediu sanguinis profusio timetur. Necesse etiam
haec temperata manu fieri, ne sanguis iterum
datur, vel dolor atque inflammatio moueantur.

§. 359.

Vbi vulnus altius penetrauit, illudque explorari
et, corporis quaedam inclinatio valde necessaria
Oportet enim aegrum non aliter collocari, vel

ad eum fere modum decumbere, ac is fuit collocatus eo tempore, quo plagam accepit.

§. 360.

Num autem vulnus intra carnes desierit, num interiora ipsaque viscera peruenerit, et quid in laesum sit, is scire potissimum potest, qui, incisis corporibus, internarum partium positum, magnitudinem, atque ordinem perspecta habet. His cognita alia quaedam, si fieri potest, noscenda sunt: quomodo eo temporis momento, quo homo percussus, vterque collocatus fuit, et is, qui vulnus accepit, alter, qui illud impressit; qualis fuit gladius, vel quantum telum, aut aliud, quo homo percussus est, quantum et qua ratione illud adactum, immissum, vel iectum, fuit. Quae omnia ad vulneris naturam noscendam plurimum faciunt.

§. 361.

Quia etiam, si viscera internaеque partes percussae fuerunt, earum functio laeditur, ex his etiam symptomatibus, dolore, stupore, paralyfi, vomitu, singultu, conuulsione, scire licet, quid intus vulneratum. Idem etiam significat humor, qui per vulnus effertur.

§. 362.

Quid vero de vulneribus metuendum sperandumque sit, et, num vulnus mortiferum, num insanabile, num difficiliorem, num promptiorem, curatio habeat, ante omnia scire medicum decet. Notae ex tribus rebus potissimum petuntur, ex natura vulneris, ex natura percussae partis, et num haec ad vitam prorsus necessaria sit, et ex ipsa curatione, num in vulnere locum inuenire queat. Curationem enim non admittunt laesiones, quae dignosci nequeant.

enim fere absolvitur illa Medicinae forensis pars,
de vulneribus lethalibus pronunciat.

In medicina forenſi vulnerum titulo plures aliae laeſiones, caluariae oſſiumque fracturae comprehenduntur.

f. 362.

Vulnus igitur lethale dicitur, quo corpus actioni-
bus, quibus vita continetur, priuatur. Si itaque per-
itum fuit cor, auriculae, maiores arteriae, vel venae,
eorum vulnera exhauriri hominem profusione san-
guinis possunt, si trachea penitus abscissa est, vel
diaphragmatis interior et tendinea pars vulnerata, si
cerebri ac cerebelli vulnera altiora sunt et ad medul-
lam usque penetrauerunt, vel, si medulla, quae in
caua est, disrupta fuit, si maiores, et ad vitales motus
sustentandos necessarii, nervi, a primo ortu praecisi
sunt, mors matura sequitur.

§. 363.

Potest etiam vulnus esse mortiferum, quod natura minime magnum videtur, si illud interius et ali-
fede est, quae curationem recipere non potest *.
aque intus aliquae arteriae, etiam non ita magnae,
ae sunt, quae sanguinem fundunt, vel, si non ita
ltus sanguis ex aliqua rupta vena in capite, vel alia
e, effluxit, isque nulla arte euocari potest, vulnus
tem adfert.

Propter αδυναμίαν curandi.

§. 364.

In praecipiti quoque sunt, quibus varia recepta-
 , ventriculus, intestina *, quae humorem conti-
 t, ita sauciata sunt, vt ex iis humor effluat, qui
 putrescit, et in aliis partibus gangraenam mouet,
 e auerti nulla arte potest,

Seruari potest homo, si ventriculus non in fundo, sed in
M 3 suprema

suprema parte, pertusus est, nec non, si intestinum plavnicam, eamque minorem, habet, et quae Chirurgi oparetur. Seruati etiam nonnunquam fuere, quibus te intestinum praecisum fuit. De his infra.

§. 365.

Inter haec vero vulnera, quae lethalia dicuntur aliquod discrimen est. Sunt enim quaedam, quae hominem certissime et sine vlla exceptione ad mortem mittunt, et quae in medicina forensi absolute lethalia dicuntur. Alia vero per se lethalia vocantur, per quae etiam pereunt homines, non omnino quidem, maximam partem, ita, ut forte centesimus semel aliquando potuerit. Haec vulnera, si sententia feda est, prioribus paria habentur.

† De diuersa hac vulnerum aliarumque laesionum lethalia de qua non omnes idem sentiunt, disputare longum est. Evoluantur scriptores de medicina legali seu forensi scilicetque IOH. ERNEST. HEBENSTREIT *Antibrope Forensis* aut CHRISTIAN GOTTLIEB. LVDWIGII *Institutio medicinae forensis*. Ille liber plenior, hic contractior, nime tamen malus.

§. 366.

Vulnera vero, quae natura sua non ita mala sunt, quas vero aliis causis adeo in peius vertuntur, ut mortem inferant, dicuntur lethalia ex accidentibus. Mortem enim incidere potest, si aduersus vulnus, caeteroquin non lethiferum, nulla, vel inualida, nimisque sera, prorsus aliena auxilia adhibita fuere. Si etiam aeger non obsequens fuit, et se haud continuit, rexit appetitiones animique commotiones, ne vitauit fatigationem, crudelitatem, frigus, calorem, ebrietatem. Si corpus alio morbo iam infirmatur, illud aliquando leuiori noxa opprimitur.

§. 367.

Temporis ratio etiam hic habenda est. Si enim mox post acceptam plagam homo moritur, locus si

oni datur, ea vitam ablatam et vulnus lethale fuisse, cuius vero, si aeger post vulnus adhuc diu superstes est. Nihil tamen in his perpetuum esse deprehenditur. Nonnunquam enim alia res, v. g. vehementior iniuriæ perturbatio, hominem ad exitium præcipitare solet, qui caeteroquin feruari potuisset. Nec minus quando vulnera fiunt, quæ ex natura sua etiam post satis longum temporis intervallum lethifera fiunt*.

* Vid. Abr. VATERI Dissert. de vulnere cerebri sclopetario septima demum hebdomade absolute lethali. Witteberg. Cl. 10 CCXXII.

† A vulnere pectoris et pulmonum relicta phthisis ocyus scelerius hominem necare solet. Idemque ab aliorum internarum partium vulnationibus easque consequentibus exulcerationibus haud raro fit. Idem tabis metus est ab largioribus, amplioribus et diuturnioribus suppurationibus partium externarum.

§. 368.

Homo etiam, si ei plures plagæ, quæ singulæ variari facile potuissent, inflictæ sunt, earum numero conficitur et e medio tollitur.

§. 369.

Vbi autem medicus atque chirurgus post incisum mortui corpus de vulnere ad iudicem referre debent, ut ad plura animum aduertant, necesse est. Ante reliqua nominandus iudex, vel quisquis fuit, qui hoc officium iis delegavit. Significandum est occisum a quo aetateque, et qualem vitam is vixit, quo loco, quo tempore, quo telo, et a quo aduersario, is fuit, et quæ post acceptam plagam ei acciderunt, et quæ alia in eo observata fuerunt, quæ adhibita ab eo moderatio atque abstinentia, quæ autem a medicis curatio. Haec enim omnia, quantum de his comperire potest, prius notare debet. Totum

etiam corporis habitum describere oportet et indicium vulnerum numerum, magnitudinem, altitudinem, quatenam tum externae, tum internae, sedes laesae fuerunt. Inspicienda etiam sanguinis receptacula sunt, cor et arteriae venaeque maiores, id quod tum maxime necessarium, ubi suspicio est, sanguinis profusionem hominem interemisse. Nec omittendum si in aliis partibus, vel visceribus, aliud quid deprehensum fuit, vel morbidum, vel alienum. Superaddunt solent de vulnere iudicium, quod vero aliquando casibus arduis ad Medicorum Collegia deferunt fecantes.

† A medicis et chirurgis non modo corporum aliqua quocunque violentia peremptorum diligentem et curiosam inspectionem, sectionem et fidem de his relationem iudices requirunt, verum etiam de ratione medendi praegravissae dubitationes mouentur. Ut igitur medentes in omnibus morbis arduis rationem medendi, quam adhibent, inuicatos usus memoriae mandare per litteras debent, ita seorsum et maxime idem faciendum iis est, si quis violenta manu alio vulneratus vel quomodocunque laesus fuit. In hoc enim neglecto, saepe iudicium de causa mortis vel reliquorum vitiorum corporis ferri sine metu erroris non poterit.

§. 370.

Ad omnia vero vulnera haec pertinent. Sempiternius est vulnus, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est. Omne, quod in parte nervosa est, plura et maiora pericula habet. Neque signa bona sunt, si grauior febris, acerbior dolor, singultus, nervorum distentio accedunt, si mens turbata, membrum aliquod resolutum est, si crebriores vomitus et deiectiones aegrum conquiescere non patiuntur, si sudores habet frigidos, aut non per totum corpus aequales. Multum etiam confert aer, corporis habitus, aetas, vitae propositum et anni tempus (6). Quatenam pericula in singulis vulnerum generibus esse soleant, infra docebo.

† Malum etiam est, si tumor frigidus multus accedit, neque necessarius gradus febris cietur. Hoc saepe fit in cachecticis et frigidis hominibus, itemque post nimias profusiones aut sanguinis aut seroforum humorum, aut a nimia curatione antiphlogistica dicta.

§. 371.

Vulnus, si nihil ei praeterea mali accessit, solius naturae ope glutinatur. In omni curatione vulnerum chirurgus haud quidquam confert, nisi, quod is eae curacioni obesse possent, tollat.

§. 372.

Vulnus sanescere non potest, nisi illud fuerit purum. Quare eiici ante omnia debent aliena, quae vulneri illata, vel ex eo ipso orta, intus haerent: tela, gladii, sagittae, horumque fragmenta, centumli ex dilaceratis vestibus, cruor, partes collisae atque mortuae. Haec vero protinus eximenda sunt, nisi quid sit, quod hoc impediat. Impedire vero potest sanguis periculosius fluens, vehementior dolor, marisque inflammatio, magna aegri imbecillitas, si haec adfunt, vel si magnus eorum timor est. Saepe nam id, quod intus insedit, et quod sic altius deersit, commode apprehendi atque extrahi nequit, quod finita inflammatione ortaue suppuratione ex exato vulnere sponte excidit, vel haud difficulter extititur. Nonnunquam tamen fieri solet, ut ea, quae vulneri inhaerent, inflammationem, sanguinis profusionem, dolorem et alia grauiora symptomata moueat, quae ideo, omnibus festinantius actis, etiam cum quo periculo extrahi debent.

§. 373.

Omne autem telum, vel aliud, quod, corpori intus haeret, eiicitur, vel digitis, vel variis instrumentis. Ad glandes plumbeas euellendas pro-

stant varia ferramentorum genera. Si glans offensa haerescit et forcipe extrahi non potest, illa tere foratur et excutitur. Nonnunquam amplianda plaga et vulnere vulnus adiiciendum est. Si telum ab una parte, qua venit, reuelli tuto nequit, et, si plus per quod telo reuertendum, quam, quod perrumpendum est, commodius est aperire quod super est, et hincque contra mucronem incidere et ea parte telum trahere, quod sic et propius petitur, et tutius euectur. Semper illud videndum est, ne quis neruus, arteria venaque, vel a telo laedatur, dum id extrahitur, vel scalpello incidatur, dum vulnus ampliatur. Etiam vulneratus inclinandus, et ita collocandus, ac fuit eo tempore, quo plagam accepit.

- † Vulnere punctum illatum et paulo altius penetrantia plaga, quae primis diebus recte inciduntur versus plagas duas, fit, ut et vulnus angustum et rotundum in oblongum convertatur, neque facile humores in imo vulnere colligantur, quiete et corporis calore putredini facile obnoxii.

§. 374.

Si vero vulnus collisum, alienatum impurum est, illud purgandum, moto in eo pure, in quod concretus humor, et quicquid in ulcere impurum creationi obest, conuertitur. Purgatum fit cruentum, quod naturam recentis ac simplicis vulneris habet.

§. 375.

Vulnus, quod telo enseque acuto illatum tantum discissum est, et quod recens non alienatum nec nimis altum est, et cui nihil praeterea mali accedit, etiam nihil derafum detritumque est, licet sine omni medicamento curare. Concretus sanguis spongia calida expressa detergitur, et orae vulneris adducitur. Hoc autem fit emplastro, impositis etiam utique pannis, vel fascia veniente. Ita adduci atque c

ahi debent vulneris orae, vt illae sibi recta oppositae
nt, ne indecora cicatrix fiat. Multum ad id confert,
inclinatio positusque vulnerati membri, et quies,
nae omnibus vulneratis necessaria est. Nam orae sic
ductae omni cura tuendae et haud inter se diducen-
e sunt, quare etiam vulnus celerius glutinatur, si
scia vel prorsus non, vel rarissime, soluitur *.

* Vid. CAESAR MAGATVS de rara vulnorum medicatione et
BELLOSTE *Chirurgien d'Hopital*.

† Pars vulnerata ita collocanda est, vt ne muscoli oras vul-
neris ad se mutuo adductas distrahant. Itaque si metus is
ab flexoribus est, pars ea flecti debet, si ab extensoribus,
extendi, quantum sine molestia potest.

†† Modo, fascia *vniente*, modo *expulsiua* vtendum est. Illa
quidem in caesim illatis vulneribus, longitudinem corporis
sequentibus, haec vero, si punctim factum est vulnus neque
alte penetrat, sed sub cute in longum porrigitur et sub se
habet os ad quod apprimi possit cutis et cellulositas. Vtra-
que simul imponenda splenia poscit; vnies quidem, si vul-
nus paulo altius penetrauit, scilicet vt orae vulneris ad ima
vsque sese contingant; expulsiua vero, vt superior caui vul-
neris pars, et in fine eius potissimum, ad inferiorem accu-
ratus appressa sit. Spleniorum modum, crassitiem et lon-
gitudinem ex modo vulneris sagax chirurgus facile inuenit.
Fascia nec laxius nec arctius adduci debet.

§. 376.

Vulnus autem, quod hiat, et cuius orae in vnum
duci, nec fascia, nec emplastro glutinoso *, com-
ode possunt, sui debet. Suturam requirit vulnus
uens, cruentum, discissum, et quo muscoli transuer-
i secti sunt, vel curuum, et quod angulosae figurae
vel, quod alia parte dependet, alia inhaeret.
um non admittit vulnus, ex quo sanguis copiosior
ertur, collisum, purulentum, vel alia quapiam re,
lammatione, veneno, alienatum. Si vulnus tam
um est, vt nec acus in imam eius partem descen-
re, nec linum omnem carnem comprehendere
ssit, futura aliena est, quia subtus cauum relinquen-
m foret,

* Inter

* Inter compositiones, quae prostant, est Emplastrum a Cru-
quod valenti recentique linteo inducitur. Parari po-
glutinosum ex aliis emplastris, si illis terebinthina vel r-
na adiicitur.

† Emplastra illa in capitibus suis latiora, in medio mi-
lata sunt. Melius continent oras vulneris, si longi
sunt. Ad ignem antea admouenda, vt molliora fiant
tenacius adhaereant. Quo longius vulnus est, eo pluri-
opus est. In locis, vbi humor quidam affluit, non ad-
benda. Vix prosunt ad glutinationem sine suppuratione
praestandam, nisi in vulneribus non alte in cellulosa
penetrantibus. Loco plurium emplastrorum longiori-
adhiberi possunt duo vulneris longitudinem aequan-
quae in ora alterutra habent adsuta ligamina, quae
nodos connectuntur super vulnere, obseruatis iis, q-
§. 375 et 377. dicta sunt.

§. 377.

Vbi igitur vulnus suendum est, linum, quod,
ex humore nimis in se coeat, prius humectandum
coniicitur in acum incuruam, acutam, laeuigata
nulla rubigine exesam. Neesse est, vt acus pleni-
sit lino, quod illa trahit. Linum etiam, pro mo-
vulneris, satis valens esse debet, molle tamen et n-
nimis tortum, quo mitius corpori infideat, ast a-
quantum inceratum. Quod enim tenue est tortum
que, illud cutim abrumpit. Comprehendi vero fut-
ra oportebit non cutim solum, sed etiam carnem,
orae etiam imae adducantur. Non vero solum vuln-
futura includendum est, sed vtrinque etiam aliquid
cute, ne illa rumpatur. Acus enim, quae sic p-
vnam oram ab exteriori parte ad interioram vulne-
immissa fuit, etiam sic per alteram oram ab interio-
in exterioram partem traiecitur. Melius traiectat
acus, si prius orae vulneris impositis vtrinque ma-
bus adducantur, et loca, per quae illa demitti atq-
educi debet, atramento notantur. Quando linu-
traiectum est, illud adducitur, id quod tuto sit, si-
terea iterum orae vulneris vtrinque digitis comp-
munt

nuntur iungunturque. Linum in nodum connectitur, qui facile iterum solui potest, interposito minori anniculo, qui commode fit ex panno serico incerato.

† Fuere ex recentioribus chirurgis, qui futuras omnino improbarent, vid. *Mémoires de l'Académie de Chirurgie*; sed non ubique iis facile caremus. Ubique autem emplastra, splenia et fasciae commodusque positus partis affectae non sufficiunt, futura cruenta saltem experienda. Ea tamen, si nimium dolorem et ex hoc inflammationem mouet, non raro solui et tolli debet.

†† Suturae paulo subtiliori et curiosiori arte fieri debent. Tot paria acuum ad manus sint, quot suturae faciendae. Binae acus linum vnum coniectum, habeant. Ita fieri potest, ut linorum acuum quaeque ab interioribus vulneris ad exteriora traiciatur. Filum, quod in acis coniectum est, ne longius sit, quam res poscit. Filum sit saltem duplex, h. e. ex duobus pluribusque ad se mutuo apposis in planum quoddam, cera, alba quidem, antea inceratis, compositum. Acus omnino curuae sint, h. e. nulla earum pars lineam rectam referat; sint utrinque ad tertiam usque partem acie instructae ab apice sensim latiores ut facile transeant, in capite utrinque sinum habeant, qui filum recipere possit, ut id facile transeat per factum ab acu foramen. Duplex filum nec capite acus crassius sit. Alioquin partes, dum sinitur, lacerantur vexanturque.

§. 378.

Si vulnus magnum est, illud iterum, imo tertio quarto, suendum est. Acus vero semper ea parte primo traicitur, qua vulnus plurimum hiat, et, si illud ter suendum est, in medio. Si vero vulnus figuram angulosam habet, apprehendi prius et sui angulus debet. Vulneri obliquo obliqua etiam futura iniicienda est. Sutura non nimis rara esse debet, quippe quae non continet, nec nimis crebra, quia, quo saepius transiit iniectum vinculum, eo magis illud moritur, et dolorem atque inflammationem mouet. Si vulnus oblique et ita incisum est, ut altera ora plurimum cutis habeat, et quasi dependeat, in altera vero a carnes nudae sint, illud haud commode fieri potest. Impedit quandoque, futura totam plagam, si illa non latior

latior est, lino, etiam infra vulnus traiecto, comprehendere, fila adducere et post cutim oblique inclinamenti comprimere, fila vero super linamentum nodumnectere.

† Quodsi vulnus tam longum est, vt plures quam tres orae necessariae sint, raro res bene procedit; tot enim muscula cutis multum dolorem, et ex eo inflammatio concitant. Sutura haecenus proposita vocatur *Nodoſa, terſiſſa*, a Gallo-Francis *Entrecoupée*, a Germanis *Knopfnath*.

§. 379.

Nonnulli ferramento vtuntur, quo mediante, et immittunt traiciuntque (*Porte-eguille*). PETITUS id annuli quoddam genus inuenit *. Nec fere aſi illae bonae sunt, haec ferramenta desiderant, facile sequuntur.

* Vid. GARENGEOT *des Instruments*, T. I. Cap. VI. Art. p. 208.

§. 380.

Si vulnus latius est, quam, vt eius orae futura coniungi queant, et metus est, ne futura cutem abrupat, illa iuari potest emplastro glutinoso, quod super vulnus, etiam futum, imponi potest. Emplastra etiam modi etiam vulneris oris accommodare solent, et per illa linum traicere huiusque capita in nodumnectere.

§. 381.

Nulla fere medicamenta desiderat vulnus, quod tantum discissum est et recens, et cuius orae sic subito iunctae sunt. Nulla certe in ipsum vulnus ingerenda sunt, sed supra illud imponenda linamenta sicca. Vulnus post obligatur fascia, non vero a tertium diem, nisi aliud quid hoc desideret, solui. Quo tempore super illud dari potest medicamentum glutinans (383), quodque aeris noxam auertit. Nec tamen hoc in illud ingeri debet. Vbi cicatrix indu-

et, educi lina possunt, id quod etiam impositis vtriusque super oras glutinati vulneris digitis fieri necesse est.

† Lina statim atque glutinatio sufficiens orarum facta est, solui, educique debent; diutius enim relicta efficiunt in vulnusculis acu illatis largam et longam suppurationem. Posteaquam educta sunt lina, futura non cruenta, h. e. emplastris, spleniis, fascia positu partis, quiete summa curandum est, ne a se mutuo diducantur vulneris orae.

§. 382.

Quandoque tamen vulnus, quod aliquantum collum vel alienatum est, sui oportet. Maxime hoc fit, aliquid ab eo dependet, quod mediante fascia non is adduci et in sua sede contineri potest, et ubi mens est, ne nimis lata postea cicatrix sit. In hoc casu cura oras ita iungere debet, ut illae se ex toto haud contingant, utque sit, qua humor intus concretus manet. Hoc etiam vulnus purgari debet, quare per oras ingerenda sunt medicamenta ad id idonea (37).

§. 383.

Omne autem vulnus, quod tantum discussum est, non collisum, modo orae eius adductae sint, et contra ea custodiantur, vel per se sanescit, vel impositis medicamentis, quae aera auertunt. Illud enim generis et ad omnia, etiam collisa, vulnera pertinens erit, primo die optimum esse, si linamenta ea iis imponuntur. Ad vulnus vero curandum, quod collisum non est, plurimum confert, si fasciaissime soluitur et orae non diducuntur. Si vero subsequentibus diebus, ut aeris noxa auertatur, aliquid per tale vulnus imponendum est, superdari, non pro inter ipsas oras demitti, possunt puluilli ex spiritali ardente expressi, vel linamenta in balsamo quodam, Mecha, Peruviano, de Tolu, tincta. Commodum est

est, si haec vltima primum vulneri imponuntur et perdantur alia linamenta, ex aqua vulneraria expressa. Super haec tandem iniici ceratum, vel emplastrum potest, quod ea contineat, quo, ut et fascia, aeratissimum auertitur. Plerumque chirurgi emplastrum sic dictum, sticticum his vulneribus superimponunt.

† Emplastra saepe a recentioribus chirurgis omittuntur, quae sic quidem male. Certe melius omittuntur in quorum cutis tenera et sensibilis admodum est, aut quorum humorum acrimonia et tenuitas, biliosa praecipue, est.

§. 384.

Vulnus vero collisum sanescere nequit, nisi prius fuerit purgatum. Hoc fit, si sanguis aliussive succus qui in eo concreuerat, et quo etiam secta atque perclusa vascula conferta sunt, nec non collisae et entumescit partes solidae, in pus vertuntur (350. 351). id idonea sunt medicamenta, quae pus mouent et erigunt. Ex compositionibus notissimum est unguentum digestium chirurgorum, quod habet terebinthina cum vitello oui subactam. Si vulnus in partem carnosa est, ei adiici potest mel, quod ad pus mouendum valentius, in partium vero nervosarum, glanularum, tendinum atque articulorum, vulneribus admodum est. His magis opportuna sunt succinum, elemastix, si digerentibus et terebinthinis miscetur. Ex compositionibus autem prae aliis balsamum Arc

† Vulneribus collisis, maxime iis, quae aut nullum, aut parum admodum cruorem fundunt, in prima deligata digestiua recte admouentur.

§. 385.

Ad pus mouendum maturandumque ac vulnus aperiendum non parum valent emplastra, si super iniiciuntur. Ex his prima sunt: malacticum, diacolum simplex et compositum.

§. 386.

Sunt aliae digestiuorum compositiones, vnguentum basilicum, maius et minus, quod vltimum etiam trapharmacon dicitur, vnguentum de apio.

§. 387.

Vbi vulnus non admodum collisum est, haud verotum discissum, illud sine aliqua suppuratione glutari nequit. Opus itaque est medicamentis, quae non reprimunt, sed pus aliquantum non nimium mouent. Ex his fere prima sunt: Balsamum Arcae, balsamum Lucatelli, balsamum Samaritanum, nec non id, quod Stahlius composuit, et quod habet essentiam myrrhae, et succini, quibus parum olei terebinthinae adiicitur. Ex praestantioribus est aqua vulneraria (292). Locis nervosis myrrha aliena est, quare s minimum adiici debet.

Haec sic dictae essentiae haud parari debent mediante alcohol, quod salem tartari habet, quo vulnera grauiter offienduntur. Melius etiam est, si ex iam parata essentia alcohol maiorem partem iterum diffatur. Haec essentia, balsamica dicta, commode aliis digerentibus admiscetur. Inter *εὐπόριστα* est caseus albus recens sine sale. Vid. LANCISIUS de Corde pag. 99.

§. 388.

De his medicamentis vero generatim illud scire oportet, olea, et quae pingua sunt, pus euocare atque maturare posse, si vero sola adhibentur, maxime, nocida fiunt, oriri ex iis putredinem, et vulnera imunda atque sordida fieri. Haec causa est, cur terebinthina, et alia ex vegetabilibus, quibus acidus succus est, adiiciuntur. Spiritus ardens, et quidquid ex hoc confectum est, vulnus adstringit, cohibet putredinem et suppurationem. Quare in vulnere colliso, quod non purgatum est, is alienus est et nouam inflammationem, imo grauiora symptomata, mouet. Vbi vero

N

vul-

vulnus, quod purgatum est, celerius sanescere dicitur. Alcohol satis idoneum est, quod illud aridum repleat. Terebinthina, nec non balsama illa exotica, de Mechu Peruvianum etc. aera auertunt, et, si digerentur, adiaciuntur, et vulnere purgato superdantur, blande fibras stimulant et succum eliciunt, quare carnes alunt et vulnera atque vlcera, vbi aliquid excisum implent. Vbi vero vulnus purum non est, illa solum superuacua sunt, sed aliena, quippe quae faciunt vt putris caro supercrescat, et vt ex vulnere magis vlcus fiat.

§. 389.

Omnia medicamenta, quae vulneribus imponuntur, igne prius concalefacere oportet. Aer, qui tum fieri potest, auertendus, quare semper, vbi vulnera obligantur, festinandum est. Iuuat non parum ignitabulum, quod carbonibus candentibus plene in promptu esse debet. Igne enim et aeris noxa auertitur, et medicamenta, quibus vulnus curandum calefiunt. Si vulnus valde alienatum, et in eo pus est, quam vt digerentibus illud tolli possit, opus est vehementioribus, quae exedunt.

§. 390.

Ad felicem promptamque curationem nihil magis facit, quam diligentior observatio inflammationis, quam in omni vulnere necessariam esse supra reuertimur (38. 347. 349). Huic itaque et diuersis eius temporibus accommodari debet et victus, et omne medicamentum, tum, quod intus sumitur, tum, quod extrinsecus admouetur. Sedulo enim cauendum, ne inflammatio in gangraenam tendat. Haec timere potest in vulnere colliso, et quod loca neruosa grauius ter offendit, si, pro modo vulneris, sanguis parum fluxit, si suppuratio fuit cohibita, et si, ex aegritudine

temperantia, febris calorque augentur. Non minus
 pro etiam nocet, si omnis inflammatio, quae ad pus
 mouendum necessaria est, tollitur. Itaque omnia,
 quae superius de variis generibus inflammationis eius-
 dem curatione praecepi (28. ad 83, 100. 101. 156. ad
 65), adhibenda sunt. Magnum auxilium aduersus
 in sanguinis fluxu est, de quo mox dicendum.
 Repe etiam, si locus neruofus et aponeurosis minori
 ulnere perforantur, oportet illud ampliare, sine quo
 haud remittit inflammatio (44. 83).

§. 391.

Subinde etiam accidit, ut pus, quod ex vulnere
 ferendum erat, reprimatur, et venis resorptum re-
 uis corporis succis admisceatur, quae res etiam gra-
 , et quandoque mortiferi morbi pericula adfert.
 omnia, quae vulnus offendunt, et quae, si id ad sup-
 rationem spectat, pus exitu prohibent, hominem
 modi iniuriis obnoxium reddere possunt. Hoc
 quandoque incidere solet, si vulnus densioribus
 uibusque pannis, turundis et adstrictiori fasciis ni-
 um premitur: Si alcohol et alii valentiores arden-
 que liquores, nec non alia acriora, reprimant et
 stringentia superdantur: Si medicamenta, haud
 ius concalescentia, sed gelida, imponuntur, et vulnus
 um frigore adstringitur, vel aeri, qui in omnibus
 nimiam nocendi potestatem habet, crebrius ac
 tius obicitur: Si vulnus non purgatur, nec pus
 ergitur, quod relictum acre rodensque fit: Si eo
 opore, quo vulnus ad suppurationem spectat, al-
 valentioribus ducitur, si eodem tempore, datis
 dis, vel aliis, febris concitatur, vel, si euacuant-
 , nimium temperantibus et frigidis omnis febris
 itur. Nimiam vero nocentemque febrem mouere
 um potest cibi, praecipue valentioris, abundantia,
 N 2 vini

vinī ac libidinis intemperantia, grauior animi perturbatio. Omnia praeterea, quae affectum viribus infirmum corpus magis eneruant, ad haec plurimum conferre et aegrum saepe praecipitare possunt.

§. 392.

Sunt vero quaedam indicia, ex quibus colligitur, pus fuisse resorptum, Si vulnus, superato inflammationis ac febris periculo, iterum intumescit corpore etiam praeter consuetudinem incalescit nouaque febre superueniente: Vel si vulnus ardeat, et prorsus non intumescit, ac quasi emortuū videtur. Vbi autem vulnus humorem exsudat, paucus est et tenuis, si in vulnere malus color, isque liuidus, niger, vel pallidus, aut varius, si vagos horrores sentit, de cephalalgia nocturna quægilia conqueritur, vel, si febris iterum adeo invalescit, ut homo vanas imagines accipiat, atque verba desipiat. Nec non, si sine ratione alius loquatur, et saepius, quam ex consuetudine fertur, vero cruda, et eius crebra cupiditas est.

§. 393.

Haec vero duplicem exitum habent. Vel e si grauiora illa sunt, maturior et cita mors subsequitur, ita, ut aegrum aut syncope, aut valida febris, totum vel eum tabes inuadit, atque diutius et periculum male habet *.

* Vid. FAUDACQ *Reflexion sur les Playes*. Cap. VIII. pag.

§. 394.

Auerti vero haec maiora mala possunt, si diluculius obseruatur inflammatio (390), et si suppurgatio non impeditur. Quod si vero haec incidunt, vbi pus iam alienatum est, imponi protinus debent, pus citant, et super dari fomenta et emplastrum.

mollientibus, quibus humores ad vlcus réuocantur. rae quoque paululum concidendae sunt. Intus autem dari debent, quae vel aduersus inflammationem (62. ad 69), vel, si malum cum imbecillitate est, ia, quibus languidae vires reuocantur (70). In re- is causisque multum inter se differentibus perpe- um praeceptum esse non potest.

§. 395.

Vulnus autem, cum rubet, ac nimium neque sic- um est, neque humidum, et cum naturaliter sentit, urum est. Quod, si ex eo aliquid excisum, detritum rafumque fuit, implendum est. Ad id vero profi- unt medicamenta, quae carnem alunt; ex quibus ima sunt balsama et cum his myrrha, quam tamen eis carnosus prae aliis opportunam esse iam retuli (37). Haec digerentibus adiici debent. Etiam lnus raro deligandum, nec adeo frequenter perter- ndum est. Iam enim ex vulnere exit alterum genus moris, quo nouum incrementum adfertur (351).

Vulnus purum et laudabile pus fundens, nisi eius multum fuerit, semel tantum quotidie detegendum est, neque nimis sollicitè pertergendum, multoque minus rudi manu. Pars laesa linteis; pannisque non praegravantibus curiosius fo- vanda, calor enim corporis ipsius ad sanationem plurimum confert. Aer, quo vulneratus vitur, sit purus. Loca vulneri vicina ab sordibus quibusque sedulo repurgentur, vt exspiratio cutanea liberior sit, nihil vero alieni resor- beatur.

§. 396.

Vbi autem in quolibet vulnere ventum est ad in- cendam cicatricem, optime id faciunt linamenta ca, si imponuntur, et si vulnus paulo adstrictiori cia deuincitur, qua supercrescentes carnes aliquan- m reprimuntur. Alii imponunt emplastra: ficti- m Crollii, de lapide calaminari, de minio; vel ex iritu vini expressa linamenta pannosque; vel insper- gunt

gunt teneriores pulueres ex terebinthina cocta, mache, olibano.

† Linamenta expressa ex aqua calcis viuae vel ex aqua phaedonica quam dilutissima etiam siccant.

§. 397.

Decoris causa curandum est, vt cicatrix sanae aequetur. Illa deformis fit, si orae vulneris non re fuerunt adductae, si fascia frequentius fuit soluta. Concaua manet ex vulnere colliso, vel cui aliquid cissum fuit, et si hoc, et impurum vulnus, aut vlcus, et a rodentibus adurentibusque, nec non nimium siccum, et a frigidis et reprimentibus medicamentis fuit curatum. Multum etiam confert senilis aetas et siccior corporis habitus. Excrescit cicatrix in corpore raro, pleno humido ac iuuenili, et quod pleno victu alitur, praecipue si vulnere superdata fuere, quae illud nihil laxum reddunt, digerentia, balsamica, et si his omnibus laxior vinctura accessit.

† Longae et largae suppurationes vulnorum consumunt cellulositatem relinquunt cicatrices concauas et foedass.

§. 398.

Si deformis iam inducitur cicatrix, et si aequae formae causa, rursus et dolorem et medicinam suffragari re vult, res et excrescenti et concauae cicatrice succurri patitur. Eminens scalpello praecidi, vel medicamentis tolli potest, quae corpus exedunt, inter quos lapis infernalis primo loco est. Concauam exulceris scalpello oportet, superque eam dari implentia, quae carnem alunt, donec vulnus sanae cuti aequetur. Postmodum vero ei noua cicatrix inducenda est. Cicatricem concauam aequandam etiam proficiunt linamenta, ex aqua et oleo calidis (226).

§. 399.

Quae vero ad victus et medicamentorum ordinem rationem attinent, ea non alia sunt, quae

ie inflammationi opitulatur. Huic igitur soli, et
 ri, si illa accessit, omnia accommodari debent, et
 ul obseruari vulnerati aetas, corporis habitus, con-
 tudo victus, vitaeque propositum. Si vulnus ve-
 nens est, et, pro modo eius, parum sanguinis fluxit,
 tuenda est inflammatio, quare summe necessarium
 ut eius non parum detrahatur (62. 68). Nec ideo
 um sanguis, nisi periculosius erumpat, protinus
 primendus est. Alius, nisi id propter inflamma-
 nem necessarium videatur (63), nunquam ab initio
 ationis, vbi pus mouendum est, duci debet, at, si
 ricta est, lotionibus mollientibus, in eam immixtis,
 uri euacuarique. Vbi autem vlcus purgatum ad
 tricem perducendum est, confert eam paulo valen-
 ibus subtrahere.

§. 400.

Superuacua imo et noxia, sunt illa decocta, sic
 a traumatica, quae ex vegetabilibus multum adstrin-
 gentibus componuntur. Prudentem medicum con-
 rare oportebit corporis habitum, et dare medica-
 ta, quae cuius ad humida in corpore purganda
 fortuna sunt. Illa necessaria sunt, si cum vulnere
 d vitium in corpore est, cacochymia, scorbutus,
 ereus morbus.

§. 401.

In omni vulnere ab initio abstinentia summe ne-
 cessa est (67), post autem, si vulnus implendum,
 is paulo plenior conuenit, quem vero boni succi
 oportet.

§. 402.

Multam etiam animaduersionem aer postulat, qui
 ia vulnera infestat. Magis nocet grauis, gelidus,
 is calidus et noxiis atque impuris halitibus foetus,
 is in maioribus nosocomiis esse solet. In totum,
 eri potest, abstinendum ab omnibus animi com-

motionibus. Circumcidendae etiam sunt omnes
rae et meditationes, quae requirunt, vt animus
tendatur. Corporis etiam, maxime partis vulneris
quies necessaria est. Venerem in grauioribus vu-
neribus nunquam tutam esse, sed saepe mortiferam
perientia docuit*. Sedulo commonendi sunt amici
vt obsequentes sint, cum ad felicem vulnerum
curationem harum rerum paulo subtilior obseruatio
valeat, quam peregrinorum, conquisitorum et
militum arte compositorum medicamentorum vsus.

* Vid. HOFFMANNI dissert. de Morbis ex nimia veneris
undis. Hal. MDCCXXV.

SANGVINIS PROFUSIO.

§. 403.

In vulneribus curandis, tum iis, quae chirurgus
incipit, tum aliis, quae ipse facit, saepe timor est
sanguinis profusio hominem interimat. Sanguis
vel ex minoribus arteriis atque venis exit, vel ex
maioribus cum periculo ruit. Vbi primum incidi-
tur, quod ex minori eius impetu intelligitur, et si ar-
teriis non ita propinqua est, expedit illum non pro-
prie suppressum, sed sinere fluere, quo minor in-
flammatiatio oriatur (234).

† Sanguinis fluxus e parte vulnerata non modo vniuersi
corporis massam sanguineam minuit, verum etiam partem
etiam sanguine spissiori liberat, quo fit, vt non tam per-
iculosa obstructio inflammatoria existat deinceps. Fluxus
sanguinis largus et abstinentia seuerior, a fame propior, saepe
vt illi, qui post aciem in campo pro depositis habiti-
bus demum in nosocomia adducuntur, meliori sorte fru-
antur quam alii mature curati.

§. 404.

Si vero is non per se desistit, et metus est, ne
interessant, suppressi debet. Hoc fit, vel compri-
mendo

ntum vulnere, vel impositis etiam varii generis me-
amentis, vel deuinctis arteriis.

§. 405.

In vulneribus, quae penitus penetrauerunt, et
ae oculis non subiecta sunt, aeger non semper in
to est, quamuis sanguis conquietari videatur.
oservatum enim est, et cordis et maiorum arteria-
m vulnera quandoque praeccludi, quia iis concretus
nguis insidet. Hic postmodum impetu ruentis san-
guinis, et si aeger vel corpus, vel vulneratum mem-
um, mouet, vincitur, et e sede pellitur, ita, vt. ite-
m sanguinis profluuium oriatur, quod hominem
pente et inopinato exhaurire potest. Quare iis,
abus viscera et interiores partes, vel etiam in artu-
s arteriae minores, non procul a trunco, ex quo
ucuntur, percussae sunt, nunquam primis diebus
haemorrhagia securitas est. Et propter hunc me-
m oportet sanguinis impetum abstinentia atque
uete mitigare, et eum, si, pro modo vulneris, parum
ixit, incisa vena detrahare.

* Vid. le DRAN T. I. Obs. 49. 50. 51.

† Neque ita vulneratos ex syncope protinus excitare decet.
In singularum partium interiorum vulneribus singulares
animaduersiones necessariae sunt, de quibus suo loco cui-
que proprio dicendum.

§. 406.

Optime sistitur sanguis impositis linamentis ficcis
adhibita aequali compressione. Vulnus itaque iis
splendum, et super impositis, si res postulat, multi-
cibus, densis ac gradatis pannis atque paulo ad-
ictiori fascia vincendum est. Cauendum tamen, ne
vulnus nimis adstringatur comprimaturque, quippe
quod gangraenae opportunum reddi, vel multum inde
onari potest (17. 37).

§. 407.

Si autem sedes percussa nec satis commodè fascià deligari atque comprimi, nec arteria deuinciri potest, aut si iniecta fascia non satis continet, et sanguis hilominus sub ea fluit, vltimum auxilium est, vt arteria digitis, vel ipsa, si iam iniecta est, fascia manibus impositis a ministro comprimatur. Neceesse vultur est, vt, pro modo vulneris, arteria diutius, et saepe per plures horas, et semper aequaliter prematur.

† Opus tum est ministris duobus vices permutantibus.

§. 408.

Aliae vero obseruationes necessariae sunt. Melius praeccluduntur vasorum ora, si e latere premuntur, quam, si iis illud, quod comprimit, aduersum obiiicitur. Arteriae supra vulnus premendae sunt, venae autem infra illud, id quod vitalis humorum circuitus docet. Etiam in hac pressione modus sit, ne ea membrum alienetur. In artuum vulneribus non parum iuuat, si arteriae trunco obiiicitur fascia tortilis, vel torculum (237), vel splenium fascia adstringendum (245). Huius vero arteriam non ita premere oportet, vt membrum gangraena periclitetur, sed vt impetus saltem ruentis sanguinis mitigetur.

§. 409.

Ex medicamentorum, quae aduersus sanguinis profusionem profunt, magno numero pauca tuta sunt. Quaedam enim parum valent; alia vehementiora, locis neruosis admonentur, neruos grauiter afficiunt, atque inflammationem magnamque febrem mouent. Imo plura eorum vim veneni habent, quam in omne corpus diffundunt. Haec saepe causa est, cur vulnèratis ex non ita magna plaga superueniunt grauiora symptomata, vomitus, syncope, neruorum distentio, quae eos quandoque celerius absumunt.

Vid. LANCISIUS de Corde p. 98.

De his aliisque medicamentis et remediis ad sanguinis profluvia adhiberi solitis legi possunt Dissertationes duae sub Praesidio meo defensionae a viris doctissimis et experientissimis GEORG. GVILIELM. LIEBE et IOH. CHRISTIAN. HOFFMANN habitae; quarum altera inscripta est: *De Remediis haemorrhagiarum externarum*; altera, *de Remediis haemorrhagiarum internarum*.

§. 410.

Inter omnia genera medicamentorum fere optimum est alcohol vini, quo et ora vasorum constringuntur, et ipse humor cogitur. Illo etiam vulnus alienatur. Necessesse vero est, ut illud sine sale ratum sit. Ex eo exprimuntur linamenta, quibus nus impletur, et, ut retuli (406), comprimitur. In valet oleum terebinthinae. Mitius id efficit tida aqua, vel oui album.

§. 411.

Ora vasorum etiam praestringunt atque succos ex fluentes cogunt liquores, et, sic dicti, spiritus di, ex vitriolo, alumine potissimum, parati, qui ro rodunt, adurunt et crustam inducunt, quare um usum modo commemorata mala (409) sequuntur. Sunt plura compositionum genera a LEMERY*, EBERO**, et PURMANNO*** proposita.

Vid. Cours de Chimie p. 504.

* Vide eius Anchoram sauciatorum p. 124.

** Vid. eius Obs. chirurg. p. 263.

§. 412.

Linamentis etiam insperguntur, vel cum aliquo uido mixta illinuntur, pulueres, qui stiptici dicuntur. Ex vegetabilibus sunt omnia, quae adstringunt reprimunt. Parum valent rad. symphyti, ireos strat. bistortae, flores balaustiorum, malicorium, ina volatilis. Efficaciora sunt gummi arabicum, lophonium, tragacantha, sanguis draconis, terra iapo-

iaponica, gallae, opium vſtum: ex mineralibus vit-
lum, alumen, maxime, ſi haec igne vruntur, ca-
mortuum vitrioli, terrae, quae vitriolum hab-
bolus Armena, lap. haematites, crocus martis,
charum ſaturni, et alia, ex plumbo parata. Exc-
untur etiam hi pulueres vel alcohol, vel aliis liqu-
bus, ſic dictis, ſtipticis. Nec ad haec facile decurr-
dum eſt, cum et iis vulnus multum alienari ſoleat (409).

† Ad remedia ſanguini ſiſtendo idonea referri debet
dictus *Agaricus quercinus*, poſt tempora Platneri a BL
SARDO laudatus, iam omnibus chirurgiae tironibus n-
ſinus, cui a quibusdam virtus aliqua adſtringens attribui-
ab aliis vero negatur. Hoc ſatendum eſt, parum va-
virtutem eam, niſi aliqua compreſſio accedat. De hiſ
poſeſt diſſertatio a me conſcripta mox citata §. 409.

§. 413.

Sunt, qui arteriis obiciunt glebas ex vitriolo v-
illasque paulo valentius adprimunt. Alii ferro c-
dente arterias adurunt. Vtrumque auxilii ge-
cruſtam inducit, qua arteriarum ora praecludunt-
Ea vero, etiamſi ſanguis aliquando per aliquot c-
conquieuerit, non raro illius impetu vincitur.
vero ſic aduſtae arteriae iterum ſanguinem fundu-
maximum diſcrimen eſt, quia illae non parum re-
dunt, et nec comprimi, nec alio modo praecl-
queunt.

§. 414.

Ad ſanguinem itaque ſupprimendum, ſi is ex c-
arteria periculoſius ruit, tutiſſimum auxilium eſt, ar-
rias, ſi id res patitur, deuincire, id quod fit, ſi ſub-
linum, mediante incurua, vel minori, acu, traiecit-
et huius capita in nodum neſtuntur (confer. 23
243. 244).

§. 415.

Arteriam, ſi inciſa eſt, praecidi debere, quo ea
ſe ipſam coire poſſit, ſupra relaturn eſt (354).

§. 416.

Vbi arteria maior brachialis vel cruralis praecisa si tempus id patitur, mox fascia tortilis admoueri membrum praecidi debet (229).

§. 417.

Omni vero homini, cui sanguinis profusio time-
re; valde necessaria est quies et abstinencia. Circum-
enda est omnis negotiosa actio omnisque cura.
tui danda est aqua, eaque, nisi aliud quid hoc pro-
beat, paulo frigidior cum modico cibo, qui corpus
n alit, sed sustinet. Aeger conquiescere debet in
reclui obscuro et quod clausis fenestris ab omni
epitu remotum est. Dari potest nitrum, quod in-
mis vtile est, vbi arteriae celeriores sunt. Profici-
t etiam lotiones lex lactis fero et nitro, si frigidi-
culae in aluum immittuntur. Aliena sunt medica-
menta adstringentia, si ore sumuntur. Nam ad sisten-
m sanguinis profluuium parum valent, et non raro,
imbecillis dantur, visceribus labem adferunt (400).
quandoque etiam auerti potest sanguis, alia parte ex
nere erumpens, si alia incisa vena, emittitur. Haec
o res summam prudentiam exigit, ne, si is demitur,
rpus nimium exhauriatur, omnisque vitalis vis
oriatur. Magis tutum est, si aduersa parte cucur-
ula admouetur et illuc sanguinis cursus reuocatur.

Medicamentis internis his, quae sanguinis tenuitatem ni-
miam minuunt, aliquando vtendum esse, iam supra dixi-
mus §. 234.

§. 345.

Si autem sanguis conquieuit, homo autem, vi
ni effusa, prope intermortuus iacet, quod ad quie-
a attinet, eadem seruari debent, quae proxime scri-
sunt. A somno tamen a primo initio prohiben-
s est aeger, quamuis cum hac imbecillitate marcor
et

et inexpugnabilis dormiendi necessitas esse so-
 Interea alendus is est iusculo pullorum cohortali
 vel aliarum iuniorum carniū. Non vero si
 multitudo corpus onerandum, sed crebrius et
 latim iuscula danda sunt. Imbecilliora enim vi-
 si grauantur, subigere nec hunc humorem pos-
 Quare oritur cruditas, et saepe, si alimentum ad
 becillum pulmonem delatum fuit, praefocati-
 periculum. Vbi metus est, ne sanguis iterum er-
 pat, nocere etiam calor potest, quare non nisi ego
 dari debent. In hoc casu etiam aliena sunt oi-
 calidiora, cardiaca, et, quod inter haec primum
 meracius vinum (204). Huius modicum dari po-
 vbi omnis nouae profusionis metus penitus am-
 est. Corpus etiam recuperatis aliquantum vir-
 nunquam multo et valentiori cibo onerandum,
 modico et leuiori alendum est.

† Iis, qui sanguine nimium exhausti et ex defectu hum-
 adeo debiles sunt, vt fere continua syncope afficiantur
 hibenda frictio, non dura illa, dum modo nullus am-
 sit metus de nouo sanguinis fluxu.

ANEVRYSMA.

§. 419.

Aneuryfmata saepe ex arteriarum vulneribus c-
 constat. Duplex vero huius tumoris genus
 quorum alterum verum vocatur, alterum noth-
 Verum dicitur, vbi arteria non vulnerata est,
 disrupta, sed integra, et vbi illa, vel tota, vel ex
 qua parte, maiorem in modum distenta est at-
 dilatata, et quae sic etiam cutim aliasque par-
 quibus illa subiecta est, in tumorem leuat.

* Dilatata arteria aneurysma verum, dilatata vena vari-
 dilatata vena lymphatica hydatidem efficit.

† Parietes cauorum cordis robore suo priuari, tumores ig-
 enasci in iis posse, cadauerum sectiones commonstr-
 Hos ad aneurysmata quidam referunt.

§. 4

§. 420.

Aneurysma spurium est tumor, qui oritur a sanguine, qui ex vulnerata et pertusa arteria effluxit et sub cute coit.

Si sanguis ex vena sic pertusa sub cute exit, oritur *ἐκχύμωσις*.

§. 421.

Aneurysmia verum frequentius in interioribus sevis est, spurium frequentius in artubus.

Aneurysmata veri generis in interioribus frequentius eo fiunt, quod arteriae eae cordi propiores sunt, atque, multum aucta in extremis corporis locis resistentia, impetus cordis in eas plurimum potest. Spurium in artubus frequentius est, quia causa solutae unitatis in iis frequentior est.

† *Aneurysma verum* est vel *circumscriptum* vel *diffusum*. Illud fit, si aliqua definita regio arteriae, non adeo magna in tumorem sublata est, seu circumquaque seu ad latus quoddam tantum modo, hoc vero, si insignis tractus arteriae tumidus est sic, ut tumor non sit accurate et distincte definitus, sed inde a loco tumidiori paulatim decrescens. Genus prius saepius accidit. *Aneurysma nothum* etiam est duum generum. Alterum vocatur *circumscriptum*, alterum *diffusum*. Illius tumor fit a sanguine in cellulas ab arteria proximas effusus, e quibus sacci alicuius species formatur; *diffusum* vero existit ex sanguine per cellulas adiposas tum arteriae vicinas, tum ab ea plus minus remotas diffuso eademque implente, atque sic aliquando totum artum in tumorem insignem expandente. Commemorant quoque *aneurysmatis genus mixtum*, eiusque etiam species duas faciunt. Scilicet si exterior arteriae tunica vel secando, vel lacerando, vel pungendo, vel rodendo diuiditur, interiori integra superstita, non satis potest haec impetui sanguinis resistere, distenditur igitur, fitque in eo loco tumor partim ex solutione continui, partim ex relaxatione et ampliacione arteriae. Altera species mixti aneurysmatis gignitur, si praegressi aneurysmatis veri sacculus quacunq; de causa disrumpitur dissolviturque, atque adeo sanguis in vicinas cellulas adiposas effusus aneurysma nothum progignit. Dixeris fortasse, utramque speciem referendam esse ad aneurysmata generis nothi. Non repugno quidem. Verum tamen a simplici genere notho differunt hae species eo, quod arteria et tumida in loco quodam est, et simul eius continuitas soluta.

Præter

Praeter illa genera est singulare quoddam, raro quidem accidens, sed nihilo tamen secius animaduersione dignum. Scilicet si vena in cubiti flexura, basilicam vocant, eodem loco, cui arteria subiacet, pertunditur sic, ut scilicet mucro in arteriam eam penetret, fieri potest, ut super venae plaga aequae atque cutis vulnusculum, cicatrice perfanetur, vulnus vero inferius venae et vulnus arteriae inter se conglutinentur, quidem sed tamen arteria in venam sanguini ingressus pateat perpetuo. fit, ut sanguis venam in speciem varicosam mutet. sed prorsus singularem. Hoc genus vocari potest, *varix aneurysmaticus*. Primo ab HVNTERO animaduersum ac praeter scriptum est, in observationibus et disquisitionibus medicis: *Medical Observations et Enquiries*, T. II. pag. 110; et T. III. pag. 110; nec non repetitum et icone expressum ab GEORGIO ARNOLDO. Vid. *Mémoires de Chirurgie*. GEORGE ARNAUD, à Londres 1768. pag. 245.

§. 422.

Notae aneurysmatis veri et nondum inueteratae sunt: Tumor rotundus est aequalis et elatior. digito parumper cedit, et cuius color mutatus est. Tumor post acceptam aliquam plagam, vel mentioem nixum aliamque causam pedetentim surgit, manente diutius obscuro aliquo dolore, indum adolefcit, vehementius pulsatur *. Non ita facile dignoscuntur aneurysmata, quae intus nascuntur. Suspicionem mouere potest pulsus valde inaequalis et si ille alia qua parte in pectore sentitur, spiritus difficultas, sensus obscuri doloris, insuetae anxietatis.

* Pulsus signum esse dicitur pathognomonicum aneurysmatis in primis veri. Ast tamen aliquando fiunt abscessus, arteriis maioribus propinqui, fere similem in modum habent, ac aneurysmata. Idem accidere potest in *exxv*. Si enim v. g. sanguinis missio in brachio minus felix cessit, et tendo, vel aponeurosis bicipitis musculi laesa, et sanguis sub cute coit, ac inflammationem mouit, accenditur valentius aponeurosis et tendo, constringitur hinc iecta arteria, qua mota elataque, etiam omnis tumor accenditur, qui sic aneurysma mentiri potest. Vide LANCET p. 101. Hic ideo errorem RIVERII in Obs. p. 685. qui talem ecchymosin, tandem suppuratam, pro aneurysmate habuit. Accidere tamen etiam haud minus potest.

tumore inueterato et obcalescente aneurysmatis veri, dum sanguis in tumore augetur, et ille, qui exterior est, tandem induratur, dumque etiam ipsa cutis indurefcit et aliquando fere cornea fit, vt pulsus percipi distincte haud queat. Diligentior itaque animaduersio omnium signorum adhibenda est, cum facile etiam peritiores decipi queant.

Cognitio aneurysmatis veri in arteria non alte sub carnibus condita, recens orti, cuius etiam causae praegressae euidentiores sunt, haud ita difficilis est, sed vetus, alte sub carnibus conditum diagnofin habet difficilem. Nam in eo et tunicae arteriae paulatim duriores, minus fenfiles, minus mobiles, magis resistentes, callosae, cartilagineae, fere effcae, crassae admodum fiunt, ac praeterea sanguis in tumore eo haerens cogitur in spissum cruorem, a quo ad parietes internos arteriosi tumoris lamellae formantur; ab vtraque igitur causa pulsus tum in tumore tum in reliquo tractu arteriae sub aneurysmate obscurus admodum fit, quia cordis vis resistentias illas superare, arteriam igitur ampliari vix potest. Sanguis quoque in grumos lamellae concretus non deferit tumorem, isque igitur pressus non euanescit. Itaque non modo tumor alius aliquando falso haberi potest pro aneurysmate, vt PLATNERVS in praecedente nota dixit, verum etiam tumor aneurysmaticus interdum non agnoscitur et alius generis esse putatur. Qui quidem error fere grauior est illo priori, et noui ego, publicum Anatomiae et chirurgiae Doctorem quendam, *vvv εν αyλοις*, tam graui errore lapsum esse, vt tumorem aneurysmaticum, quem generis tunicati esse iudicauerat, sectione imprudenti auferre anniteretur, tam infelici conatu, vt hominem profusione sanguinis sub ipso opere extinguere videret. Ne igitur erremus, omnes causas omniaque symptomata inde a primo morbi ortu diligentius colligere et aestimare decet.

§. 423.

In aneurysmate spurio tumor est ab initio minus, dum increfcit, magis durus, depressior, et adnatus latior ac inaequalis. Minus pulsat, quam vult, at tamen in eo quasi obscurior strepitus percipitur. Tumor tandem increfcit et citius ad gangrae spectat, quam futuram cutis liuida atque nigri significat. Si aneurysma spurium in brachio est, illud frequentius ex minus feliciter administrata

sanguinis missione incidit, tumor ad humerum adscendit. Nam inferius obstat illa bicipitis aponeurosis.

† Strepitus illius mentionem primo facit PARAEVS, et beatitudinioni apum similem esse dicit; sit fere primis temporibus a sanguine erumpente ex arteria.

- §. 424.

Verum ex variis causis oritur. Arteriae et distenduntur, tum in internis, tum externis sedile a vehementiori nixu atque motu, id quod accidere potest ex vomitu, partu difficili, aliaque virium contumelione, vel valentiori artuum intentione atque quarundam partium pressione. Si enim os fractum luxatumque, exostosis aliusque tumor arteriam materiam premit, illa ante tumorem distenditur. Hoc etiam accidit, si arteriarum tunicae a propè sito scissu, vel ulcere, et ex his exeunte humore lubricatur et laxantur. Saepe aneurysina in aorta nascitur si polypus in corde est, quo sanguinis motus impeditur redditur. Hoc etiam fieri, si arteria alicui praecipue eo articulo temporis, quo illa ab irruente sanguine distenditur, grauem et subitaneum impactum passa fuit, exemplis probatum legimus*. Non minus confert malus corporis habitus, et si corpus longo morbo maloque victu vitiatum est. Humida enim si in corpore corrupta sunt, fibras omnesque solidas partes, et igitur etiam arteriarum tunicas, imbecilliores reddunt laxasque**.

* Vid. LANCISIUS c. I. p. 108. et IOANNIS NICOLAI HARTORFF Diss. de Aneurysmate in capite pueri XI. annorum Argent. MDCCXXII.

** Hoc probat multis LANCISIUS c. I.

† Causae veri aneurysmatis in arteriis ipsis reperiuntur cernuntur vel in tunicarum, muscularis praecipue, immunitate, vel in tunica intima, laevi illa, ab acris artibus et corrosa; de hac posteriori vid. IOH. BAPTIST. MORGAGNIUS in Libro de sedibus et causis morborum; denique

et tunica exterior potest laedi variis modis caussisque, de quo PLATNERVS.

†† Aneurysmatis veri causa proxima est in ampliatione loci alicuius arteriae ponenda, cuius causae vltiores variae sunt.

§. 425.

Hoc vero non tantum vitio illarum tunicarum accidit, ex quibus ipsae arteriae constant, sed anatomico, plures arterias habere alia inuolucra et integumenta a prope sitis membranis, quae illas ita comprehendunt atque constringunt, vt earum robur ac elasticitas non parum inde augeatur. In pectore maiores arteriae comprehenduntur membrana a pericardio iuncta, aliae pleura conteguntur, in abdomine peritoneo, in brachio et pede aponeurosi muscutorum. Si igitur istae membranae ex varia causa resoluuntur, et laxantur, aneurysmati locus datur.

† Si in pluribus locis sine euentibus causis aneurysmata sunt, systema vniuersum arteriosum labe quadam laborat, qua fit, vt vel laxitas, vel fragilitas, vel corrosio fibrarum peccet.

§. 426.

In brachio hoc accidere solet, si a scalpello, vel a ratione, violata, pertusa, vel laxata est aponeuro-musculi bicipitis.

§. 427.

Est autem quaedam diuersitas. Aliquando enim a arteria ampliata est ac distenta, aliquando, et si arteria ossibus aliisque partibus duris incumbit, eius sem exterior pars, ita, vt in hac tumor hernialis excitetur.

§. 428.

Aneurysma spurium nascitur frequentius ex per-a arteria, id quod crebrius accidit, si ex vena basili, cui arteria brachialis subiecta est, sanguinem mit-

tere volunt chirurgi. Nonnunquam tota arte dirumpitur. Id quod aliquando valentiori intentio cubiti et radii, qui luxati erant, accidisse constat.

† Aneurysmatis nothi causa proxima semper repetenda a solutione continui in arteria. Haec autem ab succu quouis vehementiori, praecipue in praedispositis existere potest; itaque et a saltu ab alto in cruribus interdum cuius suspicio est, si homo eo ipso saltus tempore de dre quodam acuto, in carnibus, loco quidem definito, queritur, et postea furae carnes paulatim intumescunt. Hoc genus, nisi crus praecidi possit, tandem aliqua necem affert.

§. 429.

Aneurysma verum non tam celeriter adoleat. Tandem, ubi tumor increvit, et arteriarum tunicae et cum his iuxta sitae partes alienatae sunt, exfluxu ex eo saepe humor, qui acrior factus, ea, quae prelo sunt, rodit, et ossibus etiam vitium adfert. Quia tumore lymphatica vasa premuntur rumpuntur, praecipue in interioribus sedibus, multus humor effluit, qualis non raro in pectore repertus est. Tandem vero, arteria rumpitur et homo sanguinis profusione exhaustus vel suffocatus repente absumitur. In arteriis, quae per artus diuiduntur, tumor, si incens et non ita magnus est, facta compressione tolli potest, si vero ille inueteravit et obcalluit, scalpelli operam postulat. Nec tamen sectio semper tutam in arteria brachiali, nisi illa bifida fuerit. Quare propter aneurysma saepe totum membrum praecidendum est. In collo, pectore et interioribus aliisque sedibus ubi nec compressio, nec sectio, locum habet, aneurysma verum increfcit, donec tandem rumpitur hominem repente occidit.

† Quo vetustius est aneurysma verum, eo peius est, eo minus sanari potest, adeo ut nec amputatio artus salutem et vitam promittere possit: Nam non modo ea, quae PLATNERVS §. hoc adduxit, sunt, sed arteria quoque

fede sua, quae supra aneurysma ipsum est, ita alienata esse solet, ut arteriae compressio aut constrictio fieri nequeat, sanguinis profusio igitur hominem humore vitali exhauriat. Interdum sacculus tam amplus est, ut arteriae collaterales superiores refecerentur. Praeterea aneurysmata vera saepe sunt a causis internis, lue venerea, scabie foediori et perniciosa, similibusque cocochymii aliis, quarum causarum suspicio iniusta non est, si in pluribus corporis sedibus aneurysmata orta sunt; aut si nulla omnino causa externa solitaria patet, in corpore vero signa non obscura mali habitus sunt. Nec ista genera a chirurgia efficaci facile sanantur.

§. 430.

Celerius finitur spurium, in quo proximus gangraenae metus est. Cum illud comprimi nequeat, totius ad scalpelli curationem decurrendum est, si locum habet. Vbi violatae sunt maiores arteriae, g. truncus brachialis, cruralis, saepe et in hoc mirum, sed unicum auxilium est, membrum abscindere.

§. 431.

Aneurysma verum compressione curari, iam (429) scimus. Ergo, ubi illud nec valde magnum, nec interatum est, et nondum occalluit, et ubi arteria non rupta, sed aliqua parte dilatata est, (427) in brachio et in crure sedibus, quae sine periculo premi possunt, tumor ante omnia digitis perfricandus premendusque est, donec omnis sanguis, qui in eo haeret, dissipatus et intus compulsus fuit. Post superdanda est charta oleosa masticata et ex alcohol vini expressa, imponendi sunt panni multiplices ac gradati. Inter hos pannos compressus, vel aliud quidpiam, quod durum est, conponitur, quo illis valentius prematur. Ceratum, vel emplastrum, quod nonnulli imponere solent, melius non mittitur. Omnia adstringuntur fascia. Haec, quae unicum finem glomerata est, orditur ab infimo humero, circa quem illa bis voluta fertur supra pannos adatos, qui semper, ne tumor iterum consurgat,

impositis duobus digitis, indice et medio alteri manus continendi sunt. Ita vero tendit ad summum brachium, quod in orbem voluta comprehendit, rursusque super pannos gradatos ad humerum reuertitur. Ad eam rationem ter circumagitur, et, si ea super pannos fertur, digitorum impositorum vices leniter permutari debent. Ea etiam, dum humerum brachiumque amplectitur, semper sibi appropinquatur, quasi in cochleam serpit, vel asciam describit. Tandem, ubi ea sic bene tenet comprimitque pannos, sursum versum tendit, et splenium, quod arteriam brachiali obiciendum est, comprehendit. Necesse vero est, ut, dum aneurysma sic deligatur, brachium paulum ad latus adducatur flectaturque, quod postiectam fasciam, et, dum id mitella excipiendum iterum parumper, et quantum fieri potest, extensus debet, quo panni, qui tumori impositi sunt, melius coarctentur.

† Charta bibula illa, aut quicquid tumori imponitur, paulo maius esse debet quam tumor ipse, sed non multo. Nunc modo recens orta aneurysmata vera aliquando ita curantur, sed et vetusta et callosa, quae nec chirurgia manuali facili possunt, hac comprimendi ratione tolli posse asseuerant. Vetusta autem aneurysmata illa compressionem post initio lenem, processu temporis paulatim auctam; limbo tumorem tegentibus subinde posca adspargenda.

§. 432.

Reperta fuerunt varia machinamentorum generum ad comprimendum aneurysma, in brachio praecipue idonea, quae loco fasciae adhiberi possunt.

Vide figuras in HEISTERI T. I. Tab. XI. p. 436. addo aliquam ab expertissimo Dn. SENFFIO, Berolinensi, acceptam Fig. X.

† Satis commodum machinamentum huius generis describit IOSEPH. IACOB. PLENK in collectione observationum chirurgicarum teutonice conscriptarum et inscriptarum *Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneywissenschaft. Wien 1775.* Si aneurysma verum

usum diuturniorem compressionis desiderat, machinamenta
 ea, quae paulo elatiora sunt, haud commode sedent, et
 aegrius ab homine ita affecto circumferuntur. Noui ego
 virum, in cuius humero medio ortum aneurysma verum sim-
 plici illo apparatu, qua homines fonticulos in humero ex-
 citatos deligare solent, et sat crasso splenio ita per plures
 annos curatum retentumque fuit, ut ad sciam senectutem
 perueniret.

§. 433.

Siue fascia, siue machina, fuerit adhibita, illa non
 otinus resoluenda est, sed diu relinquenda. Opor-
 etiam fasciam, si illa laxior videtur, subinde addu-
 e, et interea sanguinis impetum crebra missione,
 i ductione, abstinentia, tenui victu et aquae potu
 tigare.

§. 434.

Aliam curandi rationem recentiores proposuerunt,
 am aneurysmati non solum vero, sed etiam spurio,
 liberi posse affirmant. Ea experienda videtur in
 s desperatis, ubi nec vinctura locum habet, nec
 lpelli opera tuta est, cum minimum interdum illa
 ratio proficere possit, ubi praestat ancipiti auxilio
 , quam nullo. Opus vero est pluribus fasciis,
 ibus, cochleae in modum sursum versum serpenti-
 s, singuli digiti circumdantur. Alia postmodum
 cia, eodem modo sursum tendente, comprehendi-
 totum brachium et humerus, ita, ut in supremo
 mero finiat. Ita circumire debet fascia, ut illa va-
 tius, et plus solito, adstringatur, non vero tantum,
 membrum gangraenae opportunum fiat. Vbi ad
 norem ventum est, plumbum imponitur, vel aliud
 id, quod durum est et ad tumorem reprimendum
 ratum, super impositis etiam multiplicibus pannis.
 scia vero circa tumorem, et ea, quae huic imposita
 nt, aliquoties voluitur, quo magis ea coarctentur.
 teriae etiam brachiali in summo humero obiiicitur

splenium. Antequam vero brachium sic vincitur, illud ita flectendum est, et ad latus adducendum, commode mitella exceptum suspendi ex ceruice potest ne postea suspensum aliter, atque eum deligabatur inclinandum sit, utque illud minime moueatur. Frequentius postmodum instillandum ingerendumque fasciam est alcohol vini, quod camphoram exceptit, huic similis liquor. Fascia ante quadragesimum diem non soluenda, si vero laxior videtur, ita adducenda est, ut non quidem omnem vitalem sanguinis motum sed omnem eius nimium impetum, cohibeat atque reprimat.

§. 435.

Ad id vero necessarium est, ut aegro quam plurimum sanguinis detrahatur, utque is quasi exsanguis eneruatus per plures dies iaceat. Sic enim in corpore ita exhausto et debilitato omnis sanguinis impetus frangitur, et efficitur, ut interea, accedente externa pressione, arteria ad pristinum robur reuertitur, et, si spurio pertusa est, cicatrice iterum glutinari quod. Cum his valde necessaria est abstinentia, et utendum est cibo exiguo, ac potione quam dilutissima, et quod corpus minime incendit.

† Hanc rationem aneurysmatibus notis medendi singulari stupendo curationis exemplo confirmavit THEDENIUS. Iam ab vulneratione arteriae hebdomades decem elapsae fuerunt, et brachium adeo sanguine turgidum fuit, ut bis pluribus dirumpi a sanguine extra vasa egresso videretur. Fascias et splenia aqua traumatica sua continuo madefecit. Hac de curatione et omnino de fasciandi ratione totius alicuius artus legatur eius liber inscriptus: *Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarztney. Berlin 1771.* Si quis aquam traumaticam THEDENII ad manus non habet, poscam adhibere potest ad lintea subinde madida reddenda.

§. 436.

Aneurysma verum autem, quod sic vincitur, pressione curari non potuit, excindendum est. H

aut

tem fieri nequit, si tum verum, tum spurium est aliqua arteria, per quam solam sanguis in membrum influit, quod ideo praecidendum esse supra re-
 i (429). In brachio tamen frequentius, si sanguis vena mitti debet, laeditur arteria brachialis, antea illa in radiaeam et vlnarem diuiditur, id quod eius positu clarum est, et nihilominus feliciter quandoque cessit curatio, si chirurgia adhibita, et arteria deuincta atque praecisa fuit. Paulo accuratior in Anatomicorum obseruatio docuit, arteriam brachialem subinde mox in summa humeri parte in duas diuidi. Imo, si illa etiam indiuisa vltra articulum cubiti procedit, id quod frequentissimum esse videtur, ex ea tamen priusquam diuiditur, plures aliae arteriae educuntur, quae cum radiaea et vlnari committuntur. Nam et has duas arterias crebrius per duas minores inter se iungi, sine dubio est. Accidere quoque potest, vt, si supra cubiti articulum etiam truncus arteriae brachialis praecidatur, seruari nihilominus brachium possit, quia per alias arterias, et vel per alterum brachialis truncum, si haec superius, et non in humero, bifida fuit, vel per minores, quas WINSLOWVS collaterales vocat *, radiaee et vlnari committas, sanguis in membrum influere potest. Nam illud non omittendum est, sanguinem, si is copiosius per minores arterias, praeuinctis vel compressis maioribus, in aliquam partem diffundi debet, suo intuitu arterias non parum ampliare. Ex his intelligitur, in brachio, minimum nisi certa sit desperatio, periciendam esse aneurysmatis chirurgiam. Nam, si etiam fallit, nihilominus ad vltimum auxilium, non humerus praeciditur, confugere potest chirurgus.

* Vid. WINSLOW *Expos. des arteres* §. 134, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 145, 160. et ALEXANDRVM MONRO in the *medical Essays d'Edinburgh*, Vol. II. Obs. XVII. Tab. II.

† Ampliatio arteriarum collateralium illarum aliquando demum facta est, cum iam ex absentia caloris et sensus flatu atrophico medicus vereretur, ne in propinquo gangraena esset.

§. 437.

Haud adeo multum veri aneurysmatis curatio ea differt, quae spurio adhibenda est, de qua, hoc frequentius sit, prius dicam. Praeparandum eam, si tempus id permittit, corpus aegrotantis sanguinis missione, alui ductione, victu modico et: lubri, et aquae vel ptisanæ potu. Oportet autem antequam scalpellum adhibetur, fasciam tortilem, torcular, (237) arteriae (240. 249) admouere, ne chirurgiæ sanguinis profusio hominem exhaustum. Scalpello recto, non ancipiti, inciditur tumor, et, plaga latius pateat, in eam demittitur specillum falcatum, et super id forfex incurua, qua illa commode ampliatur. Plaga autem oblique facienda est, et quæ a radio incipit et ad condylum humeri internum spectat. Ex hac, quidquid cruoris coit, extrahendum est. Quia etiam saepe cruor sub illa aponeurosi haeret, quae ibi ex bicipite musculoeducta, inter musculos et vasa comprehendit, ea etiam incidenda est, ut omnis cruor eximi possit. Illa autem plaga transversam desiderat. Melius haec fit, si brachium leniter inflectitur.

§. 438.

Prius vero, quo laesae arteriae vulnusculum occurrit, pateat, illaque a sectione tuta sit, necesse est, paululum resolvere tortilem fasciam, vel torcular, ut sanguis erumpens illud ostendat. Vbi id repertum est, oportet arteriam a prope sitis venis nervisque separatam summa adhibita diligentia, ne quid harum, et ne a qua ex minoribus arteriis, quas supra collaterales vocamus, laedatur, quare etiam sanguis subinde linteis

extergi debet. Arteria vero sic deoperta et separari debet. Ob hanc causam tria lina cerata, valentia, coniiciuntur in acum incuruam maiorem, quae auersa traiecitur sub arteria. Excogitaue-
t alia ferramenta ad id idonea, et PETITVS acu
ex argento fabrefacta vtitur, qua et lina traiectan-
et arteria ab aliis separari potest. *Fig. XI.*

Si multus sanguis effusus est, is saepius faciliorem reddit
separationem nerui ab arteria, immo separationem eam
aliquando iam effecit. Alioquin chirurgum iuuat medi-
ocris flexio cubiti illius.

§. 439.

Lina vero sic traiecta ita collocantur, vt duo
vnum supra arteriae vulnus, tertium infra illud, po-
tuerint sit. Deuincitur vero arteria, et primum ad-
iungitur linum, quod proxime supra arteriae vulnus
et post etiam illud, quod infra istud haeret.
arteriae enim etiam inferius linum iniiciendum, quia
licet collateralibus arteriis sanguis in hanc influere
periculosam profusionem mouere potest. Tertium
vnum non adstringitur, sed in vulnere relinquitur, vt,
forte alterum a sanguinis profluio victum et e sede
dimotum fuerit, illud protinus adstringi possit.
etiam iniecta lina arteriam mordeant vel abrum-
pant, inter duo eorum capita, antequam deligantur,
tendi sunt panniculi minores, quibus efficitur, vt
mitius arteriae infideant. Cognoscitur vero, ar-
teriam recte deuinctam esse, si, laxata fascia tortili ea
vulnus sanguinem fundit.

Fieri potest, quamuis raro, vt ex loco arteriae, qui inter
duo vincula est vnus alterue ramus collateralis egrediatur.
Hoc si animaduertatur, necesse est, vt et isti rami seorsim
vinculis constringantur, ne fortasse sanguis ab aliis ramis
in hos regrediens per illas in ramum principem refunda-
tur, atque adeo denuo fiat sanguinis iactura.

§. 440.

§. 440.

Quod si iam vulnus deligandum est, illud per spongia alcohol madente extergitur. Brachium lulum inflectendum et ita inclinandum est, ut commode ex ceruice suspendi et humerus ad l deligari possit. Cum ad vulnus ventum est, ad l arteriae collocanda sunt duo minora splenia, seu longi densique panniculi, super hos vero multa l menta, et super haec fulciendi sunt panni multip gradati. Haec comprehenduntur alio panno, altera parte fissus est. Huius vero, quod integr est, vulneri imponitur, duobus autem capitibus m brum inuoluitur. Omnia haec adstringuntur fascia quae non alia est, quam, qualem mox descripsi (4). Arteriae in suprema humeri parte obiciendum splenium. Brachium ita collocandum est, ut erecta sit, non vero dependeat, qua re etiam sanguinis petus non parum cohibetur.

† Si vincula arteriam satis constringunt tenentque, hum non nimis arcte fasciandus est, ne sanguinis ingressu arterias collaterales cohibeatur earumque ampliatio in diatur. Neque fascia tortili aut torculari opus est, ma pere. Ab eo enim idem metus.

§. 441.

Brachium, quod sic deligatum est, plerumque i parum intumescit, quare, ne id gangraenae oppor num fiat, petendum praesidium est, tum a sangu missione victusque ratione, tum etiam a medicamen quae aduersus inflammationem possunt. Sed vario rerum quasdam etiam animaduersiones desiderat. enim manus et inferius brachium multum calet, q res vehementiorem sanguinis motum indicat, opp tuna sunt reprimentia (76). Sal ammoniacus et thargyrium ex aceto cum aqua coqui possunt, et his fomenta superdari. Vbi vero manus fere emor vide

etur et frigida, et nullus arteriarum motus in ea
cipitur, id quod crebrius accidit, si arteria brachi-
deuinsecta fuit, oportet frictionem adhibere et ex-
us tepida aqua, cui spiritus vini adfunditur, mem-
m diligentius perfricare. Illud enim tenendum
magnum timorem quidem esse, si post sectionem
manu nullae arteriae agitantur, certam tamen de-
nationem ideo haud esse. Nam aliquando, post
nti quatuor et plures horas, et arterias iterum at-
i, et membro colorem naturalem reddi, observa-
i est.

Id. exemplum ab ALEX. MONRO adductum in *the medical
Essays* Vol. IV. Obs. XVIII. pag. 299.

§. 442.

Fascia, nisi aliud quid hoc requirat, ante quartum
n resoluenda non est. Hoc ubi fit, in promptu
debet fascia tortilis, vel torcular: Nec remoueri
diduci debent linamenta, quae vulneri inhaerent,
a non sponte excidunt. Aliena sunt ab initio di-
entia, et quae nimis molliunt, quare superinfun-
da est essentia balsamica, qua etiam linamenta, si
e imponuntur, madefacienda sunt. Lina nun-
m praecidenda sunt, sed relinquenda, donec ex-
unt. Cadit vero plerumque post plures dies prius
d, quod supra vulnus arteriae erat, et post etiam
rum. Vbi tandem nullum ex sanguinis profusione
culum imminere videtur, necesse est, ut brachium
nde moueatur, atque ad usus suos promoueatur,
per nimiam quietem contractus articulus fiat.
n etiam inflammationis magnus timor sit, succur-
lum est abstinentia, modicis et tempestiuis cibis,
ae potu, et omnibus, quae aduersus inflammatio-
a valere iam saepius retuli.

§. 443.

§. 443.

Si verum aneurysma adeo increuit et obca-
 vt scalpelli auxilium desideret, eadem fere chir-
 necessaria est. Arteriae enim, quae hic ipsa intur-
 etiam vinciendo prospiciendum est, quare oportet
 prius et supra et infra tumorem lino constringere,
 eam incidere et eximere ex tumore omnem cruo-
 Confert etiam excidere et circumcidere, si qua vi-
 sunt, et, tum in dilatata arteria, tum in adipe et
 quae alienata vel indurata sunt. Caetera in cu-
 one similia his esse debent, quae in altero genere a-
 rysmatis praecepi.

§. 444.

Sunt, qui in aneurysmatis spurii curatione vu-
 ratae arteriae obiciunt glebam ex vitriolo, cum
 difficile videatur, arteriam a nervo aliisque part-
 separare et lino vincire. Hoc vero auxilium non
 tutum esse, ex supra dictis clarum est (413).

§. 445.

Post hanc curationem plerumque manet mem-
 debilitas. Confert, illi torpenti infrictionem adhib-
 et illud neruino vnguento perfricare, etiam calid-
 spiritu vini inter se mistis fouere, et praeterea illud
 potest, per se, sin minus, per alium mouere.
 asperanda etiam cutis est, vel vrticis caesa, vel ad-
 tis cantharidibus, vel sinapi et similibus.

§. 446.

Si vero sanguinem mittenti forte accidit, vt ar-
 riam incidat, hoc ex notis supra datis (353) cognosc-
 potest, et, si vas, quod sanguinem fundit, digito p-
 mit. Si enim, eo supra vulnus compresso, sanguis c-
 quiescit, lacerata est arteria. Nam si ex vena sang-
 fluit, illa infra vulnus premenda est (408). Vbi
 t

incisa arteria est, non protinus ad sanguinem sup-
 mendum festinari oportet. Neceſſe enim est, mul-
 tum sanguinem ex ea effundi, quo impetus mitigetur
 vulnus melius praecludi possit. Nec in hoc casu
 imescenda aegri imbecillitas est. Hanc tamen ob-
 nationem adhibeat chirurgus, vt, si videat, super
 eriae vulnus cutim in tumorem leuari, quam pri-
 m arteriae vulneratae impositis pannis et adhibita
 em fascia, quam aneurysmati vero idoneam de-
 ipsi, prospiciat. Praeuidere enim potest, futurum
 aneurysma spurium. Necessarium itaque est, vt
 alia vena incisa non parum sanguinis detrahatur.
 vero vulnus deligandum est, et in omni curatione,
 obseruanda sunt, quae in aneurysmatis chirurgia
 cessaria esse proposui.

De aneurysmatibus legi praeter eos, qui in hoc capite lau-
 dati sunt, merentur ANTON DE HAEN in *Ratione medendi
 in Nosocomio pract.* CAROLVS GVATANI *Liber de Externis
 Aneurysmatibus*, Romae 1772. ANTON MATANI *De Anev-
 ryismaticis praecordiorum morbis*, Florent. 1756. item *Fran-
 cof. et Lipsiae* 1766. Inspici etiam potest *Historia Regiae
 Societatis Medicinae* etc. Seu *Histoire de la Société de
 Medecine*, A. MDCCLXXVI, à Paris 1779. Nouam, non-
 dum tamen experimentis comprobata rationem arteria-
 rum vulneribus medendi in eo libro proposuit vir Iuue-
 nis, LE COMTE, chirurgiae cultor ingeniosus. Vulneratas
 arterias posse forsan cicatricem contrahere sperat, si cir-
 cumdarentur re aliqua diastolen impediante. In animan-
 tibus igitur brutis arteriam fauciam circumdedit penna
 vtrinque patula et iuxta longitudinem incisa, vt arteriam
 caperet. Curationis eius effectus fuit quidem huius modi,
 vt spem faceret, sanationem forsan aliquando ea posse
 perfici. Verum tamen vehementer vereor, ne omnis labor
 frustra suscipiatur. Vix enim corpus alienum diu aut per-
 petuo inter carnes haerere potest, vt nulla profus fiat
 irritatio.

DOLOR.

D O L O R.

§. 447.

Vulnerum aliquando ingens dolor est, quem, a n
vis oriri, si ii valde intenduntur, vel ab acris
rodentibus, siccantibus, pungentibus aliisque graui
afficiuntur, nemo ignorat. Tela, glandes plumbe
maxime compressae et asperae factae, várii gene
ferramenta, aliaque corpori illata, si intus haere
cruor, si in vulnere concretus remanet, pus, si
mora, vel ex corporis malo habitu, acre factum
imposita medicamenta acria, et ex his etiam n
quod nervosis locis alienum est, vnguenta illita, si
rancida fiunt, turundae aliaque linamenta, si h
super vulnus non leuiter posita, sed fulta sunt, et
dolorem faciunt, quem etiam adfert omnis inflam
tio, si ex hac orae vulneris intumescunt, et ob
nerui magis adducuntur atque tenduntur.

§. 448.

Acer vero acutusque dolor exoritur, si aliq
neruus, non praecisus, sed incisus, vel cuspide p
ctus est, qui oriri videtur, quia dissectae fibrae re
dunt ac crispantur, reliquae autem, quae integrae su
sic magis intenduntur.

§. 449.

Id autem non in nervis solum incidit, sed et
in sedibus ac partibus nervosis, praecipue in mus
lorum tendinibus, quibus etiam illae membrar
ἀπονευρώσεις dictae, adnumerari debent, quae
musculis educuntur, vel has aliasque partes cingu
Ob hanc causam minoribus vulneribus, si his ap
neurosis musculi bicipitis in brachio, vagina, c
vtrunque musculus rectus abdominis comprehendit
nec non fascia lata in femore, laesae sunt, et si fo

li, vel ensis obtusioris, inuero in his desedit, longe hementior dolor maiorque inflammatio subesse let, quam vulneribus maioribus atque hiantibus, si ec istae partes acceperunt.

§. 450.

Vulnera, quae graui dolore vrgentur, magna crimina recipiunt. Doloze enim incenditur febris, que ex aliis causis, v. g. ex inflammatione, orta inditur, eripitur somnus et sequitur tandem neruon distentio, nonnunquam etiam vulnus, increscens inflammatione, gangraenae opportunum fit.

Ob hunc metum vehementioris a dolore nimio inflammationis in grauioribus vulneribus laesionibusque aliis saepe praestat tempestiue et ab initio mediocre praebium medicinae opiatæ dare vulnerato.

§. 451.

Dolor itaque, a variis rebus ortus, variis etiam aliis leuatur. Si eum aliena, quae in vulnere haet, inferunt, ea eiicienda sunt. Si vulnus linamentis et pannisque, vel adstrictiore fascia nimium premitur, esse est, hanc resolui, et ea, quae premunt, tolli. Si inflammatis medentur, supra retuli. Inter ea quibus sanguinis missio primum est. Non parum etiam conuenit, si orae vulneris, ex quo, pro eius modo, parum sanguinis fluxit, conciduntur, et, si iis imponuntur ligamenta, quae molliunt atque digerunt.

§. 452.

Si prope vulnera sedes quaedam intumescunt, illae dolent, confert illis imponere cataplasmata, quae tumorem emolliunt. Commodus etiam est vsus olei, cui rosam excepit, cui spiritus ardens adiicitur, quae tumores dolentes tumidaeque partes perunguntur. Haec res abdomini valde utilis est, si illud vulneratum. Si acrior sanies vulnus erodit, vel huic inposita sunt.

sunt medicamenta, quae grauiter offendunt, illi spongia detergendum est ex calida expressa. Vbi incisa vulnus afficiunt, spongia spiritu vini madens hibeatur. Aduersus illum vero dolorem, quem dentia intulerunt, valent linamenta, quae digeruntur ex horum numero vnguentum album camphoratum. Superdari etiam possunt cataplasmata.

§. 453.

Si vero malis corporis habitus est, et vitiatum succi vulnus corrumpunt et dolorem mouent, quod quid medicamentorum imponitur, parum proficit, humores purgentur. Oportet vero sedulo obseruari quae supra (400) praecepi. Cauendum etiam, ne lentioribus medicamentis, ad purgandos succos dum febris atque inflammatio intenduntur, hisque dum augeatur. Vbi dolor vehementius vrget, danda sunt sic dicta, paregorica, emulsiones ex semine papauis addito nitro. In aluum immitti possunt lotiones lacte cum herbis emollientibus coctae, addito co. Non semper tutum est medicamentis validioribus ipso opio, somnum arcessere.

† Omnis nimium acerbus dolor, cuius causa tolli potest, lacryma papaueris mitigandus est sopiendus aliquando audacius. Neque tum ab opio facilis n alicuius noxae est, quia illa neruorum tensio a dolore impedit, quo minus neruorum robur ab opio frangatur.

§. 454.

At, si neruus vel punctus vel incisus est, dolor conquiescent, si is totus praeciditur. Neruis et ita laesis, medicamenta sunt ea, quae omnem sensum tollunt. Inter hoc optimum est oleum terebinthae quod calidum frequentius infundendum est. alienum est balsamum Peruuianum, si id alioholo pitur. Cum his vulnere imponi possunt cataplasma

mollientia et digerentia. Membro vero ipsi adhiberi ebent, fomenta, et ab initio, quae nimium sanguinis litum ipsamque inflammationem auertunt ac repriunt (76. 77. 78). Si vero haec iam membrum tenet, ia, quae discutunt (79. 80. 81). Nec quidquam orum, auxiliorum, quae maxime aduersus inflammationem valent, negligi debet (62. ad 70). Eadem ratio est tendinibus, si illi vulnere laesi sunt. Si aga, aponeurosi illata, non satis patet, illaque inflammatur (449), ea protinus amplianda est.

NERVORVM DISTENTIO.

§. 455.

Nec aliam curationem desiderat neruorum distentio, quae saepe vulneribus superuenire solet, et plerumque vehementiores dolores sequitur. Vbi vero ex magna sanguinis profusione oritur, ut plurimum ultima ventum est; si tamen curationi locus tem-que datur, non alia, quam, quae supra retuli (418), efficiunt. Si quando autem homo conuellitur, et ium ex cerebro male adfecto proficiscitur, illud, si id patitur, excisa protinus caluaria, tolli debet. um profunt, imo quandoque valde nocent, medimenta, quae aduersus neruorum distentionem a nullis extolluntur.

A dolore nimio, ab inflammatione nimia, vulneribus accidente saepe fiunt morbi neruorum, praecipue spastici. Sed et sine his, ceu causis, eadem symptomata in vulneratis fiunt: Praecipua sunt, vigiliae pertinaces, ingens imbecillitas, animus deiectus, deliria, dolores colici, vomitiones, aluus obstructa, constrictio et anxietas praecordiorum et inquietudo summa, difficultas respirandi, palpitatio cordis, pulsus exiguus, deglutitio laesa, frigus extremorum, motus artuum conuulsiui, trismus seu inferioris maxillae insuperabilis adductio, tetanus, emprosthotonus, opisthotonus, sphincteris vesicae vrinariae spasmus et inde orta retentio

retentio vrinae et alia. Fiunt quidem praecipue a vulneribus vel punctim illatis, vel cum aliqua partium vexatione atque contusione complicatis, a vulneribus sclopetorum, iis, quae virus habent, atque in hominibus singulari nervorum sensibilitate et mobilitate conspicuis. Praeterea homines in calidioribus telluris regionibus, maxineque sinu humidioribus et paludosis commorantes, nautae in nauibus per maria vectis, magis et saepius ita male afficiuntur; non illi, quibus vel ante vulnerationem prauitas humorum erat, aut qui post vulnus putrida labe quadam afficiuntur, aut quibus verminosa colluies est, aut multa acria in naturali alimentario. Multum etiam facit aer gelidus, perspiratio suppressa, animi affectus vehementior, abusus caliditientium, aer in conclauius corruptus, aestus externi, mala vulneris curatio, vid. caput A. praecedens. Non tamen accidit, ut causa atque ratio symptomatum gravium morum detegi nequeat. Nihilominus tamen, immo vero diligentius omnia perscrutanda sunt, tum vulnus eiusque curatio, tum causae in rebus non naturalibus reperiunda, ut tolli possint et remoueri. Id vero commune videtur omnibus, quod scilicet semper aliqua causa nervos quomodocunque titillans seu irritans nervum quemcunque afficiat sine cum specie doloris aut sine eo, immo sine sensu quodam insolito, de quo vulneratus conquereretur. Historia autem symptomatum a verminosa colluie commotorum satis docet, symptomata spastica a stimulo verminum ab aegrotantibus saepe haud percepto concitari posse. de prognosi dicendum est, fateri debemus, vulnera multo saepius ab illis symptomatibus, maximeque a tristicis et tetanicis affectionibus extinguuntur; quod et priscis temporibus accidisse HIPPOCRATES pluribus locis docet.

Curatio autem vel parti affectae adhibetur, vel uniuerso corpori. Illa fit diuersa ratione. Vulnus punctim factum ampliari debet; aponeuroses dissecandae sunt ampliter versus plures quidem regiones; quicquid alieni in vulnere est, itemque ossium fractorum fragmenta aut exstantia carnes pungentia spicula remoueantur; acria extergeantur, eluanturque; praeterea vnguenta emollientia simulque balsamica danda sunt in vulnus, et id postea cataplasmatibus mollientibus et paregoricis ex herba hyoscyami, cicutae oleo hyoscyami paratis contegendum; partes praetere vicinae oleis vnguentisque inungendae, foris calido, refovente, molliente, fouendae. Uniuersum autem corpus per re nata curatur sanguinis missione, expurgatione cantuarii alimentarii, si causa quidem aliqua in eo haerere videtur balneis calidis, spinae dorsi inunctione ex oleosis; vesiculis, emulsione camphorata, moscho, salibus alcali volatilibus, exiguis dosibus emeticorum, opio paulo a-

daci

dacius quarta vel sexta quaque hora dato, cui, si qua putridi humorum status est, addi debet cortex chinae. Opus quoque est enematis variis quidem, modo stimulantibus, modo antispasmodicis et anodynis; et si homo nil deglutire potest, quicquid alias ore sumendum est, specie clysmatum adhibetur. Quodsi vero ista omnia frustra adhiberi videantur, pars vero vulneratâ minor fuerit, qua homo facile careat, tanquam digitus manus pedisue, plerumque eius resectio sanat, nisi sola, certe subiuncto opio, etiamsi id ante resectionem datum nihil profuerat. Varia machinamenta illa, proposita vulgo et excogitata ad maxillam vi deprimendam, vana sunt. De trismo autem et tetanicis affectionibus legi meretur HILLARY, medici Britannii liber De Tempestatibus et Morbis in Insula Barbados lingua britannica scriptus; teutonice etiam versus et inscriptus: WILHELM HILLARY *Beobachtungen über die Veränderungen der Luft und die Krankheiten auf der Insel Barbados etc., übersetzt von I. C. G. Ackermann, Leipzig 1776*, prae aliis vero euoluatur IOH. IACOB. PLENK liber supra iam laudatus. Collegit enim aliorum observationes, suasque adiecit.

TENDINIS SVTVRA.

§. 456.

Tendo, qui praecisus est, si orae non nimis inter se recedunt, sed commode in vnum attrahi possunt, retinatur. Vbi vero tendinis disiecti orae, mediante acia, commode adduci nequeunt, is, si nihil praeterea mali accessit, et ille nec collisus est, nec ex eo aliquidquam derafum, vel detritum, sui debet. Orae tamen satis et ita iungendae sunt, ut illae inter se ex se contingant. Nam semper aliquid ex iis sub reliqua curatione abscedit. Comprehendi futura non sum tendo, sed etiam cutis, debet, quam alii, qui non sic lino deuincire nolunt, prius incidunt. Coniungitur vero vnum filum in duas acus ad hanc futuram aptas. Eae enim, quae incuruae sunt, et non latae, sed valde tenuatae, non in latere aciem habent, sed habent acutam, tum partem gibbam, tum excauatam*.

P 3

Acus

Acus ab interiori tendinis laesi parte in exteriorem immitti debet, et prius futura comprehendi superiora, quae a carne dependet. Vtrinque vero aliqui ex tendine futura includendum est, vt ea valentius haereat, et ne ora filo rumpatur. Vbi prior acus traiecta fuit, eodem modo per inferiorem oram altera acus, quae idem linum trahit, ab interiore parte immittenda est. Linum vero adducitur et eius capita super splenium ex panno serico cerato in nodum neuntur, id quod facilius fieri potest, si et membrum quantum fieri potest, inclinatur, et tendo, praecipue a parte, quae a carne venit, comprimitur.

* Vid. GARENGEOT *des Instruments* p. 206. Fig. 4.

§. 457.

Alii futuram, mediante vna acu duo fila ducentia faciunt. Filorum fines sic in nodum connectunt, ansa fiat. Post acum etiam, et quidem in altera ora ab exteriori in interiorem, in altera ab interiori in exteriorem, traiciunt. In illam, quam dixi, ansulam panniculum ex panno serico incerato coniiciunt, deinceps in altera ora lina inter se iuncta diuidunt, et etiam, postquam orae adductae sunt, super similem panniculum adstringunt.

§. 458.

Raro opus est illo ferramento, de quo alias (37) retuli, cum acus plerumque facile sequantur. Illi vero, dum traiciuntur, excipi possunt alio ferramento, quod cannulae incisae figuram habet *. Melius vero acus traiectatae excipiuntur digitis. Si plures tendines secti sunt, crebrior etiam futura iniicienda est.

* Vid. GARENGEOT *des Instr.* p. 223.

§. 459.

Vulneri superdatur balsamum Peruvianum, quod spiritus vini exceperit, balsamum de Mecha, essentia su-

ccini cum oleo terebinthinae, vel, quod fere optimum est, inspergitur terebinthina cocta. Brachio ro adhibenda sunt fomenta, quae maxime aduersus inflammationem possunt. Valde necessaria est quies, are brachium canaliculo continendum est, qui ex mina ferrea ita accommodari debet, vt, ex ceruice pensus, partem anteriorem, quae digitis subiicitur, tiorrem, ast mobilem, habeat, quo ii multum extendet in posteriorem partem fere inclinari possint. canaliculus enim, in quo foramina sunt, loris suis ad chium deligatur *. Quamprimum tendinis orae tinatae sunt, canaliculi anterior pars reclinatur, iti pedetentim flectuntur, sutusque tendo iterum lucitur ac elongatur. Si tendo in pede sutus est, embrum continetur in cistula, quae ossibus fractis commodata est, de qua infra dicendum.

Vid. GARENGEOT l. c. T. II. p. 299.

§. 460.

Tendinem etiam Achillis, qui in corpore ex maximis, huic curationi opportunum esse, quorundam observationibus compertum habemus *. Vbi vero hic do sine vulnere rumpitur, is, mediante fascia, attriti et sic glutinari debet **.

Vid. de futura, a GVIL. COWPERO administrata, Transact. Angl. No. 252. p. 153. et in LOWTHORPS Compendio T. III. p. 298. Tab. V. fig. 73. Conf. GARENGEOT *des Operat.* T. III. p. 267. Illam iam olim in sectis cadaueribus observauerat VELSINGIVS in Obs. XV. p. 89.

* Hunc tendinem rumpi posse, si homo valenter adductos musculos gastrocnemios atque solares praecipiti saltu repente deprimit, probauerat PETITVS *des Maladies des Os* T. II. Cap. XV. p. 289. et Comment. H. A. R. Sc. MDCCXXII. p. 68. Res in dubium vocata ab Autore, qui contra PETITVM scripsit: *Dissert. en forme des Lettres au sujet des Ouvrages de l'Auteur du Livre sur les Maladies des Os, Lettre V.* p. 261. Hanc observationem defendit PETITVS in libello, cui titulus: *Lettres de Mr. PETIT ecrites a M. - - Auteur de l'Extrait de libre intitule: Traite*
P 4 des

des Maladies des Os, insere dans le Journal du 8. Mars 17 qui etiam nouo exemplo rem confirmauit in H. A. R. MDCCXXVIII. p. 332. Aliam obseruationem prodidit ADAMVS KVLMS in Dissert. de tendine Achillis rup et arteriis in osseam substantiam degeneratis, Ged MDCCXXX.

† Chirurgia illa tendines dissectos suendi, perspicue et a pliter a PLATNERO proposita, raro sane utilis aut necessaria est. Necessaria non est, si quiete et positu partis laesae idonea deligatione atque aptis fasciis, capita dissecti tendinis ad se mutuo adducuntur et retinentur; inutilis vero est, si aliqua vi opus est, ut capita illa sese contingant. Tum enim irritatio, dolor, inflammatio ita vrgent plerumque, ut futuram factam soluere necesse habeamus.

De ruptura tendinis Achillis atque curatione eius PETITVS in libro de ossium morbis perspicue quidem scriptum, postea vero multo commodior medendi ratio proposita: tum a PETITO, tum ab ALEXANDRO MONRO. Et MONRO quidem ipse tendinem istum habuit diruptum vel fractum, et, cum deligandi fasciandique rationem a Chirurgis adinistratam non ferret, sandalii genus quoddam excogitatum sibi fieri curauit, quo adhibito sine magna molestia capita tendinis coaluerunt. Simile sed perfectius sandali inuenit PETITVS. Monroi morbus et curatio legitur et *Tentaminibus Edinburgicis*, h. e. *Edinb. Physic. and L. Eff. Vol. I. No. 21.* et in ALEX. MONRO *Works*, pag. 68 et in versione teutonica operum Monroi, h. e. ALEXAND. MONRO, *des Aeltern, sämtlichen Werken* etc. pag. 32. Inuentio Petiti memoriae tradita est ab LVDOVICO (Monsieur Louis) in sermone de libro illo PETITI, quem praemissa editioni tertiae eiusdem libri ab se curatae. Librarius tam sermonem illum atque Elogium Petiti a Ludouico inscriptum in gratiam eorum, qui editionem secundam libelli Petiti, a qua tertia illa non differt, possident, seorsum vendit. Emisse neminem poenitebit.

§. 461.

Si tendo scalpelli acie punctus fuit, id quod sanguinem ex incisa vena mittentibus frequenter accidit, protinus imponi debent medicamenta, quae neri ita laesis idonea esse dixi (454). Quo vero auertatur sanguinis aditus a manu ad humerum, iniicienda fascia, cochleae in modum sursum versum serperent. Vbi vero nihilominus inflammatio vulneri superuenit, le

ne digerens in vulnufculum coniiciendum est et per dandum cataplasma ex emollientibus addito loco. Membro vero adhibenda sunt fomenta, quae inflammationis medentur, et sedulo omnia obseruanda, quae de huius temporibus supra retuli.

VVLNERA SCLOPETORVM.

§. 462.

Propria etiam quaedam in vulneribus visenda sunt, quae per glandes plumbeas et alia inferuntur, quae sic dictis bombardis ac tormentis, mediante pyro puluere, iaciuntur. Haec vulnera enim grauissima sunt et valde collisa. Nam oram habent, in qua carnes atque aliae partes, quas glans illa penetrauit, per se conuassatae et emortuae sunt.

Per glandes plumbeas aliaque, quae ex sic dictis tormentis mittuntur, non semper vulnera fiunt, sed subinde colliduntur et quassantur sine his variae fedes ipsaque ossa. De his vide, ubi de vexatis et fractis dicetur.

§. 463.

Colliduntur haec vulnera perniciosissimo glandium puluere rerum ex tormentis missarum motu, non solum glandibus, si traiciuntur, aduruntur. Olim enim opinionem habuerunt glandes accenso puluere subito calidas fieri et igneas.

Vid. PARAEVS L. X. p. 330.

PLATNERVS nihil dixit de noxa illa, quam non pauci chirurgorum attribuunt aeri a glandibus maioribus perniciosissimo motu prouolutis compresso atque partes humani corporis male afficienti, etiamsi glandes ipsae partes eas non attingant; *Luft-Streif-Schüsse* vocant Germanorum chirurgi. Omisit autem PLATNERVS haud dubie propterea, quoniam opinioni huic nihil tribuit. Nam non nudius tertius demum de ea ratione innotuit. De re dubia prolixè agere non decet scriptorem libri generis compendiarii. Agentium partibus se addixit IOS. JACOB. PLENK in libro saepius iam

laudato. Effectum, autem non tam a compresso quam scintilla vel flumine electrico deriuandum esse p

§. 464.

Quia vero tanta vi tantaque pernecitate glanferuntur, valentius commouentur omnes partes, bus illae illiduntur. Hoc si locis neruosis incgrauissima symptomata, stupor, torpor, mox acutus dolor, syncope, neruorum distentio, inflammangraena, sequuntur. Nec parum confert a perturbatio et terror, quo ictus homo plerumque cussus est.

§. 465.

Ex his vulneribus, nisi maior, vel arteria, vel fuerit dilacerata, nullus, vel paucus, sanguis exit. enim crusta, quae ex collisis emortuisque carni enascitur, vasorum ora praecludit.

§. 466.

Vbi glans plumbea corpus, vel membrum, perpit, vulnus ea parte, qua glans venit, paulo depressum est, magis collisum, et cum maiori ecchymosi, astus. Nam in parte aduersa, in quam glans tetens vulnus magis diductum est.

§. 467.

Quaedam tamen discrimina recipiunt vulnera ea re, qua illa fuere illata. Non parum enim configura. Glans plumbea, quae rotunda est, si qupartem perumpit, minus laedit, quam glans incvel aliud ferramentum angulosum, scabrum et asperquo omnia lacerantur atque dilaniantur. Parumfert, ex quo metallo sint glandes, nisi in corpore requantur. Tunc enim minus offendit glans plumquam aenea, vel quae ex argento, quod mult aeris habet, conflata est.

§. 468.

Non vero solae glandes perrumpunt, sed cum his
e intus feruntur alia quaedam, ex vestibulis laci-
; numini, aliaque, quae illae secum arripiunt. Haec
e in vulnera demersa intus valentius insident,
e retenta magnam inflammationem aliaque sym-
mata mouent.

§. 469.

Haec vulnera solent esse cum magno tumore et
ta ἐκχυμώσει. Sanguis enim ex ruptis vasis effer-
quem vero ex vulnere exire illa crusta prohibet.
maiori vero ecchymosi maior gangraenae timor est.
utem supra vulnus repente maior tumor fit, longe
or metus esse potest, quia is plerumque neruum
nerueam partem grauiter laesam esse significat.
infra vulnus membrum intumescit, venas obstructas
intelligitur.

§. 470.

Si partes neruosae percussae sunt, aeger vero non
cuto dolore, sed de sensu obscuro ac torpore con-
tritur, membrum etiam gangraena periclitatur.

§. 471.

Non rarum est, in horum vulnerum curatione,
aliquot dies, et vbi sanguis iam dudum conquie-
e videtur, periculosissimam et funestam profusio-
i oriri (405). Crusta enim, quae laceratorum va-
um ora praeccludit, vel aucta febre, vel corporis et
mbri motu, vel ipsa etiam suppuratione, quando-
resoluitur. Si igitur fauciatae arteriae nondum
inatae sunt, sanguis cum periculo ruit, qui etiam
cilius, quam in aliis vulneribus, prohiberi potest.

§. 472.

Si in aegro, et praecipue in vulnerato membro,
eter solitum attolluntur mouenturque arteriae,
metu-

metuenda est, vel noua sanguinis profusio, vel graui inflammatio.

§. 473.

Si noua et ingens inflammatio post quartum die ex improviso, et non apparente causa, maiori impetu erumpit, vel aliquid in vulnere relictum est (467) vel laesa est pars neruosa, muscoli tendo, aut aponeurosis, quae res non sine periculo esse solet.

§. 474.

Propter neruosarum partium numerum ganglionumque metum membrum raro seruari potest, si glans plumbea articulum perripit, vel sedem, quae ab articulo propior est.

§. 475.

Quibus glans penitus et ad interiora viscerum intravit, ita, ut haec percussa sint, eos in praecium esse, et raro sanescere, compertum est.

§. 476.

Vbi vero aliquis ictus fuit, qui seruari potest, continuo prospiciendum est, ut glandes et alia, quae, in ictu illata, intus haerent (468), eiiciantur. Ob hoc vero expedit, vulnus latius aperiri, ut glebae, et alia, quae ei insidunt, commodè, quae venerunt, extrahi, vel a chirurgo absque negotio reuelli possint. Aliquando vero commodius est, id, quod superius aperire, eaque, quae inhaerent, eximere. Obseruanda sunt omnia, quae supra (372. 373) praecepi. Incipies et alia ferramenta, quae excutiendis extrahi, et disque plumbeis glandibus adhibentur, cum et in vulnere, si angustiora sunt, vel laniari, vel minimè non parum offendi soleant, saepe parum utilia sunt, nisi illa prius incisa ampliataque fuerint. Praestat, si aliud quid hoc non impedit, vulnus ampli-

vulnus vulneri adiacere, quo locus laxetur, et ea, e inhaerent, detegantur, atque facilius digito, vel ferramentis, excutiantur.

§. 477.

Non vero ob id solum amplianda plaga est, sed etiam propter inflammationis metum. Si enim in his membris sanguinis parum fluxit, quia illa crusta arteriarum venarumque ora praecludit, necessarium est, vulnus et latius aperiatur incidaturque, et ut eius ora concidatur, quo sanguis melius exire possit. Vulnus etiam noua sectione ampliatum longe facilius secat. Ista autem habenda cura est, ne neruus, neque maior, ne arteria laedatur. Nec tendo, nisi id est necessarium, praecidi debet. Musculus vero timidè incidendus est. Atque aponeurosis manuum et transversam, vel obliquam, plagam desiderat.

Musculi non tam incidendi, quam sectione transversa diuidendi, qua sectione prohibetur, ne pus vicinas partes perurpans sinus longe lateque faciat. Statim atque fieri potest, vulnus amplius reddendum est, et vulneri huic nulla medicamenta generis spirituosi proxime imponenda, verum digerentia, ut crusta cito soluatur; vulnere ita habito, vicinae ei partes fomento pro conditione laesionis vario foueri debent, modo roborante, modo molliente et discutiente.

§. 478.

Non raro, vulnera transversa sub cute feruntur. Editissimum est, in haec specillum demitti, super eam incidi. Si vero vulnus transversum longum non prorsus penetrauit, sed intra carnes desit, nihilominus specillo ferroque persequendum est. Pro hoc satis tutum haud videtur, quia vulnus aliter descendit, commodissimum est specillum demitti, vulnus contra huius caput altera parte incidi. Sic et aliena melius excutiantur. Nam, quamuis glans totum membrum perurperit, nihilominus his vulnibus saepe inhaerent lacinae, aliaeque (468), quae peri-

periculofiffimam inflammationem mouere potest. Melius etiam in vulnus medicamenta demitti potest. In id vero, quod transuerfum est, coniici potest linum, quod medicamento illinitur vulneri idoneo, et quotidie ducitur sic, vt vulnus subeat pars, quae prior fuit. Hoc linum non prius adducendum quam soluta inflammatione. Finis vero esse potest, ubi vulnus purgatum est, et glutinari sine metu potest. In quo casu plurimum confert, si media vulneris paulo magis premitur.

† Si linum in vulnera transuersa illa dandum esse iudicet, molle admodum id esse debere, neque implere potest canalem illum, sed quam laxissime sedere facile quod videt. Nam quod durius est, quod prorsus facit, facit, quod corpus alienum quodque, h. e. irritat, dolorem creat et inflammationem.

§. 479.

Interdum tamen vulnus latius aperiri non potest, quia iam maiores arteriae vulneratae sunt et sanguinem fundunt. Eius enim profluuium crusta vincit, id quod periculofiffimum est, quia haec vulnera non ferunt, quo sanguinem optime prohibent supra retuli (406). Si is itaque periculofius est, idque res permittit, arteriae vinciendae sunt. Si vero, quia crusta occuluntur, saepe noua secta prius detegendae sunt, quo melius apprehendi potest. Si vulnera in extremis partibus sunt, haec tutius prelo guntur, si protinus fascia tortilis, vel torcular, nebro iniicitur. Si alia parte in corpore vulnus est, in hac arteria, sanguinem fundit, illa sic, vt in extremis, fascia tortili premi nequit, quare experientia aliud vincturae genus est. Acus incurua maior linum satis valens ducens sub arteria traicitur, et lini caetera super hanc et ipsam cutim inter se adstringuntur. tandiu superior deuincitur arteria, donec illi in vulnere, vel vinciendo, vel alia ratione, prospiceret.

guinem supprimere potuit chirurgus (conf. 251). vero arteria apprehendi et deligari haud potest, ex-
 rienda sunt medicamenta, et quidem ea, quae ad
 pprimendum sanguinem vehementissima sunt (409.
 414). In desperatis enim casibus etiam ad ea prae-
 ia decurrendum, quae quamuis tuta non sint, tamen
 quando proficiunt, cum obscura et tenuis spes
 nper praeferenda sit certae desperationi. Si ex vul-
 re alto et tenui sanguis cum periculo fluit, longe
 timum est, illud latius aperire, et post arteriae ad-
 quere linamenta ex alcohol, vel alio liquore vehe-
 ntiori ad sanguinem supprimendum expressa, eaque
 nisso in vulnus digito tamdiu apprimere, donec
 guis conquieuit.

§. 480.

Ad reliquam vero curationem quod attinet, me-
 ti scire necessarium est, haec vulnera grauiter colli-
 esse, et ideo glutinari non posse, nisi fuerint pur-
 a, id quod medicamentis pus mouentibus fieri
 nstat (343). Cum vero in his vulneribus id, quod
 re est, procedat serpatque, digerentibus adiicienda
 t alia, quibus purulenta curantur. Primo die im-
 enda sunt linamenta pura, quae vero molliter et
 fascia comprehendenda sunt, vt vulnus minime
 tringatur, vel prematur. Inprimis haec optime
 ferunt, vbi vulnus latius apertum, et eius orae ad
 um vsque concisae (476. 477) fuerunt. In hoc
 n casu alienus est spiritus vini, quo plures vtuntur.
 vero, vel propter sanguinis effluentis, vel aliud
 iculum, crusta concisa non fuit, sed integra relicta,
 ultum est, quod putrescere potest, vtendum mox
 nitio medicamentis, quae putre euincunt. Valen-
 mi generis sunt alcohol et alii sic dicti spiritus,
 a vero hi nimium siccant, crustam duram reddunt.
 appurationem cohibent, his praeferri debent le-
 viora.

viora. Inter haec fere primo loco est aqua, sic di-
vulneraria, quam vero minus valentem, vel spiriti-
sam, esse oportet. Alcohol etiam, si illa deficit, p-
est cum aqua misceri et superdari. Vbi autem vul-
multam carnem corruptam habet, et metus est,
id putrescendo intendatur, valentiora reprimentia
liquores spirituosos requirit.

§. 481.

Etiam, vbi sanguinis profusio timetur, illa, q-
humectant et molliunt, et quibus crusta resolui po-
aliena sunt. Itaque et in hoc casu imponi debent
namenta, vel ex alcohol expressa, vel terebinthi
cocta conspersa.

§. 482.

Vulnus, cui nihil aliud, nec sanguinis profu-
nec maior inflammatio, nec dolor, nec febris, acco-
impositis linamentis puris sic per biduum haberi
est, et post demum resolui, atque pus, quod mo-
coepit, extergi. Illinenda hoc tempore impone-
que, atque in altiora vulnera demittenda sunt m-
camenta, quae concoquunt et pus mouent (38-
394). Si vero orae putrescere videntur, et vit-
serpere, his adiicienda sunt valentiora, quae adue-
gangraenam vtilia esse supra retuli (192 ad 197),
non alia, quibus crusta putris resolvitur (198 ad 200).
His, si vulnus purgatum est, illud debet impleri
tandem glutinari, quae res non aliam curatio-
postulat, quam, qualem aliis vulneribus adhiben-
esse proposui. Haec vulnera alia esse in carn-
neruosis, aliisque sedibus, in corpore raro, vel
stricto, hieme et vere, in loco salubri, vel gr-
compertum est, quibus omnibus accommodanda
curatio.

§. 483.

Saepe accidit, vt a retenta mala materia, et, si nec sibi in tunica cellulosa, quae sub cute et inter uculos est, viam fecit, noua oriatur inflammatio. hoc casu expeditissimum est, in hunc sinum demittere specillum et super id cutim incidere, vel, si is lon- or est, altera parte ad specilli caput cutim incidere. c enim auertitur inflammatio, et vulnus citius nescit. Vbi longior sinus altera parte incisus est, is aiecto lino purgari potest, et glutinari impositis nnis et paulo adstrictiori fascia (478).

§. 484.

Si glandis plumbeae ictu os aliquod totum perfra- um est, raro membrum seruari potest, cum plurima gmenta, eaque saepe acuta, ex fracto osse recedant, ibus, velut aculeis, periostrum carnesque ita vexan- ; vt magna moueatur inflammatio. Et, si etiam ec solui potuisset, aeger nihilominus ex magna, ae inflammationem sequi solet, suppuratione peri- caretur (87). Itaque, si vehemens vulnus et os ta ipsum articulum ictum est, ossisque collisi gmenta plura sunt, eaque multum inter se recesser- nt, membrum praecidi fere necesse est. Hoc enim otinus fieri debet, antequam inflammatio, et ex hac ris incitatur. Non vero illud os, quod ictum est, ecidi debet, sed alterum os, quod supra articulum, sanum est. Nam timor esse potest, ne tendinibus ligamentis sub articulo grauiter percussis magna erueniat inflammatio, ex qua plura maioraque peri- a enascuntur. Nonnunquam etiam os ad articu- i vsque finditur, et vel ob id seruari nequit. Huius notae sunt, si periostrum alia parte, quam, qua um os ictum fuit, inflammatur. Pauca vero frag- ta, si ab osse recesserunt et eminent, in suas sedes

Q

repe-

reponenda sunt. Si vero paruula fragmenta requeunt, illaque nudata sunt, necesse est ea, si membranis dependent, abscindere. Nam, quia illi periostio haerent, ea abrumpere et vi diducere, periculosum foret. Quae abscindi nequeunt, emoriuntur, et resolutis per medicamenta membranis perexcident. Vbi maiora fragmenta eminent, quae condi nequeunt, illa ferrula, vel forcipe, praecident. Si vero membrum ictum osque fractum integra manente cute, curatio eadem est, quae, os alia ratione fractum fuit. Si enim fragmenta cute eminent, quae carnes vulnerant, id quod ex dolore et punctiōibus cognoscitur, illa iterum in suam sedem dari oportet. Nam, si hoc fieri potest, necesse est non est carnes contra incidi, saepe vero necesse est, ut concidatur vexata collisaeque cutis, quo quod scens corruptusque sanguis exire possit, ne extrinsecus moueatur inflammatio. Periostium, si alienatum, inflammatum est, protinus etiam concidendum est. Inflammatio pus alat. Caetera, quae agenda sunt, ponam, ubi de ossium morbis dicetur.

Vid. LE DRAN *Traité des playes d'armes à feu.*

ARTICVLORVM VVLNERA.

§. 485.

Vulnera etiam mala esse, si mucro ensis, vel telii, usque ad articulum defecit, vel, si hunc articulū plumbea perrupit, iam alias retuli (357. 474). Illi articulum enim faciunt, et magnus tendinum numerus, ligamenta, glandulae mucum in articulum secernunt, et ipse humor, qui, tum ex his glandulis, tum e gementis, in articulum defluit. Crebrius etiam et horum apophyses atque epiphyfes franguntur. graue atque collisum vulnus est, magnisque peri-

expositum, membrum, antequam id per inflammationem intumuit, praecidi necesse est (474. 484). Difficillimam etiam curationem habent vulnera, quamvis minora, si penitus in articulum penetrauerunt, cum haec vulnera ampliari haud commode possint. Fere tolerabilia sunt maiora, latiora, et ex quibus etiam notabilis ligamentorum pars abscissa, vel telo atque gladio lacerata fuit *. Tutissimum omnium vulnus, quod in summa parte est, et per illud ligamentum, quo articulus continetur, *capsulare* vocant, non penetrauit.

* LE DRAN *des playes d'armes à feu* p. 199.

§. 486.

Ex his vero vulneribus, praeterquam quod in iis maiores dolores inflammationesque maturius excitantur, humor effertur crassior, glutinosior et subalbidus, nelli que albo subsimilis, *μελίκηρα*, vel synovia, dictus (357). Is vero humor vulnera sanari prohibet et difficiliter supprimitur. Tandem, dum ille sic diu fertur, etustas vlcus occupat, cui, si callus inducitur, ad stulam transitus esse consuevit. Si etiam vulnus sanari potuit, manet plerumque articulus cicatrice contractus, ita, ut membrum extendi atque contrahi haud possit.

§. 487.

Si igitur, articulo percusso, spes est, membrum sanari posse, plaga, quantum res permittit, incidenda est, et, si ecchymosis est, vulneris orae concidentibus sunt, quo humori exitus detur (477). Membro adhibenda sunt fomenta, quae aduersus inflammationem maxime possunt. Vulneri vero imponenda essentia balsamica, ita, ut haec plurimum succini habeat, (487), essentia gummi elemi, mastichis. His vulneribus inimica sunt digerentia, quibus omnia, quae

intus in ligamento sunt, laxantur, ita, ut ille humor (486) copiosior efferatur. Nocent fomenta humidiora vel nimis mollientia, si extrinsecus articulo superdantur. Aliena quoque sunt acria. Oportet autem praecipue in his articulorum curationibus, vitare calorem et frigus, quibus vel maxime eorum vulnera infestari solent. Nec medicamenta, quae vel vulneri imponuntur, nec ea, quae super id deligantur, alioquin esse, conuenit, quam calida.

† Vulnera articulorum, ut aliarum partium, sunt vel cum insigni vexatione et contusione vel sine his illata. Illa fecerunt ea ratione, quam Auctor noster praecepit, curantur. Illi autem, vel caesim, vel punctim ita factis, ut ligamentum capsulare dissectum sit, vel perpunctum, scire licet, posse plerumque ita haud difficulter sanari, dummodo mature et cum adhibeatur curatio ea, qua et aeris ingressus in cauum articuli cohibetur, et futura inflammatio aueritur. Aerem a cauo articulo arcemus vulnus emplastris contrahentibus linteis carptis aliisque contegendo. Inflammatio vero nondum effecta sed futura aueritur reprimentibus admodum et articulo et vicinis partibus. Quo facit assidua applicatio frigidae aquae, statim, atque lintea calore corporis calefacta renouanda. Vulnus vero sero demum retegatur.

VVLNERA, QVAE VIRVS HABENT.

§. 488.

Vehementissima vulnera sunt, per quae virus quoddam, quod iis inhaeret, corporibus inseritur, celerius per haec diffunditur. Aliquando enim hominem telum venenatum percussit, aliquando eum viperam, serpens, vel rabidum animal, momordit, aliquando is a scorpione ictus est, quae omnia vel maxime terrere possunt, et non nimium distantem curationem desiderant. Accidere etiam potest, ut vulnus in quo nihil virulenti est, quaedam imponantur, quae naturam veneni habent.

§. 489.

§. 489.

Solet autem fere frequentius euenire, vt hominem vipera percutiat. Hoc animalis genus virus, quod in peculiari glandula secretum in aliquo receptaculo reconditum haeret, per dentes excauatos in os, tempore exprimit, quo animal iisdem dentibus aliquid corripit.

* Rerum naturalium inuestigatores probant, hunc succum, qui plurimis aliis animalibus exitialis est, his necessarium esse. Viperas enim docent, aliis animalibus, iisque pro modo eorum maioribus, ali ac sustineri, haec morfu correpta celerius veneno debilitari et extinguere, quae alias vel luctando vel fugiendo se eripere possent. Quia etiam viperae serpentesque ea, quae deglutiunt, non prius mandunt et extenuant, hunc cibum veneno imbutum celerius in illorum visceribus emolliri atque solui, vt melius per vniuersum corpus diuidi possit. Vid. MEAD de venenis p. 6. Succum illum innocentem esse, existimauit CHARRAS, in nouis de vipera experimentis, qui venenum in efferatis spiritibus huius animalis quaerendum esse censuit, sed hanc sententiam nouis experimentis confutauit FRANCISCUS REDI in *Osservazione, & in Lettera sopra alcune Opposizioni fatte alle sue osservazioni intorno alle vipere*. Conf. ANTONII VALLISNERI *Osservazioni varii* No. 42. in Opp. T. III. p. 229.

§. 490.

Scorpio in extrema cauda aculeum habet intus unum vtrinque e latere perforatum, ex quo etiam venatus succus in vulnera isto aculeo impressa stillat.

Vide varia experimenta cum scorpionibus facta et hunc aculeum delineatum in H. A. R. Sc. MDCCXXXI. p. 318.

§. 491.

Raro apud nos chirurgi operam desiderant vulnere per alia animalia, terribiles angues etiam, insecta, pori ictu morfuque illata, Nam ea nostrae terrae peregrina sunt, quae aestuosis locis gignuntur, vel tam vim nocendi non habent. Rarior etiam, nisi per barbaros, telorum venenatorum usus esse solet.

§. 492.

Hominem autem, qui vulnus, quod virus habet accepit, praecipue, quem vipera percussit, mox pallor decolorat, color vero, qui ab initio pallidus est, mox in luteum, et eum mutatur, quem habent, qui morbi regio aegri sunt. Arteriae protinus languescunt earum pulsus fiunt debiles, inaequales, saepe intermittentes. Homo inhorret, partes membrorum extremarum inalgescunt, totumque corpus sudore frigido manat. Crebrius linquente animo, tandem supervenire solet nervorum distentio. Cum his omnibus etiam alius, quae vehementius fluit, et crebrior vomitus aegrum fatigant. Alii, ardentibus siti faucibus horrore intremiscunt, inexpugnabili dormiendi necessitate urgentur, tandemque convulsi, repente strangulantur.

Vid. CHARRAS l. c. p. 155. *Description des Isles d'Amerique* par le P. LABAT T. I. Cap. VII. p. 161. confer the *Philosophical Transactions* Vol. XXXIX. No. 433. p. 513.

§. 493.

Quo magis vero ira et rabie percitum fuit animus, quod ictu laesit, eo vehementius vulnus esse confisum videtur. In propinquum etiam et extremum fere discrimen adducitur homo, cui heruus, vel tendo, percussus est. Minus vero laedit animal, quod iam a se quoties momordit, et maiorem illius succi partem expressit.

§. 494.

Illud vero ignorari non oportet, omnia venena non semper, nec omnibus hominibus, nocere. Aliquando enim sine noxa et viperarum serpentisque morsu morderunt. Raro virulentus est scorpionis ictus, non rabidi animalis morsum semper hydrophobia sequitur. Haec enim res plures decepisse videtur, qui varii generis

nei

eris vanisque medicamentis et aliis auxiliis, quibus his casibus vsi sunt, multum tribuerunt, et plures, si ex inani persuasione eandem curandi rationem inefficiunt, deceperunt. Saepe enim sibi aliisque persuaserunt, se medicamentis adiutos fuisse, qui et sine his incorrupta sanitate fuissent.

* Vid. H. A. R. Sc. c. l.

§. 495.

Festinantius agere oportet chirurgum, qui his titulari debet. Vbi igitur quis ictus morsusque fuit, pedis, protinus et sine mora digitum, vel aliud membrum, supra vulnus, lino adstrictiori deligari, non tamen nimium, ne torpeat, vel gangraena peritetur: Post vero vulnus crebrioribus et altioribus agis concidi, quo plurimum cruoris effluat, et virus post haec extrahi.

§. 496.

Ad id vero homo adhiberi potest, qui vulnus exeat, quod sine summo discrimine fieri nequit. Nam enim oportet os sanum, nullumque in gingivis, palato, aliaue parte oris, vlceri habere. Virus enim non gustu, sed in vulnere nocet *. Vbi nemo hanc daciā habet, ut vulnus exfugat, cucurbitula adpoueri, et mediante hac, venenum cum sanguine excidendo vulnere extrahi potest. Si vero locus cucurbitulae opportunus haud est, expedit, vulnus, demisso illud candente ferramento, vehementius adurere, et post crustam, impositis medicamentis, quae digerunt, soluere, diu etiam vlceri superdare, quae pus mouent, illudque iterum adurere, vel scalpello exasperare. Nam plagam diutius patere necesse est.

* Inter veteres Psylli, Lybiae, et Marfi, Italiae populi, hominibus serpente ictis vulnus exfugendo mederi soliti sunt, qui, sibi hoc gentilitium esse, aliis persuaserunt. Sed de his recte iudicat CELSVS L. V. cap. 27. eos non praecipuam

scientiam habuisse, sed audaciam usu ipso confirmata. Vide de his PLINIVM L. VII. C. 2. p. 371. A. GELLIVS L. XVI. C. XI. In Hellesponto circa Parium fuerunt *ὀφιογενεῖς*, de quibus opinio erat, eos serpentium ictus co tactu leuare, et manu imposita venena extrahere pot. Vide STRABONEM L. XIII. p. 830. PLINIVM. l. c.

§. 497.

Vbi vero vulnus non adustum, sed concisum fuit illud eluendum est aqua, quae salem, nitrum et theriacam excepit, post vero imponenda sunt medicamenta quae molliunt et pus mouent (91. 92), malamque materiam euocant. Ad hoc idonea sunt cataplasma ex farina cum lacte cocta, additis caricis pinguibus fermentoque panis. Vulnus non, nisi post longa suppurationem, glutinari debet, membro autem interea adhiberi fomenta, quae aduersus inflammationem valentiora sunt.

§. 498.

Medicamenta autem dari debent cardiaca et alexipharmaca, quorum salubris effectus est, si sudores per omne corpus diffundunt. Quare necesse est, si aeger, stragulis bene opertus, se contineat, et, vti sudor omnis finitus est, ut linteo tepesacto omnia sunt membra detergat. Vulneri, quod vipera fecit, praecipuum medicamentum esse dicitur sal viperae, cui drachma ex iusculo calido sumitur. Theriaca, antidotum Mithridatis, aliaque, quae corpus aduersus venenorum pericula tutum reddere vulgo creduntur, saepe fallere solent, nec aliis, quae vulgo laudantur, antidotis fides habenda est, quibus, cum a circulatoribus extollantur, vulgus suam credulitatem addicere haud veretur.

§. 499.

Haud ita pridem tamen aduersus viperarum morsus antidotum inuentum esse dicitur, cuius virtutem cur

um ea claris experimentis cognita probataque videatur, vix omnis fides deroganda est. Homo enim, qui bi ipsi viperam ad digitum admouit, huius morfu ita vulneratus fuit, vt de vulnere sanguis stillauerit. Ictus homo acerbum acutumque in brachio dolorem sensit, et mox omnia ea passus est, quae vipera morfis accipere solent. Oculorum fuit frequens motus et deliratio, in pectore atque praecordiis dolor et anxietas, spirandi difficultas, animi defectio, sudor frigidus. Reui post abdomen intumuit, in eo tormina et in umbis vehementior dolor, ac cum his crebrior vomitus atque deiectio, fuerunt. Inter haec oculi caligauerunt et conuulsi sunt ita, vt aegro omnia, quae eius conspectui exposita erant, duplicata viderentur. Tandem post vnus et quadrantis horae spatium totum brachium oleo oliuarum super ignitabulum perunctum et bene manibus pertractatum fuit, ex quo et dolor, et reliqua, de quibus conquestus est aeger, se remiserunt, qui, somno oppressus, ad alterum diem arcte et rauiter dormiuit atque conualuit *. Nouo etiam experimento, Dresdae facto, huius antidoti salubritas comprobata fuit **.

* Haec experimenta coram fociis Regiae Britannicae societatis Anno MDCCXXXIV. d. 1. Iulii facta sunt. Vid. *the Philosophical Transactions* Vol. XXXIX. l. f. c.

** Vid. Cel. ABR. VATERI Diss. de Antidoto nouo aduersus viperarum morsum praesentissimo in Anglia haud ita pridem detecto, W. MDCCXXXVI.

§. 500.

Ex morfu animalis rabiosi sequitur aquae timor, *ῥαβδία* Graeci appellant. In hoc simul homo et ti et aquae metu cruciatur, qui ipse in rabiem effectus tandem graui et misera morte extinguitur. Virus hoc, si corpori infusum est, non statim tetros hos cruciatus ciēt; sed saepe per longum satis tempus ei

sine noxa insidet et quasi compressum est. Tandem improviso dirum illud valetudinis genus aduenit atque ita increscit, ut aegrum intra paucos dies rapiat. Non solo vero morfu nocent animalia rabida, sed, cum sanguis et omnis eorum humor, praecipue autem salivae, hoc veneno infecta sit, homo etiam sanissimus in hunc morbum praecipitatur, si eius humoribus, praecipue salivae et sanguini, vel minima pars corrupta succi admiscetur.

Canem ex deuorato sanguine hominis hydrophobia laborantem rabiosum factum esse, testatur LEMERY in H. A. R. S. Anno MDCCVII. p. 31.

† Hydrophobiam facit non solum morsus rabidi animalis sed et vehementissima ira perciti. Fit vero etiam si morsu. Oscula cani rabido impacta, parum salivae adhaerentis filo e lino, concubitus cum marito hydrophobiam affecto eam aliquando peperit. Legatur H. BOERHAAVIUS eiusque commentator SWIETENIVS. Hydrophobia dicitur quoque orta sponte in morbis acutis absque ulla suspitione praegressae infectionis. Sed haec iam ad nos haud pertinent. Virus, quod morsus intulit, haerere in salivae animalis multis videtur quidem; verum si salivam a sanguine secerni cogites, fontem purum esse non posse cogitabis cuius riuulus impurus est. Virus autem morsu communicatum cum corpore, modo ocysus modo serius a loco infecto in reliquum corpus transit. Vulnus illatum interdum cito et sic satis feliciter curari videtur, verum infans admodum curatione et infauitissima. Cicatrix eminenti est; homo nullum dolorem quidem in eo loco percipit, alienum tamen quendam sensum in eo esse fatetur. Atque ita se habere locus potest affectus per hebdomades aliquot. Quod si vero virus haecenus quiescens in actum deducitur locus admorsus seu ubi cicatrix ea est, pruritu afficitur quo facto haud procul abest aquae timor. Praegreditur enim tamen plerumque amor solitudinis, anxietas et inquietudo, tristitia, somnus valde interruptus, insomniis turbatus: Quod dici potest secundum tempus stadium morbi; illud ubi symptomata haec nondum arripuerunt, primum dicendum. At secundum modum tardius modo vel ocysus excipitur tertio, in quo deglutit liquidorum difficilis valde, breui post impossibilis cum tanto horrore aduersus omne fluidum, ut neque aspectu neque sonum effusorum et cadentium liquidorum horrore ferat. Plerumque tamen sicca per fauces detrudere illud potest.

potest. Quidam delirio et furore afficiuntur, alii mentis compotes sunt. Nonnulli febricitant. Plerique moriuntur conuulsi.

§. 501.

Ex variis vero occasionibus rabies animantibus nire potest. Si ea, et praecipue canes catenis vincti, grantissimo aestu et apricatione torrentur. Si his potui dantur aquae graues et putres, fordibus ac veribus scatentes. Si, denegato potu, diutius atque dentius sitiunt. Si aluntur putribus carnibus ossisque, lardo rancido. Si ex his et aliis causis veres in renibus aliisque visceribus nascuntur.

† Cum ex morfu animalis rabidi, homo in summum discrimen adducatur, nisi cito medicina paretur, eaque efficax et quodam modo crudelis, multum interest, nosse notas rabiei, ne aut homo non recte curatus morbo plerumque lethali afficiatur, aut sine necessitate medela efficacior adhibeatur, atque sic et animus terrore, corpus dolore non necessario male plectatur. Notae autem rabiei canum aut probabiles aut certae sunt. Ille canis putatur rabidus, cui oculi conuiuendo aperiuntur lacrymosi, cui spuma ante os est, cauda et aures demissae, qui ebrii instar incedendo vacillat, vocem raucam edit, huc illuc discurret, quem canes alii fugiunt, qui a cibo et potu abhorret, et canes et homines praeter consuetudinem mordet, herum suum, quem antea amore prosequabatur, dentibus petit. Certior est, si causa fitis est, canis tamen aquam appositam fugit: certissima, si animalia hominesque admorsi hydrophobiam contraxerunt.

§. 502.

Si vero in hominem labes data fuit, et ex ea iam orbus venit, ille incipit ab insueto molestoque dolore ius membri, quod morfu laesum fuerat. Cum his inaequordia dolent atque intenta sunt, aeger somno tra debitum vrgetur, qui torpor soporque interdium octuque continuat. Mens vero falsis et mendacis visis lymphaticisque somniis concitatur. Aeger, si mens consistit, difficulter fert morbum, summa animi aegritudine premitur et angoribus excruciat, neq

nec sine difficultate et anhelatione spirare potest. V morbus increfcit, oritur aquae omniumque fluidorum metus, adeo, vt si oculi aquae splendore, auresque eius motu et strepitu, vel parum adficiuntur, hominu conuellatur. Interea fauces vrit anhelofa fitis, quae propter illam ὕδρφοβίαν, nulla potione leuare vel extinguere potest. Vomit multa biliofa, genita membrum tentigine laborat, et mens vanas imaginum accipit, infania tamen fe per momenta temporis remittit. Tandem autem is violentius fe gerit, furor mordet, linguam tumidam, nimia ficcitate arida, fiffam, ex ore exferit, defluentem faluam deuorat. nequit, fi loquitur, vox nihil fignificat. Sub finem poft frequentem neruorum diftentionem fpiritus fiffidus vix trahitur, et prorfus intercluditur, atque aeger ftrangulatus quarto circiter die extinguitur.

§. 503.

In corporibus poft obitum incifis fauces inflammatae, ventriculus biliofis glutinofisque plenus, fiff copiofum et atrum, et vifcera omnia quafi arida repleta fuere. Sanguis vero in toto corpore tenuis fuit, qui nec frigore cogi potuit *.

* Vid. H. A. R. Sc. MDCXCIX. p. 55. Negat tamen ROYER FINCCIVS, in incifis cadaueribus fauces inflammatas inuenire. Vid. eius Diff. Anat. L. I. C. XIII. p. 179.

† Initio faltem hydrophobiae figna inflammatarum faucium nulla animaduertuntur, neque notae febdis inflammatoria. Neque corporum eo morbo ex tinctorum diffectiones medicofatis erudiunt de morbi huius natura. Phaenomena enim non eadem in omnibus in fecantium fenfus incurrunt. Verifimile autem eft, naturam eius morbi effe fpafmodici generis; fpafmis vero neruorum fyftema tum demum afficitur cum veneni reforptio et humorum infectio effecta funt.

§. 504.

Omnibus hoc morbo oppreffis fpes in angufto efferta vero desperatio, fi is praefens inualuit. Malum

vehementius, eoque certius, periculum adfert, eo efferationi rabie agitata fuit animal, quod mor-
dit. Multum ad haec conferre anni tempus, tatem, corporis habitum, victum et alia, iam alio-
ties posui.

† Hydrophobiae iam ortae curationum exempla, satis certa, aut nulla, aut paucissima habemus. Principiis igitur obsta, sero medicina paratur.

§. 505.

Si vulnus tale curandum accipit chirurgus, festi-
tius omnia agere debet, quae de aliis venenatis
lneribus (495. 496. 497) praecepi; in alienum vero
mortis periculum iniiceretur homo, qui tale vulnus
e exfugere auderet. Sudor eliciendus est, non vero
idis medicamentis, quae in hoc morbo pestifera
nt, sed dato aceto bezoardico et calida aqua. Aeger
o stragulis bene opertus se in lectulo continere,
corpus in balneum non nimium feruens demittere,
bet. Post sudationem non aliena sunt cathartica,
ae supra aduersus inflammationem vtilia proposui
). Neccessaria est abstinentia, victus dandus est
dicus, acidulus. Potioni idonea est, vel frigida
ia, vel ptisana ex hordeo cum succo citri. In al-
n immitti debent lotiones, quae multum salem ni-
mque habent. Vestimenta, quibus salina adpersa
s, protinus abiicienda sunt.

§. 506.

Vetustissimorum autorum experimentis comper-
i est, optimum remedium ad auertendam *ὕδρῳ φο-
v* esse, hominem in mare, vel piscinam, proiicere,
nque modo mersum bibere pati, modo, si habet,
ollere, interdum deprimere, vt inuitus quoque
a satiatur *, quare aquae metus tollitur. Melius
o erit, hominem, non opinantem, in aquam, et-
iam

iam non prouisam, praecipitare. Qui vero sic aqua frigida vexatus fuit, eum post lectuli calore fore oportet.

* CELSVS L. V. G. 27.

† Verum haec medendi ratio multo saepius non respon-
dique soli fides non habenda est.

§. 507.

Si morbus iam tenet, omnis fere spes praecl-
est. Vbi tamen nullum aliud auxilium apparet, si-
guis ita mittendus est, vt detractio hominem im-
cillum faciat, post vero is in aquam demittendus (50
vel, palo alligatus, copiosissima aqua onerandus.
Nec extimescenda est neruorum distentio, quae
vehementissima esse consuevit. Nam aliquando aeg-
omni vitali virtute fracta, animo linqui deprehen-
est, qui, vbi ad se rediit, aquam sine horrore toler-
potuit.

* Vid. H. A. R. Sc. Anno MDCIC. c. I.

† Fuit efficax ratio per euacuationes medendi a HERM. BO-
HAAVIO problematis specie proposita. Verum nullum al-
praeter vnum exemplum in medicorum scriptis inue-
licuit.

§. 508.

Et contra hoc virus plura a variis autoribus p-
posita sunt *αντίδοτα*, et ita laudata, vt magis, q-
quisque persuaferit sibi, appareat, quam, quid euid-
ter compererit, de quibus videndi, qui alteram me-
cinae partem persecuti sunt. Mihi tamen imper-
non possum, quin addam illud, quod non ita prid-
Celeberrimus Vir RICHARDVS MEAD publicauit *.

* Hoc remedium iam olim descriptum in Transactioni-
Anglicanis No. 237. vid. LOWTHORPII Compendium V-
III. p. 284. repertum fuerat a DAMPIERIO, nautico illo
mine celebri, et ab illustri IOHANNE SLOANIO publici in-
factum, a MEADIO vero, vt fertur, variis experimentis co-
probatum. Ante omnia vero homini, quem canis rabio-
inmordit, sanguinis unciae nouem, vel decem, detrah-

dae sunt. Post componi debet puluis, qui habet vnciam semis herbae lichenis terrestris aridae et bene contritae, piperis vero nigri drachmas duas. Hic puluis in quatuor diuidendus est, et homo per quatuor dies, non capto ante cibo, vel potu, puluerem sumat illumque maiori lactis tepidi portione diluat. Deuoratis his pulueribus, per mensum singulis diebus multo mane ieiuno stomacho in balneum frigidum ire, eoque ita vti debet, vt is in aqua totus demergatur. Mox vero, si ita ei submersum etiam fuit caput, is protinus auferendus est, ne frigus capiti noceat. Per alios quindecim dies balneo vtatur tertio quoque die. Vid. *la Bibliotheque Britannique* T. VII. d. 205. Ex aliis obseruationibus, quae a Medico Lichfieldensi, ROBERTO IACOBO, factae sunt, turpethum minerale non hominibus solum, sed etiam ipsis canibus, hac dira rabie inflammatis, medicamentum esse dicitur, quod non solum eos a periculo tutos praestare possit, sed etiam ipsi morbo, si is iam et hominem et bestiam tenet, mederi. Vide illius Epistolam ad IO. SLOANE in *Transact. N.* 441. Anno MDCCXXXVI. p. 244. Vfus experiendo edocebit, quale pretium his omnibus statuendum sit.

Ad auertendam hydrophobiam plus valet medicina quam ad curandam. Itaque festinanter agendum est, neque committendum, vt homo admorsus ex cunctatione medentium praecipitetur. Vidimus autem tria tempora esse discernenda. In primo fere certa spes est, auerti malum posse; in altero spes aliqua sed tamen dubia, in tertio prope modum certa desperatio, sic tamen, vt et tum vnus vel alter ex summo periculo ereptus esse dicatur. In primo stadio, vbi scilicet nulla signa virus resorpti sunt, virus quantocyus quidem extrahendum est et expellendum ea via, qua ingressum est. Huc faciunt scurificationes tam alte, quam partis laesae natura permittit, applicatio sanguisugarum, cucurbitulatum, fotsus incisarum partium mediante spongia ex calida aqua expressa; si pars admorsa non ampla est, cauterium actuale imprimatur et crusta breui adhibitis vnguinosis et pultibus emollientibus a viua carne resoluitur; omni modo, posteaquam illorum aliquid factum est, larga diuturna suppuratio excitetur; quo faciunt vnguenta et emplastra acriora, subinde denuo adhibita cataplasmata mollientia, adpersus puluis cantharidum, praecipitati mercurii rubri. Vlcus post aliquot hebdomadas ita curari potest, vt fonticuli species relinquatur, dummodo locus admorsus hanc talem curationem admittat. In altero et tertio stadio cicatrix sectione tollatur, et, nisi sponte multus sanguis exeat, fiat scarificatio; postea fiant similia his, quae modo dixi. Praeterea laudantur varia medicamenta intus sumenda, herba anagallidis specie infusi vel decocti, Moschus

Moschus, cantharides, solanum melanoceraſos ſeu belladonna, lichen cinereus terreſtris, camphora, ſpiritus ſal ammoniaci volatilis, limatura cupri, pulvis palmarii, hdragyros ſpecie vnguenti mercurialis extrinſecus et int ſpecie pilularum vel mixturae, atque turpethum mineramercurius ſublimatus corroſiuus; opium denique atq ſexcenta alia, quorum tamen nulli certa fides adhiben eſt. Aliquando tamen ſaliuatio mercurialis vtilis viſa e interdum quoque opii doſes largiores iterum iterumq ac ſaepius datae ad ſpasmus ſoluendos. Eodem conſu balnea inde a primo tempore impacti morius quotidie mel vel bis adhibita prodeſſe poſſunt, et quicquid ſudor largos mouet, vt anagallis, moſchus, belladonna, camphoracum aceto vini. De auxiliis aduerſus morſum rabidorum animalium legatur ANDRY *Recherches ſur la Rage* in *Histo. Societatis medicae Regiae* (*Histoire de la Société Royale Medecine*) A. 1776. *Observations ſur la nature & ſur le Traitement de la Rage*, par M. PORTAL. Yverdon 1777. Verſus etiam hic liber teutonice prodiit, Lipſiae 1778. DAN. PETR. LAYARD *Versuch über den tollen Hundsbiß* Lipſiae 1778. *Methode éprouvée pour le Traitement de la Rage. Publiée par ordre du Gouvernement.* A Paris 1776.

VVLNERA CAPITIS.

§. 509.

Praeuifis omnibus, quae ad vniuerſa vulnerum genera pertinent, et in quamlibet partem corporis incidunt, ad eā veniendum eſt, quibus ſingulae partes ſedesque laeduntur. Nulla vero horum, neque generis vitii, neque ratione curationis, adeo inter ſe diſtans quam quae capiti inferuntur. Ad haec enim referuntur etiam ſolent illae plagae, quibus caluaria colliditur, finditur, atque perfringitur, et quibus etiam cerebrum eiusque membranae laeduntur, quas cum ſummo periculo eſſe nemo ignorat.

§. 510.

In capite vero vulnerari poſſunt cutis, adei musculi et horum aponeuroſes atque tendines, pericranium, quod etiam musculos temporales comprehendit.

endit, et altera membrana, perioftium dicta, quae
 oxime caluariam cingit et sub dictis musculis condi-
 est. Praeterea percutitur varia ratione caluaria, et
 eduntur etiam cerebrum, huiusque membranae. De
 lneribus, quae in facie, oculis, aliisque sedibus sunt,
 orsim dicendum est.

† Quod PLATNERVS hoc loco vocauit pericranium, ab aliis
 dicitur epicrania membrana, a WINSLOVIO calotte aponeu-
 rotique. PLATNERO autem dictum perioftium est ab om-
 nibus dictum pericranium.

§. 511.

Nonnunquam accidere potest, vt homo, cuius
 out grauiter percussus fuit, mox mortuus concidat,
 cuius etiam corpore inciso nihil inuenitur, quod
 n subitam mortem adferre potuisset. Nam in his
 ibus nec ille locus, qui extrinsecus ictum excepit,
 umescere solet. Tales enim momento temporis
 uimantur, quia cerebrum et cerebellum ex ictu
 uementius commotum fuit, et compressa sunt eo-
 n neruorum initia, qui ad viscera pertinent, et in
 vitalem motum praestant.

Commotio cerebri dicitur, quando ab ictu, caluariae illato,
 vel casu ab alto, vehementius concutitur et commouetur
 τὸ ἐγκέφαλον. Iam id cognouit HIPPOCRATES Sect. VII.
 Aphor. 58. de morbis L. I. Sect. IV. T. II. p. 4.⁴ et Coac.
 praenot. n. 370. T. I. p. 572. Cerebrum etiam aliis occa-
 sionibus commoueri potest, e. g. si homo collectione spiri-
 tus plenus ita sternutat, vt totum corpus vehementius con-
 cutiat. Vid. DVRETI Comment. in Coacas p 408. Ab
 hac cerebri commotione oriri videntur illa, quae homini
 mox post acceptam plagam accidunt, si protinus ei omnia,
 quae oculis obuersione, velut aliquo turbine, circum-
 aguntur, si ipsi oculi obcaecantur, alique sensus obtun-
 duntur. Si ictus homo interrogatus non respondet, ob-
 mutescit, concidit, bilem vomit et sine sensu, quasi dor-
 miens, iacet. Si enim talia post aliquod tempus contin-
 gunt, ea ab humore, ex ruptis venis emissio et cerebrum
 premente, proficiuntur. Accidere vero etiam potest, vt
 vasa propter solam cerebri commotionem rupta sint. Id ex
 eo discitur, quod quandoque in caluaria nulla rima reperi-
 tur,

tur, sub ea vero multus humor concretus. Imo cerebrum longe valentius commoueri, si os vel totum integrum incideret, vel parum finditur, minus, si hoc perfringitur, probabile est. Vltimum enim si incidit, os, quod sic motus excipit, dum frangitur, huius vehementiam soluit, quae alias ad partes, quae intus sunt, transferretur. Vid. DRAN Obs. T. I. pag. 111. At enim cerebri commotionem praecipue in casibus forensibus, tunc saepe pro causa apprehenditur, quando in defunctis, qui protinus post ictum animam amiserunt, nec ossis fractura, nec concretus cruentus nec aliud quid repertum est, quod tam citam mortem inferre potuisset. Nam in his corporibus, nec quidem vultus, quod in cute est, locusque, qui collisus fuit, vultus aliis, rubet et tumet, quia protinus enecta omni virtute humor coire haud potuit. Vid. memorabile exemplum in H. A. R. Sc. MDCCV. p. 68. Hoc vero ratio accidere, opinor.

§. 512.

At longe frequentius euenire solet, ut aliquis grauius percussus sit, et ab initio mala indicia haud subsequantur, ita, ut homo ab omni periculo abesse videatur. Post aliquot vero, imo plures, dies, nec commotus nato, accedunt mali morbi et cerebri grauius afflicti testimonia, quae plerumque futuram mortem denunciant. Nec hoc humana imbecillitas in tanta commotionum vulnerumque diuersitate euitare potest. Ob id vero necessarium est, ut medicus de nullo, cui caput percussum fuit, securus sit, sed, ut eum diligenter inspiciat, atque, si aliquid eorum deprehendit, quibus scire licet, hominem periclitari, ut protinus sine mora occurrat. Haec enim auxilia, etiamsi non proficiant, et aeger nihilominus extingatur, magis tamen ignoscendum medico est, qui considerate praesideretque egit. Accidere etiam potest, ut ictus, se tutum putat, et, haud monitus, intemperanter agit, fiducia secundae valetudinis opprimatur.

* Vid. plura exempla vulnerum capitis, quae ab initio leuiter visa, post aliquot menses mortifera fuerunt, in BON Sepulchreto L. IV. Sect. II.

§. 513.

Nec illud ignorari oportet, fere incomprehen-
 lis naturae haec vulnera esse, et in nullo alio genere
 futurae salutis atque mortis adeo incerta, ac in-
 quae in capite sunt. Aliquando enim grauissima
 vulnera, quibus dura mater, et ipsum cerebrum, ita
 lacerata fuerunt, vt maior puris modus per fractam
 et excisam caluariam effusus fuerit, et quamuis ictus
 et frigus, nec aestum, nec libidinem, vitauerit, sed
 moderate et intemperanter vixerit, sine periculo,
 etque iis malis, quae haec vulnera consequi solent,
 peruenit ad sanitatem perducta *. Nec minus etiam
 accidit, vt homo grauiter vulneratus, cum omnibus,
 quae non solum terrere, sed omnem spem tollere et
 mortem praesentem in aliis denunciare solent, con-
 tactus, seruatus fuerit et sanitati redditus **. Adeo in
 medicina etiam, vbi perpetuum est, quod fieri debet, non
 tamen perpetuum est id, quod consequi conuenit ***.
 Cur in curandis capitis vulneribus vtile est, scire
 unumquemque, quid, et quando maxime, caueat, ast
 eo, quae futura sunt, nemini licet certo intelligere
 et praedicere.

Observatione perpetua digna est illa historia, quam ante
 paucos annos singulari studio exposuit LVDOVICVS FRAN-
 CISCVS MANNE, chirurgus Auenionensis. Homini triginta
 annorum lapide icta fuit caluaria, et quidem dexterior et
 superior pars ossis coronalis. Vulnus huic fedi illatum
 magnitudinem denarii habuit. Nihil vero post acceptam
 plagam secutum est, quod periculum ostendere potuisset.
 Homo, cum ad tertium a domestica sede lapidem abesset,
 sine noxa reuersus est, et cum vxore, quam duxerat, rem
 habuit. Auenionem vero venit et a Pharmacopola balsa-
 mum Arcaei et emplastrum de betonica accepit, quod vul-
 neri imposuit. Per viginti dies bene valuit, sine omni
 febre, capitis dolore, sopore, neruorumque distensione,
 fuit. Semper cibi avidus, victu pleniori vsus, accedente
 nocturno placidoque somno: Vario interea opere perfun-
 ctus est. Humeris onera portauit, agrum vertit atque
 subegit, vinum vindemiauit et torcularius vuas pressit.

R 2

Inter-

Interdiu flagrantissimo solis aestu perustus, noctu sub di et arboribus, omnibus aeris iniuriis expositus, dormit. Cum vero vulnus haud sanesceret, nostrum chirurgum ad et in valetudinarium publicum deductus est. Chirurgum cum deprehenderet, plagam sine malis et periculum ostendentibus notis esse, adurentia imposuit, ad putrem carnem, quae vlceri supercreuerat, exedendam. Cum aut animaduerneret, ex vlcere maiorem vim puris efferrī, et tim incidit, et ossis fragmentum, supremæ laminae parte eduxit. Quia vero, hac sublata, interior lamina sine vi esse videbatur, haec ab initio relicta fuit. Increcente vltimis puris modo, vlcus specillo explorauit, quod altius et in ipsum cerebrum, demisit; Eduxit aliud laminae vitreae fragmentum, multis aculeis exasperatum. Post facto cerebro, maxima eius suppuratio orta est, et quoties ubi vulnus deligatum fuit, puris magna vis ex vlcere effluebat. Finita tandem suppuratione, cerebrum, quod exciderat, increuit, et omne, quod vacuum fuit, repleuit. Tandem carne a dura matre et ipso osse, vt fieri solet, crescente, foramen completum fuit, et homo conualuit. At, id quod vix non omnem fidem superat, per id tempus in aegro nihil eorum obseruatum est, quae aliis, caluaria fracta, et cerebro laeso, accidere solent.

** Vide talem historiam, quae non minus, quam prior, admiratione digna est, cum et ipsa medulla cerebri grauiter laesa fuerit, in prima a BRISSEO scriptarum obseruatione.

*** CELSVS L. VII. Cap. XII. §. 4.

† Historia ea quoque vt legatur minime indigna est, quam ELLERVS in Monumentis Academ. Scient. Berolinensi incurauit. E quibus post fata ELLERI descripta et recte verba est, legiturque in *Joh. Theodor Ellers Physikalisch-Chemisch-Medicinischen Abhandlungen, herausgegeben D. Carl Abraham Gebhard, Berlin 1764.*

§. 514.

Nec ea vulnera sine omni periculo sunt, quibus cutis, capillum gignens, eaeque partes, quas sub cutis esse dixi (510), percussae sunt, quamuis totum os tegrum manserit. Inflammarī enim quandoque solum musculi, horum tendines et aponeuroses, quae in quia istae partes neruos habent ab ortu propinquioribus summos dolores neruorumque distentionem mouere potest. Et membranula, quae exterius caluariam cernit

it, seu periostrum, committitur cum dura meninge. Jam et vasa sanguinem vehentia et nervi ex vna hauriuntur membranarum in alteram per futuras potissimum runtur. Illam enim membranam, qua cerebrum inuoluitur, horumque summis capitibus, contegitur, ubi, efficientibus ossibus, sinus rhomboideus est, ex his constitutus conflatam esse, constat. Vasa etiam, quae in foramina inter utramque calvariae laminam discurrent, ossi alimentum subministrant, ex his membranis nascuntur. Accidere ob id potest, ut, si exterior membrana percussa fuit, os integrum sit, et nihilominus intus in dura matre vehemens et periculosa excitetur inflammatio *.

* Vid. LE DRAN Obs. XXVII. p. 179.

§. 515.

Quibus praecognitis, ad singulas species veniendum est. Vulnus, quo cutis capillata ense acuto percussa est, non aliam curationem requirit, quam, qualem supra (375) praecepi. Semper vero, et ubique, ubi cutis pilis contegitur, ea ante omnia radenda.

Si arteria praecisa fuit, ea vel comprimenda (406. 408), vel ad latum digitum ab ora vulneris trajecto ligando deuincienda est (242 ad 244. 414. 415). Et hic ligamentum deligationem adhiberi confert (381. 383). Ex his opportuna est ea, quae uniens dicitur. Si vero ora vulneris commode adduci nequeunt, debent adponi panni, super quos iniici potest alia fascia, vel funis, vel alia, quae capital minus, dicitur (15).

§. 516.

Si autem aponeurosis et pericranium vulnus acciderint, oriri potest inflammatio, si vulnus in cute et externis membranis maius est, quam in pericranio. auertitur, si hoc sectione latius aperitur.

R 3

§. 517.

§. 517.

Vbi cutis alia parte abscissa est, alia dependet, vultus sui debet (376). At enim futura comprehendi potest omne, quod dependet, et per omnes membranas acus linumque immitti. In altera vero ora, non per periostrium, nec per aponeurosin, sed per sola cutim, linum traiciendum est, cum iis, si acu, lino vexantur, grauis oriri soleat inflammatio. Si etiam id, quod dependet, non solum discissum, sed etiam collisum est, illud nihilominus sui potest. Obseruari vero oportet ea, quae supra de his (382) praecepi.

§. 518.

Vulnus, quod telo retuso illatum et collisum, multum saepe inflammari solet. Ne vero id fiat, impedit, plagam protinus ampliare, et, si qua sanguis coit, illum euocare. Vbi latius aperitur vulnus, minus incidendum est pericranium, quam cutis et interiores membranae (516). Vulneri imponi debet, quae pus mouent, non vero alia, quam, quae loquax nervosis, idonea esse, supra retuli (384). Superdici potest emplastrum de betonica, vel illud de cumis. Vtiles sunt aduersus inflammationem saccelli ex vi cocti atque expressi, qui componi possunt ex herba abrotani, absinthii, betonicae, salviae, origani, serpylli, pulegii, maioranae, rorisinarini, melissae, rutae, florum bus lauendulae, rosarum.

§. 519.

Non ita frequenter euenire solet, ut orae vulnris intumescant, quia aer in adiposam tunicam eius cellulas contrahitur, quas multum distendit. *Φύσμη* hoc tumoris genus vocant, quod cognoscitur, si tumor frigidus vulnus obsidet, qui pressus cu aliquo strepitu digitis cedit. Hoc oriri solet, si vultus

us aere et frigore alienatum est. Tollitur, si orae vulneris tumidae leuiter premuntur, et aer exprimitur, si superdantur modo commemorati saccelli, vel, panni imponuntur olibano, mastiche, benzoe, terebinthina cocta suffiti, quibus pannis etiam orae parum perfricari possunt.

§. 520.

Longe autem frequentius his vulneribus supervenire solet inflammatio et erysipelas. Prior in apopurosi et pericranio sedem habet, erysipelas vero in imma cute. Vltimum esse, intelligitur, si aures etiam infestantur, quae cute, non vero aliis membranis, conteguntur. Huic mederi facile est, si cuti, rasae ante capillis, superhabentur medicamenta arida, quae, aduersus erysipelas utilia esse, supra proposui (63. 164). Aduersus inflammationem vero nihil magis proficit, quam, si vulnus noua sectione aperitur (516. 518). Vulnus etiam molliter deligandum; cum saepe periculosa inflammatio excitari soleat, illae nervosae et saepe commemoratae partes, fultis per eas linamentis pannisque, et adstricta nimium citra valentius premuntur. Inponi debent vulneri, quae digerunt et pus mouent (384. 518). Super ea quoque, quae inflammata sunt, utendum est illis saccellis. Vel ex iisdem herbis ex vino decoctis fieri possunt cataplasmata et superdari. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in magnis inflammationibus, et in vulneribus, quae in nervosis locis sunt, adhibetur. Nec in illo alio vulnerum genere sanguinis missio magis necessaria est, quam in iis, quae in variis capitis sedibus et partibus fieri solent.

§. 521.

Si in capite nullum vulnus est, illud autem lapide, ferro, alioque retuso telo, percussus fuit, scire licet,

os restitisse et integrum mansisse, si nihil eorum secutum est, quae, ut infra docebo, accidere consueverunt ubi caluaria fracta, et ea, quae intus sunt, violata erunt. Vexata vero cutis, si leuior casus est, sine scalpello, impositis iisdem curari potest, quae aduer inflammationem valere scripsi (518). Si vero cute etiam aliae partes, quae ei subiecta sunt, graui affectae fuerunt, expedit, quam primum illam scalpello concidi, et profluentem sanguinem detestari post autem eadem superdari, quae inflammatis medetur. Nec aliud auxilium est, si tardius, et postquam locus iam intumuit atque rubet, subueniendum est.

§. 522.

Haec autem curatio magis necessaria est, si multus sanguis concretus sub cute, vel sub ipso pericranio haeret, qui vehementissimam mouere potest inflammationem. Si is sub hac membrana caluariam contingente coit, tumor valde durus est et renitens, plerumque minor, si vero sub cute, mollior magisque diffusus. Hic tumor sine mora incidendus et sanguis euocandus est, ubi etiam confert, plagam patentior esse. Considerate vero secandum est, ne inopinatus aneurysma incidatur, quod etiam in capite nasci potest.

* Vide Dissertat. ad §. 424. citatam.

§. 523.

Quod si vero ex vulnere periostrium diductum, et rufum, vel detritum, est, ossisque quaedam pars nuda illud ante omnia ignorari haud debet, os sine periosteum membrana sanum esse non posse, sed necesse esse, eius minimum exterior summaque pars, utpote amento amisso, emoriatur. Hoc celerius incidit, si aer accessit, vel, si imposita fuerunt varii generis medicamenta, praecipue pingua ac digerentia, quibus omnia

mnibus, vt et pure atque sanie, quae ex vulneribus
xit, os pingue fit, nigrum atque cariosum.

† Quae PLATNERVS hic praecepit, ea a vero distant. Nam
periostrum cum osse coalescit, nisi aut os, aut periostrum
alienatum iam fuerit. Itaque si chirurgus sat cito aduoca-
tus sit, anteaquam aer corrumpere os posset, neque ipsum
instrumentum vulnerans contundendo aut os, aut partes
molles grauiter affecit, purgato vulnere, os periostrum suo
et integumentis contegendum est. Ac ne leuior ossis alie-
natio quidem prohibet, quo minus coalitus fieri possit,
dum modo suprema ossis lamella, quae alienata videtur,
radendo antea sublata sit. Etiam si enim spes promptae
sanationis aliquando vana sit, nulla inde grauior noxa
impendet.

§. 524.

Si igitur hoc in caluaria ex vulnere incidit, ab osse,
quod sic vitiatum fuit, squama abscedit, et post id,
quod relictum est et sanum, noua membrana conte-
gitur. Ossi superdanda sunt linamenta pura, vel ex
cohol expressa. Haec etiam respergi possent puluere,
qui bene tritus ex mastiche, terebinthina cocta, succi-
o, olibano, componitur. Nonnunquam, praecipue
in iunioribus, accidit, vt nihil ab osse abscedat, vtque
mox noua membrana contegatur*. Vbi vero
ostium altius descendit, os scalpello radendum est,
donec aliquid cruoris ostenditur; quam medendi ra-
tionem, vt et aliam, quae ferro candente et varii ge-
neris medicamentis fieri solet, vberius exequar, vbi de
huius morbis dicam.

* Vid. RVYSCHII Obs. V. p. II.

§. 525.

Os, quod sic patefactum, nec vero aere, nec aliis,
conditum valde alienatum est, forari debet crebris fora-
minibus, quae altitudine primam caluariae tabulam
aequant. Hoc autem fit terebra acutum mucronem
habente, quae circumagendo ad diploen vsque adigi-
tur. Ne vero interea ossi iniuria ex aere accedat,

R 5

omnia

omnia festinantius agenda sunt, et, dum os sic foraminibus vrgetur, candentibus carbonibus aeris no auertenda est (389). Os vero, quod sic deopertum per multa et exigua foramina terebratum est, resper potest eodem puluere bene trito, quem mox (521) proposui, vel super id dari possunt linamenta ex spiritu ardente, nec non essentia mastichis, succini, ele expressa. Aliena sunt omnia, quae os vel humectant vel pingue faciunt. Os autem, postquam cum ea, qu fieri potest, celeritate sic multis linamentis pannisque tectum fuit, ante tertium quartumque diem, nihil aliud quid hoc requirat, deoperiendum non est, cum nihil magis proficiat, quam rara deligatio. Videndum etiam, ne sanies, quae ex vulnere fertur, ad os descendat, quod siccum et purum esse oportet.

§. 526.

Subesse etiam quandoque solet caries in diploe. Haec vero non a vitiatis tantum humoribus oritur, sed etiam a grauiori ictu, a quo exterior lamina colli potest, integra manente interna. Hoc vitium, quod in diploe incipit, se latius diffundit, quare non solum putres carnes et sarcomata extrinsecus superincrescunt, sed malus humor tandem etiam laminam vitream exequam rem et, quia cerebri membrana, idque ipsius grauius afficiuntur, horrenda mala sequuntur *. Preteritus huic malo occurrendum et tota caluaria modio excidenda omneque corruptum eiiciendum est.

* Vide Historiam Experientiss. et mihi amicissimi IO. CHRISTOPHORI POHLII in Ephem. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 103 p. 384. Caluariam, quam Cl. Vir mihi dono dedit, cum apparatu aliarum rerum, quae ad ossium pathologiam illustrandam facere possunt, asseruo.

§. 527.

Tribus potissimum modis caluaria percussa violatur solet. Ea enim, vel ense acuto inciditur, vel ex ictu desidit, vel finditur et rimas agit.

§. 528.

Si ea telo acuto percussa fuit, relinquitur ἔδρα, des *. Haec, si lineae modo recta est, dicitur κοπή, si obliqua, διακοπή, si vero ex caluaria aliquid cifum est, vel quasi dedolatum, ἀποσκεπαρισμός **.

* Vide Figuram in PETRI PAAVII Succent. Anat. p. 77. 80. 94. Ab HIPPOCRATE ita describitur de Vuln. Capitis Ed. Lind. T. II. p. 692. ἔδρη δὲ καλεῖται, ὅταν μένον τὸ ὕψος ἐν τῇ ἑωντῇ φύσει, τὸ βέλος τηρίξαν ἐς τὸ ὕψος δῆλον ποιήσῃ, ὅπῃ ἐτήριξεν. Aliquando etiam sedes in osse cum huius fractura, praecipue laminae internae, est. Ἐκκοπήν talem describit LE DRAN T. I. Obs. 27. p. 179. et fig. vid. in PAAVIO p. 103.

** Vid. fig. c. l. p. 101. et Definit. in GALENI Definit. Med. Edit. Charter. T. II. p. 268. et in PAVLO L. VI. Cap. XC. p. 96. Confer Programma, quo Anno MDCCXXXVII. Anatomen publicam indixi, de curatione τῆ ἀποσκεπαρισμῶς in calua, et additam figuram caluariae, in qua notabilis ossis pars ense abscissa, interior autem lamina fissa fuit, os vero, callo durissimo glutinatum, paululum, quia non recte in pristinam sedem commissum fuit, extat atque prominet.

§. 529.

In pueris, quibus ossa mollia atque cerea sunt, nunquam desedit os ita, ut nec externa, nec inter- parte fractum sit, exterius vero sinum, intus gibum habeat, prout in aeneis plumbeisque vasis hoc videre solet. Φλάσιν vel Θλαΐσιν vocant *. Frequentius autem os, quod desedit, etiam perfractum, et dicitur ἑσφλασις vel ἐνθλασις; si totum os perfractum a caluaria recessit et desedit **. Hoc genere am comprehenditur ἐκπίεσμα, ubi plura fragmenta sunt, quae desederunt, et ubi haec labant atque meningem ac cerebrumurgent. Ἐγγίσωμα est, si os fractum altera parte deorsum infedit, altera caluae ineret. Καμάρωσις vero dicitur, ubi ossa perfracta, et quasi fornicata sunt ***.

* Vide HILDANVM Cent. II. Obs. V. p. 87. figuram in PAAVIO p. 86.

** Vide

** Vide fig. in PAAVIO p. 94.

*** De hoc fracturae genere, quod et GALENVS de metho-
medendi Cap. VI. et PAVLVVS L. VI. c. 90. descripseru-
plures Autores fatentur, se modum, quo os ita in altu-
tollī possit, haud intelligere. Vid. CORTESII Comm.
HIPPOCR. de capitis Vulneribus p. 132. IOBVS A MEEKR-
Obs. C. I. p. 12. prodidit, se semel in puero vidisse
καμάρῳσιν, seu, vt vocat, camerationem. Nec tamen
qui veteres refutat, rem recte explicat. Si enim
καμάρῳσιν id intelligunt, vbi plura ossa fracta atque depre-
extrinsecus sinum relinquunt, intus vero, quasi gibba, o-
ram matrem premunt. Conf. ROHAULT c. I. p. 16. MA-
NE l. c. p. 155. res parum differt ab ἐνθλάσει. Vix vero
extrinsecus in altum efferri potest, nisi cum CAESAR
MAGATO L. II. Cap. XI. p. 30. fingere velimus, hoc fi-
a telo, si id, ossi infixum, extrahitur, quo ossis, praecip-
fracti, pars in altum tolli posset. Nec tamen, hoc fac-
incidere, crediderim.

§. 530.

Os quoque vario modo finditur, vt in eo rin-
fiat, seu ῥήγμα. Rima etiam quaedam discrimi-
habet. Si ea maior est, ῥωγμὴ vocatur *. Si aute-
rimula paruula est, quae visum effugit, et chirurgus
qui caluariam contuetur, fallere potest, illa vocatur
τερχισμός, seu ῥωγμὴ τερχώδης **. Si autem non
altera parte fuit ictus, os altera fiderit, ἀπόχημα
citur. Recentiores per Resonitum, vel Contrassu-
ram, expresserunt ***.

* Vide PAAVIVM p. 76.

** Vide PAVLVVM c. I. PAAVIVM p. 77.

*** HIPPOCRATES de Vuln. Capitis T. II. p. 693. Edit. Lin-
appellat ξυμφορὴν, seu calamitatem, quia huic fissurae, cu-
illa reperiri non queat, haud facile potest succurri. Plur-
eam fieri posse negauerunt, vt videtur, autoritate GALE-
decepti, qui L. IX. de meth. med. Cap. XVII. T. IV. p. 522
putat, omnem fracturam ossis in caluaria futuris cohiberi
rimam enim ex vno osse in alterum penetrare non pos-
cum ea distincta sint, et in futuris quasi per vngues con-
missa. Contra eos, qui hanc, sic dictam, contrassuram ad-
mittunt, multis ideo argumentis pugnat PAVLVVS c. I. l. I.
recentioribus, vero, vt alios omittam, DIEMERBROECK
Anat. H. C. L. IX. C. IV. p. 529. MVNNICKS in Chirur-
L.

L. II. Cap. XV. p. 264. et ROHAVLT *des Playes de la Tête* Cap. VII. p. 49. At enim, praeter HIPPOCRATEM et CEL-SVM, ex recentioribus plures, et inter hos H. F. AB AQVA-PENDENTE Opp. Chirurg. L. II. Cap. XIV. p. 94. os alia parte percuti, alia findi, posse probauerunt. Exempla vero adduxerunt NIC. FONTANVS in Comm. in VESALII Epitomen Cap. I. p. 3. VAN MEEKREN c. l. p. 20. et BOHNIVS de ren. vuln. Sect. II. C. I. p. 194. Res etiam aliis et luculentioribus exemplis confirmata fuit in Dissert. HENR. SIGISN. STOSCHII de Resonitu experientia probato, Arg. MDCCXXII. quae obseruauit clarus expertusque inter Argentoratenses Chirurgus LEMAIRE. Conf. PAVLI AMMANNI Disp. Chirurg. de Resonitu, vel Contrafissura Cranii, L. MDCLXXIV. et GEO. WOLFFG. WEDELII Diss. de contrafissura ex principiis mechanicis, physicis ac medicis deducta, Ienae, MDCCVIII. in qua vltima etiam varia argumenta, ex motuum legibus ducta a IO. MARCO MARCI, LEIBNITIO aliisque proposita leguntur.

§. 531.

Hoc autem variis modis incidere, iam aliis obser-tionibus compertum est. 1) Nonnunquam enim quod percutitur, etiam finditur, ast cum hoc alia, am remotiora, ossa, per quae rimae ex priori quasi actae pertinent *. 2) Aliquando idem os alio loco re-cutitur, alio loco finditur **. 3) Accidere potest, dum aliud os ictum excipit, aliud rimam faciat ***. Saepe lamina exterior caluariae integra manet, in-ior autem, et quae huic subiecta est, frangitur ****.

Hoc genus frequentissimum est, et saepe rima agitur, non solum per os, quod propinquum est, sed etiam per alia, imo fere per totam caluariam. Vid. RVYSCHII Obs. Anat. XLVII. p. 60. Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. XXXII. et exemplum primum in STOSCHII Dissert.

* Vide alterum STOSCHII exemplum.

** In hoc genere quaedam diuersitas est. Nam aliquando vicinum, aliquando remotum, inter quod et illud, quod ictum excipit, aliud medium est, fissum esse dicitur. Prius non ita rarum est. Vide tertiam STOSCHII historiam et ad-ditam figuram, alias lege in eadem Dissert. C. IV. §. 3. Alterum genus rarius euenire videtur, et vnicus casus ex FRID. LOSSII Obs. med. L. I. adducitur, vbi, icto fronte, os occipitis fuit fissum. A qua historia non multum differt alia

alia a PETRO DIONIS in Chirurgia p. 415. prodita, vbi coronale percussum, ast non hoc solum, sed et os occipi fractum fuit. Accidere vero frequentius existimo, vt pluribus locis caluaria fracta est, ei etiam plures ic fuerint illati.

**** Hoc genus admodum frequens esse opinor, quod i aliquando in huius vrbs valetudinario vidi Homo a nouem annos casu ab alto facto caput grauiter offender a quo tempore desipuerat ita, vt eius audacia atque lib aliquando asperioribus coercionibus reprimenda et Leuato tamen accessione impetu, variis domesticis operi perfungi solitus, tandem, cum aquam hauriri veller, flumen immersus periit. In huius caluaria, cum peric nium cum cute auulsum, illaque tota deoperta esset, trinfecus nihil violatum, vel alienatum, deprehendi pot Ablata vero caluaria, in dextri bregmatis suprema par huiusque lamina interna, rima hiabat satis ampla. cu orae, velut aculeis, exasperatae erant. Ab his punge bus et dura meninx et cerebrum grauiter laesum et v lceratum erat. Haud ita pridem fere similis casus et Ordini nostro Medico fuit propositus. Vid. alia exem in PARAEO l. c. PETRO BORELLO Cent. II. Obs. 20. p. 11 SCVLTETO Obs. XIV. p. 226.

† Scriptor recentior de resonitu, DVVERGE, Vir doctissim edidit librum singularem, cuius inscriptio haec est: *Méme sur les moyens de reconnoitre les CONTRE-COUPS dan corps humain & d'en prevenir les suites.* A TOURS 177 Seconde Edition.

§. 532.

Inter signa, quae, caluariam fractam esse, oste dere dicuntur, plura sunt, quae fallere possunt. Pr tinus considerandum est, quo lapide, telo, an medi cri, an vastiori, an vehementer, an leuiter, caput pe cussum sit. Vbi vulnus est, demitti specillum opo tet, quo mediante, percipi potest, num os integrum sit. Potest vero esse, si specillo nihil, nisi laeue c lubricum, occurrit, si quid asperi est, qua futurae no sunt, fractum os esse testatur *. Demittendum ver specillum temperata manu est, ne illud, si caluari effracta fuit, in meningen, ipsumque cerebrum, incidat

* HIPPOCRATES Epid. L. V. Textu XIV. T. I. p. 773. fatetur se aliquando a futuris deceptum fuisse, quae simplex, magn

Viro digna, erroris confessio multis laudibus extollitur a
 CELSO L. VIII. C. IV. et QVINTILIANO Instit. Orat. L. III.
 Cap. VI.

§. 533.

Si vero specillo nihil inuenitur, considerandus est
 homo, et inquirendum, num is eo tempore, quo
 vulneratus fuit, conciderit, num ei fuerint oculi ob-
 ecati, num obmutuerit, et sine sensu per aliquod
 tempus iacuerit, num ei per nares auresque sanguis
 fluxerit, num bilem vomuerit; quae omnia eueniunt,
 ab ictu cerebrum commotum fuit. Nam, hoc si
 accidit, etiam metus est, ne motu vena rupta sit, quae
 sanguinem mittere possit.

§. 534.

Clariora vero indicia ostendunt, periculorumque
 ratio patefaciunt ea, quae post aliquod tempus con-
 sequuntur. Si ea parte, qua caput ictum fuit, eius
 calor vehementer urget, ac pertinaciter manet, si tor-
 ror accedit, et cum hoc febricula, si mens non constat,
 homo quasi dormiens iacet, si trux eius vultus est,
 alii, quasi resoluti huc illuc mouentur, si ii inflam-
 mantur, si vrina, vel alui fex, sine voluntate excernitur,
 nervi, vel resoluuntur, vel distenduntur. Inter
 res etiam est, si septimo circiter die, pro modo
 febris, maior vis puris, vel alius humoris, ex eo
 ortur, et, si locus mollior est, ac quasi tumet. Nam
 omnia haec aliquando celerius, aliquando serius, et
 sunt plures dies, eueniunt, si sub caluaria arteria, vel
 vena rupta, sanguinem emisit, vel, si in osse noxa est *.

Ex aliis etiam signis colligere volunt chirurgi, num os
 fractum fuerit. Dant homini filum, vel, linteolum, quod,
 si is illud dentibus arreptum tenet, ii adducunt, et valen-
 tius concutiunt, videntque, num is stridorem ferre possit.
 Nucleum, vel aliud durum, dentibus submittunt, et id
 frangere iubent, quod si aeger sine molesto sensu facere
 potest, securitatem pollicentur. Hae vero coniecturae leui-
 ores

ores sunt. Nam, si caluaria sub crotaphite musculo
vel fracta, est, ex tremulo motu atque morsu molesta
tur perceptio, non vero ita facile, si illa alia parte
fuit.

§. 535.

Scire etiam licet, multum humorem ex ruptis ar-
riis venisque sub caluaria effluxisse, si haec (533), o-
dem non statim post ictum, ast, breui interpol-
tempore, eueniunt. Mala enim indicia, quae
tinus ictum subsequuntur, a cerebri commotione fi-
supra retuli (532). Vbi sanguis concretus alio
parte haeret, is vel mole sua cerebrum premit,
corruptus, febrem atque inflammationem incen-
Si vero alius humor intus est, is aliquando in sani-
vertitur, quae duram matrem rodit, et non tam
flammationem, quam neruorum distentionem, mot-
Nerui etiam grauiter distenduntur, si os fractum
ram meningem pungit, vel si haec aliis grauiter
ficitur et violatur, quae res etiam periculosissim-
mouere solet inflammationem. Si cerebrum aliqu-
offis fragmentum comprimit, idem consequitur, qu-
solet, si illud a concreto sanguine premitur (534).

§. 536.

Frequentius incidit, vt, dum in vno latere ne-
resoluuntur, illi in altero distendantur. Crebrius
non in eo latere fit, vbi plaga, et sub caluaria conc-
tus humor est, sed in altero. Inde coniectura en-
fuit, neruorum initia, seu medullares cerebri fib-
ex laeua in dextram, ex dextra in laeuam, descend-
et decussare. Nihil tamen in his perpetuum est *.

* Vid. BRISSEI Obs. l. c. p. 4. et p. 16. In alio, qui,
ictum capiti illatum, die quinquagesimo primo obiit
qui frequentius maxillae ac brachii distentionem in la-
dextro passus fuerat, cerebrum sinistrum totum in pus-
sum fuit repertum. Vid. H. A. R. Sc. MDCC. p. 56.

† Ex obseruationibus illis nihil certi de chiasmo, quem vocant, fibrarum medullarium, colligi posse, docent resonitus seu contrahissurae in ossibus. Etenim si in his fieri potest, vt effecta impetus impacti non sint in loco percusso, sed in alio et opposito osse, idem profecto in fibrillis illis et vasculis multo tenerioribus expectari poterit.

§. 537.

Si igitur haec omnia vel plura indicia ostendere lentur, os fractum esse, id certiori nota explorare et, si plaga, vbi nulla ex vulnere est, manu fit, et tis cum omnibus, et ipso perioestio, subsecatur, que deoperitur.

§. 538.

In patefacto sic osse rima patentior manifesta est: etiam, si eo loco, cute incisa, pallidum, vel alietum reperitur, vitium subesse intelligitur. Si vero rimulam paruulam, omnemque oculorum aciem iugientem, habet, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde id scalpro deradendum. gritiem enim continet, si quid fissum est.

§. 539.

Si etiam illa mala indicia chirurgum deceperunt, ea parte, qua cutis discissa est, rima haud reperitur, non inutile est, quia, si ex hac extrinsecus facta ga sanguis emittitur, is, ne ad interiora descendat, quantum auertitur, vel, si forte eius aliquid ex rupta niori vena missum fuit, illud, antequam concrescit, cuti et exhauriri potest. Nec etiam magno negotio is sanescit, si ea frustra secta fuit.

§. 540.

Vbi autem ea parte, quae ictum excepit, et qua is subsecta fuit, os integrum repertum est, mala o indicia significant, caluariam alia parte fissam esse, ori diligentia opus est. Caput ad cutim tonderi

§

oportet,

oportet, et considerari, num quis locus mollior sit tumeat, vel plus solito rubeat. Ad illum locum par faciendum iuuat emplastrum emolliens, quod per quot horas superdari potest. Cum homo, cui mens constat, in parte aliqua dolorem percipit, cum aliqui, propter continentem somnum, appellatus igitur, vel, qui inter verba desipit, manum alicui loci crebrius admouet, coniectura perducimur ad eandem, in qua noxa est.

§. 541.

Neminem a periculo tutum esse, cui caput percussum fuit, alias (512) retuli. Nec illud ignoscere oportet, rationem omnium indiciorum atque coniecturarum talem esse, vt, cum saepe aliquando sponderunt, interdum tamen fallant (413). Euidetior vero huius rei causa est in hominum capitibus. Quibusdam enim caluaria tenerior est, et quae id leui iniuria frangitur. Nec parum ad id facere videtur dura meninx, quae in quibusdam, praecipue in senioribus, ita caluariae intus adhaerescit, vt ea ex leui ictu valentius concutiat: quae res, vel periculosam inflammationem mouet, vel efficit, vt arteriae atque venae, quae per vtramque meningem discurrunt, rumpantur et sanguinem mittant.

§. 542.

Maxime omnium infantes periclitantur, si iis caluaria fracta vel fissa est. Haec enim modiolum, cum adultis exciditur, ferre non potest. Ossa vero puerorum, quia tenera sunt atque cerèa, mollesque commissures habent, non ita facile franguntur.

§. 543.

Tempora si percussa sunt, grauis, ac saepe letalis, vulneris periculum est. Ea enim parte et ossa modum

nodum tenue est, et tum sub cute, qua tempora congreguntur, tum intus sub osse, maiores arteriae assurgunt, quae ruptae sanguinem periculosius fundunt; praecipue illa arteria, quae ex carotide externaeducta, ex ossis sphenoidi foramen ad duram meningem ferar, et huic alimentum subministrat, saepe in medio osse bregmatis huiusque anteriori ac inferiori angulo, uasi recondita et innata, haeret, quae ossis fragmentis, vel ferramentis, si in curatione ad haec deueniendum est, laedi potest.

§. 544.

Veteribus, et inter hos, HIPPOCRATI*, omnis ophthalmitis laesio valde terribilis fuit, qui existimauebant, semper, vulnerato vnius lateris musculo, alterum conuelli. Sed sine neruorum distentione hos musculos**, quin etiam collisos***, sanescere, his temporibus compertum est.

* De Capitis vulneribus Text. XIX. T. II. p. 696 in Coac. no. 369. T. I. p. 572. et de ossium in temporibus fractura. no. 57. p. 538. Nec PARAEVS id ausus est. Vid. L. IX. Cap. XIX. p. 292.

** Vid. GARENGEOT *des Operat.* T. III. Obs. XV. p. 131.

*** Vid. LA MOTTE *Chirurgie* T. II. p. 292.

§. 545.

Maiori in periculo sunt, quibus futurae percussae erunt, et sex his praecipue ea, quae ab occipite per medium caput ad frontem procedit, et sagittalis dicitur. Nam dura meninx futuris potissimum inhaerescit, sagittali septum ex dura matre, vel processus falci-formis, qui cerebrum diuidit. Etiam in hoc sinus maior venosus reconditus est, ex quo, si rumpitur, nestra sanguinis profusio oritur. Sinus alii venosi in septo, quod cerebellum a cerebro discernit, et sub futura sunt, quae Graecam litteram Λ exprimit, qui

laterales vocantur. Ob id non tutum est, futura modiola, quo caluaria exciditur, comprehendere, quamuis id a nonnullis factum esse legamus *.

* HIPPOCRATES hoc vetat de Vuln. Cap. Text. XVII. p. 66. Sed IACOBVS BERENGARIVS, alias CARPVVS dictus, testatur se saepe excidisse commissuras, nec deprehendisse quidquam aliud, quam, quod in aliis caluariae sedibus excisis euenire solet, de Fractura Caluariae p. 83. WERDENBERGIVS in libris ad HILDANVM se hoc in Italia vidisse asseuerat. O. Cent. II. Obs. VIII. pag. 86. et GARENGEOTTVS in praefatione nouae Edit. Chirurgiae p. 16. prodidit, se in puero sex annorum septem foramina modiola fecisse, et ex his vnum super futuram sagittalem, et aliud super coronalem. Haec vero is addit, num puer euaserit. Existimo, futuras, propter eas rationes, modioli usum haud facile admittere, nisi id a circumspecto chirurgo tentandum esse, quamuis fors nonnullos temeritas adiuuerit. Si prope futuras noxae praestant, os vtrinque perforari. Conf. ROHAULT l. c. p. 89.

§. 546.

Eadem fere pericula iis sunt, quibus os frontis super supercilia fissum, vel fractum, est. Notum enim est, ibi os duplex esse et intus sinus habere, qui membrana mucum secernente cinguntur. Si itaque interior ossis pars confracta est, vulnus vix ad sanitatem peruenire potest. Nec his sedibus modiolus accommodari potest, tum propter hos sinus, tum quia interiorius inaequale est, et chirurgus periclitatur, ut modiola cerebri membrana, illudque ipsum, laedatur.

§. 547.

Occipitium crassissimum est, sub eo vero conditum est cerebellum, ex quo nerui educuntur, qui ad organa pertinere videntur, quae vitalem motum praestant. Quare, si illud, vel ab osse, vel a sanguine premitur, cita mors sequi solet. Inferius os pluribus musculis contegitur et in interna media parte illud inaequale est, ita, ut ex eo tuberculum exsurgat, quod ex duabus spinis, vna oblonga, altera transversa, vtrinque

que prominentiori, coalescit. Nec ideo huic ossi nodiolus admoueri, nisi e latere suminaque parte, potest.

* Plagae, quae occipiti inferuntur, quidem periculosiores sunt, haud tamen semper ex iis mors sequitur. Vide historiam, ubi os occipitis a lapidis ictu collisum defederat, et sanguis sub eo et sub dura matre ex ruptis arteriis effluerat, ubi nihilominus homo sine febre alioque malo signo conualuit in LA MOTTE *Chirurgie* T. II. p. 322. De tumore duro in medio cerebello enato vid. Obs. III. BRISSEI. Mihi olim laudatus Argentoratensium Chirurgus LE MAIRE retulit, se aliquando aegrum curasse, cui non minima occipitis pars cum notabili corticis cerebelli portione ense ablata fuerat.

§. 548.

Grauius caeteroquin vulnus est, si telo retuso caluaria fracta atque collisa, quam, si ea telo acuto percussa fuit. Pessima vero plaga est; quam plumbea lans iniecit, quia, propter huius perniciosissimum momentum, et caluaria, et ipsum cerebrum, grauiter peratiuntur commouenturque *. Latentes rimulae, quae alia parte sunt, quam, qua ictus fuit, quia difficiliter reperiuntur, etiam non ita facile sanantur.

* Vid. exemplum in PARAEO L. IX. Cap. VIII. 275.

§. 549.

Plurimum etiam in his vulneribus confert aetas, omni tempus, corporis habitus, victus. Alias retuli, nihil pestilentius esse his vulneribus, quam graue, luridum atque impurum coelum (402). Quare etiam maioribus valetudinariis, ubi aer impuris halitibus repletus est, haec vulnera aegre sanescunt. Ea etiam multum alienari, si haud protinus obligantur, sed ris, maxime gelidi, iniuriis diu exposita fuerunt, impertum est. Quantum fragores strepitusque iis doceant, ex PARAEO * discimus.

* Lib. IX. Cap. XIV. p. 283.

§. 550.

Igitur, vbi, vel certis indiciis cognoscitur, vel alia qua coniectura percipitur, caput fractum esse, et vbi mala signa periculum ostendunt, caluaria deoperiendae et rima, vel fractura, patefacienda est. Plaga vero vbi ex vulnere est, vbi talem, necesse est, habeamus, quam lem accepimus, vel eam manu fieri oportet, vbi cetera fere commodissima est, quae duabus transuersis lineis literae X figuram accipit, vt deinde a singulis procedentibus angulis cutis subsecetur. Nam sic sedula praestatur modiolus, cuius vsus necessarius esse potest. Videndum vero, dum cutis, et alia, quae supra caluariam sunt, subsecantur, ne quid ex ipsa membrana quae sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. siquidem haec, terebris lacerata vehementes febres cum inflammatione excitaret. Dissimilis vero castus dissimilem secandi modum requirit. Si os fissum est, non vero perfractum, valentius imprimi scalpello potest, quo simul et cutis et periostium incidantur. Vbi vero os totum perfractum est atque labat, suspendenda magis manus est, ne ossis fragmentum intus depressum primatur, neque illud cerebrum eiusque membrana urgeat. Si sanguis ex plaga fertur, is impositis linamentis puris, vel, si id res requirit, compressa vnde deuincta arteria, sistitur. Inter cutis subsecutae angulos et os imponi debent linamenta, ne iterum glutinantur.

§. 551.

Postquam sanguis conquieuit, iterum deoperiendae caluaria est, illaque spongia vino calido madente detergenda. Si os haud perfractum est, sed summum tantum collisum exasperatumque, illud radi et lacuna satis est. Si qua paruula ossis fragmenta eminent eximi, et si ex membrana dependent, forfice abscindi si vero cum ipso osse cohaerent et retusa sunt, in fine de

em suam dari debent, vt glutinentur. Id, quod haud glutinatur, emoritur, et tandem a parte sana recedit.

§. 552.

Nam necesse non est, vt in omni fissa fracturae caluaria ad ferramenta veniamus, quibus illa exciditur. Quod si enim nulla mala indicia sunt, vel, si illa, quae adfuerunt, leuantur, et si nulla sanies, nec, pro modo vulneris, nimis multa, ex vlcere effertur, et si ex nudato osse caruncula excrescit, modioli vsus superuacuuus est. Rimae enim, si nulla alia noxa accessit, in caluaria aequae, ac in alio osse, callo implentur. Ad id vero non parum conferre existimo, si rotinus post acceptam plagam sanguinis plurimum extrahitur, danturque medicamenta paulo valentiora humum ducentia (63), quibus efficitur, vt, si forte intus arteria, vel vena aliqua in cerebri membranis ex ictu rupta, aliquid sanguinis miserit, illud discutiat. Si igitur, si mala signa haud accedunt, vel haec leuiora sunt, eaque nulla grauiora sequuntur, experienda prius a curandi ratio est per sanguinis missionem et impota discutientia.

† Homo, cui caput percussum sic est, vt metus sit, ne capitis interioris partes a tremore et commotione valde debilitatae sint, et humorum coitus in meningibus et cortice cerebri futurus sit, curari debet sanguinis missione, eademque repetita, prima quidem largiori, caeteris minus largis; clysmatibus emollientibus et stimulantibus; medicamentis nitrosis aliisque salinis. Atque haec quidem vniuersi corporis mutationem et curationem concernunt. Praeterea parti affectae statim atque fieri potest, medendum. Itaque vulnere, si quod est, vel tumore obligato contextoque, focus frigidus capiti toti adhibendus est, et sedulo quidem omni hora renouandus. Focus esse potest ex gelidissima aqua, vel ex medicamento refrigerante et resolvente, quale paratur, si aquae frigidae libris decem affunduntur adiiciunturque aceti vini libra pondo, nitri vnciae quatuor et salis ammoniaci vnciae duae. Hoc focu partibus in encephalo debilitatis robur additur, atque adeo cauetur, ne humorum coitus fiat. Ista medendi ratio non modo prin-

cupiis illis supra in capite de Inflammatione propositum plane congruit, verum etiam experimentis multis, iisque haud dubiis confirmata est et corroborata. Quae de re agenda omnino sunt, quae scripsit SCHMUCKERVS, vir peritissimus in libro plus semel iam a nobis nec satis laudato Tom. I. pag. 153 seqq.

§. 553.

Si vero non nisi calvariae exterior pars percuta est, et rimae ad diploen, non vero ad alteram et internam eius partem, seu laminam vitream, transeunt, metuenda caries est (526). Optimum est, modicum vitium comprehendere et os totum excidere. Si etiam latius vitium est, quam, ut modiolus comprehendere queat, exitus datur humori, qui in diploe diffusus est, et id, quod in osse corruptum est, aridum fit et a sanguine soluitur. Si eius, quod vitiatum fuit, ambitus maior est, expedit, iterum modiolum adaptare. Sunt, quorum os ferramenti radunt, donec integrum id sit, quod reliquum linquitur, sed multo melius, id totum excidi, arbitror.

§. 554.

Si calvaria, exterius concisa, ἑδραν, seu sedem (528) habet, non alia curatio est, quam, quae iam proposita fuit (524. 525). Ossis enim fragmento prospiciendum est, quo illud, vel cum alio glutinetur, utque super id membrana increseat, vel, si hoc fieri nequeat, ut aridum factum ab alio secedat.

§. 555.

At, si fragmentum, ense abscissum, undique resolutum est, quod genus ἀποσπαραγισμός veteribus dictum fuit*, illud, si nondum alienatum est, servare potest, si cutis non prorsus abscissa fuit, sed cum osse dependet. Si enim, purgato vulnere, os in sedem suam datur, cutis vero fascia, vel futura, adducitur, raraque adhibetur deligatio, os iterum glutinatur.

* Exemplum

* Exempla vide in PARAEO L. IX. Cap. VII. p. 274. LE DRAN T. I. Obs. 22. p. 146. Confer supra (528) citatam descriptionem.

§. 556.

Experimentis cognitum est, in *Θλάσει*, seu, ubi in iunioribus sine fractura desedit, superuacuam esse eorumque omnem curationem, ad quam non prius accurrendum est, quam, si ea eueniunt, quae cerebri premini testantur. Nonnunquam enim id, quod depressum est, per se, et sine medentis auxilio restituitur*, saepe etiam *Θλάσει* sine incommodo relinquitur**. Si curatio necessaria videtur, optimum est, iuxta eam partem, quae desedit, modiolis excidere, illud ea ratione excitare, ac mox dicam, cum ad ea peruenero, quae fracta desederunt. Sunt, qui extrinsecus cuti emplastrum glutinosum imponunt, idque adducunt, ut cum cute etiam os attollatur, id vero, quod non sine summo dolore fieri potest, parum prodest. Experiri licet cucurbitulam, quae cum igne comprimitur***. Maius vero periculum oriri potest, res terebra (*tirefond*) agitur, quia, si illa os perfrangat, grauis metus est, ne id findatur, et cerebri membrana grauiter laedatur****.

* Hoc a sanguinis motu fieri, et si valentius attolluntur arteriae, quae per teneriora caluariae ossa in pueris discurrent, a vero propius est. Vid. PARAEVS L. IX. Cap. V. p. 270. et Exemplum in Ephem. N. C. Dec. II. A. 3. Obs. 194. p. 377.

** Vide plures historias in MAGATO Lib. II. Cap. XIX. p. 41. Mihi aliquando accidit, ut ad hominem euocarer, qui ex tertia aedium contignatione delapsus, ab initio sine sensu quasi, dormiens erat. Quia coniectura erat, caput offensum esse, Chirurgus, capillos deradens, monstrauit profundiorum et maioris ambitus sinum et depressam caluariam. Dum miramur, cutim super eam collisam vexatamque haud esse, homo expergefactus et sectionem metuens dixit; nihil ibi subesse alieni, sibi a teneris hunc sinum fuisse. Is etiam sine noxa conualuit.

*** Id,

*** Id, et cucurbitulam, proposuit HILDANVS Cent. II. O
V. p. 87.

**** Vide SCVLTETVM in Armament. Decl. Tab. XXIII. p. I

§. 557.

Si os, quod desedit, etiam perfractum est (ἐνθλασ
529), illud non solum cerebrum eiusque membrana
vrget, sed interdum etiam ex fractura, quibusda
velut aculeis, pungit. Inter ea, quae accidere soler
si cerebrum premitur (532. 533. 534) in hoc ca
gravis mouetur inflammatio, quae etiam ad suppur
tionem spectat. Quare, si curatio negligitur, ex c
rebro per rimam patentiorem pus fertur. Si aer a
cedit, vlcus putrescendo intenditur, et caro inte
corrupta nascitur, quae, veluti fungus, celerius, etiam
super caluariam, increfcit,

§. 558.

Oportet igitur protinus os, quod desedit, excitari.
Plures hoc moliti sunt excogitatis variis ferramenti
terebra (*tirefond*), nec non sic dictis eleuatoriis, quo
rum alterum, quia tribus fulcris, seu pedibus, nititur
triploides vocatur *, alterum vero nomen ab inuen
tore, HILDANO **, accepit. Sed haec machinament
eum terebra sunt, quare semper metus est, ne hac in
terior ossis pars perfringatur (555). Nec terebra i
os, quod vndique resolutum est et labat, sine pericul
adigi potest. Longe itaque melius est, os, quod de
orsum insedit, veste *** attolli. Si vero, nec rim
satis patet, nec fragmentum ex facili remoueri potest
vestis demitti nequit, nisi prius modiollo foramen i
osse, quod integrum est, fiat, iuxta id, quod desedit
quo vesti spatium et aditus sit. Vbi vero id, quod
fractum est, veste attollitur, videndum, ne hoc fora
minis orae valentius premantur, quare semper inte
os vestemque collocandus digitus est.

Vid. SCVLTTETVS Tab. III.

* Vid. HILDANVS Cent. I. Obs. IV. p. 79.

** Vid. GARENGEOT *des Instr.* T. II. Cap. III. Art. XI. p. 152. et XIII. p. 158.

§. 559.

Si vero os, quod deorsum infedit, excitatum fuit, am cura habenda est, vt humor, qui sub caluaria luxit, euocetur, vtque fragmenta, quae labant, maxime ea, quae acuta membranam infestant, remoueantur. Excidendum etiam, quidquid spinosum et intus emit. Saepe foramen non satis magnum est, ad extrahenda fragmenta, quare alia foramina, mediante morolo, facienda sunt, et eorum septa excidenda, donec intus datur intus laedentibus.

§. 560.

Quae medicamenta durae meningi et cerebro perdanda sint, infra docebo. Quia autem metus esse potest, ne os, quod perfractum et vecte excitatum sit, labet, ita caput deligandum est, ne illud iterum residat. Ob id super oras ossis, quod integrum mansit, fulcienda circumponendaque sunt linamenta panque multiplices, id autem, quod fractum est, saltem molliter contegendum, quo, dum caput fascia comprehenditur, ossis fragmentum minime prematur. A vero fascia opus est, quae capital maius dicitur.

§. 561.

Tandem etiam caluaria finditur (530), ex quo saepe incidit, vt intus arteria, vel vena rupta aliquid sanguinis mittat. Hoc autem si ex iis, quae aegri veniunt, et quae supra retuli (532. 534. ad 539), intelligitur, non protinus ad modioli usum veniendum est. Si enim rima patentior est, incisa cute humor per hanc educi potest. Et, si sanguinis parum effluxit,

effluxit, illum aliis auxiliis discuti posse, supra ret (551). In his itaque curationibus perseverandum erit, donec mala signa, caluariae sectionem necessariam esse, ostendunt, maxime, si haec non minuunt, sed increscunt. Super fissam vero fractamque caluariam emplastra, vel supra propositos saccellos (511) imponere, superuacuum, imo noxium, est, sine sanguinis detractioe. Calor enim extrinsecus imposedum medicamentorum humoris per rupta vasa exitum augere potest, et ipsum humorem citius in longinociorem putrescentemque conuertere. Necesse etiam est abstinentia, quies, et potus diluens, quibus diligenter seruatis, aliquando grauiore noxa sine ferramentorum usu auerti possunt.

§. 562.

Si vero increscentis morbi notae adsunt, haec differri debet haec efficacior medendi ratio, quam, ut experiri statutum est, necesse est, ut is, qui curare vult, omnem apparatus recte dispositum in promptu habeat. Sunt vero ex ferramentis: 1) Scalpellus, quo cutis inciditur et a caluaria deducitur; 2) Terebellum acuminatum, quo prius sinus exiguus fit, ut clauus recipiat; 3) Modiolus, seu ferramentum concavum, teres, imis oris ferratum, Trepanum recentioribus dicitur; 4) Per modiolum medium clauus, interiori orbe cinctus, demittitur, qui post, ubi iter modiolus impressum est, educitur; 5) Ferramentum, quo clauus ex modio educitur; 6) Terebra, quae in sinum quem clauus fecit, adigitur, et, qua ossiculum, et caluaria excisum, eiicitur (*Tirefond*); 7) Penna succisa vel specillum, quo foraminis altitudo exploratur; 8) Peniculus ad scobem, quae modio inhaeret excutiendum; 9) Scalpellus excisorius, qui retusus infra lenticulam habet, ad oras foraminis circumradenda

laeuandasque aptatus; 10) Vectes varii, maiores, minoresque, quibus ossis fragmenta, quae desiderunt, extrahuntur; 11) Membranae custos, seu *μνιγγόφυλλον*, quo dura meninx deprimitur, vt humor, qui sub caluaria est, exitum habeat **; 12) Penicilli plures, quibus humor, qui sub caluaria, vel cerebri membrana concretus est, extrahi potest; 13) Volsella, qua ossis fragmenta educuntur; 14) Scalpellus anceps, quo alias vena inciditur, quem, quia eo dura mater perit, linamentis inuoluunt, ne hominem aliosque laedat.

Sunt quidam ex recentioribus, qui forcipe vtuntur ad id aptata. Vide eius figuram ex SHARPIO fig. XII.

Apud veteres hoc nomen erat laminae aeneae firmae paululum resimae ab exteriori parte laeui. Haec demitti sic solebat, vt exterior pars eius cerebro propior esset, et subinde ei subiiciebatur, quod scalpello discutiendum erat, vt medicus scalprum excisorium malleolo audacius ferire posset. Vid. CELSVS Lib. VIII. Cap. III.

Recentiores Chirurghi apud Britannos vtuntur eo genere trepani, quod sola manu tractatur atque circumagitur. Vocant *Handtrephine*. Descriptum delineatumque iam suo tempore dedit SCVLTTETVS in *Armamentario chirurgico*.

§. 563.

Si vero foramen vulnusque deligandum est, ad id necessaria sunt: 1) Linteolum ex sindone in orbem contortum, quod intus demittitur et caluariae subiicitur. Hoc traiectum linum molle est, cuius capita inter deligata extra plagam relinquuntur, vt illud commodè tolli possit; 2) Puluilli in orbem contorti, seu maiores glomi, qui, in foramen iniecti, cerebrum, ne eo vitiata caro increseat, continent *; 3) Ad id idonea est lamina minor plumbea, crebris foraminibus pertusa, et vtrinque ansulam habens, in exteriori parte, quae cerebro propior est, laevis, quae foramen immissa etiam carnem, ne increseat, coercet **;

cet **; 4) Puluilli aliquot variae magnitudinis ad contegendum; 5) Pannus multiplex, quibus haec omnia conteguntur; 6) Ceratum, vel emplastrum; 7) Mantile, quod, si circa caput vinciendo circumdatur, capital magnum dici consuevit.

* Vid. fig. IV. ad §. 21.

** Vid. BELLOSTE c. I. Cap. XIII. p. 102.

§. 564.

Locus etiam quaerendus est, cui commodè aptus modiolus potest. Iam vero supra retuli, hoc tutius non esse, ubi intus in ipso osse maiores arteriae fursum procedant, id quod in anteriori et inferiori angulo bregmatisprehenditur (543). Nec minus id periculosum est, ubi arteriae, venaeque, per foramina communia insculpta feruntur, qualia inveniuntur in parietum summa et posteriori ossium bregmatis, iuxta futura per quas haec ossa inter se et cum osse occipitis committuntur. Nec futurae excidi debent, nisi ultimum necessitas medentem ad id cogat. Maius tamen periculum est, si exciditur futura sagittalis propter processum falcatum, et, qui hoc continetur, sinus, venosus, quam, si exciditur futura coronalis, vel, quae a graeca littera Λ nomen habet. Quia et hic processus, et in eo sinus, etiam sub osse coronali ad ethmoideum procedunt, nec frontis media, eaque pars, quae super id est, quod inter supercilia est, tutius perforari potest. In parte infima, supra orbitam, duplex est, et sinus habet, qui illud perforari haud sinunt. Os occipitis in media parte habet tuberculum, ubi et sinus ille, qui in septo cerebri, seu processu falcato, est, diuiditur in duos laterales, qui utrinque excurrunt, et illi septo inhaerent, quod cerebrum et cerebellum discernit. Sinus autem annexi sunt ossi, in quo eorum etiam vestigia impressa conueniunt.

ntur. Inferius occipitium pluribus musculis con-
gitur. Igitur nec huic ossi modiolus aptari potest,
i in summa, et non media, sed laterali, parte, quae
urae proxima est. Nec hunc ferre potest os, quod
fractum est et labare potest. Si vero caluaria fissâ
et rimam habet angustam, expedit hanc modio-
prehendere, ita tamen, ne clauus in rimam de-
ttatur, sed aptetur loco ab ea propinquiore. Rima
atius patet, vel, si os ense incisum est, et modioli
ratio necessaria videtur, hic aptari debet e latere
gae et interposito exiguo spatio.

§. 565.

Oportet vero ante omnia os nudari. Iam supra
cepi (549, cutim, vbi nulla plaga ex vulnere est,
os vsque incidi debere, idque commodissime fieri
bus lineis inter se transuersis ad similitudinem lite-
X. Nec vero alienum est, cutim duabus lineis
atis, quarum cornua sibi obuersa sunt, incidere,
partem orbiculatam vna secando excidere. Si iuxta
uram foramen faciendum, magis opportunum est,
im secare duabus lineis ad similitudinem literae T.
vero diuidendus est musculus crotaphites, prae-
enda est sectio, quae literam V repraesentat, sic, vt
tex eius in parte inferiori sit, basis vero in summa,
ad os bregmatis. Quae moderatio adhibenda sit,
uper ossibus fractis labantibusque cutis subsecari
et, alias retuli (549). Nimis durum videtur, mox
ulos sectae cutis forfice praecidere, praestat illos
nquere, et inter eos atque os linamenta ponere.
cesse enim est, vt prius sanguis ex facta sic plaga
ens prorsus quiescat, quam modiolus ossi admoueri
est, quare vulnus impositis linamentis, vel puris,
ex alcohol expressis, deligatur, et ipsa curatio in-
terum differtur. Si vero mala indicia, aegrum in
prae-

praecipiti esse, denunciant, haud expectandus alius dies est, sed quam primum id sanguis ex facto vulnere erumpens, qui etiam aliis auxiliis suppressi debet, permittit, caluariae sectio properanda est.

† Sunt inter Britannos, qui partium mollium orbiculum caluaria separant non ampliorem, quam ut modiolus commode imponi possit. A prolixiori enim earum separatione grauius saepe symptomata fieri. Iisdemque modiolis non adeo amplius adhibent, et contra eos dicunt, qui in pluribus utuntur, iisdemque cylindricis, secus quam Celsi manu, quorum Trepana figuram conicam referunt. Iisdem defunt inter eos, qui modiolum in fissurarum locis imponunt. Verum de hac eius applicatione PLATNERVS non perperam praecepisse mihi videtur.

§. 566.

Vulnere sic per noctem habito, curatio loco calido, lucido, et, si res id permittit, in conclauis, adhibenda debet amplo, cuius aer purus est et siccus, vel, si coelum graue et paludosum videtur, bonis odoribus et suffitu correctus. Foribus etiam pessulum obdeponendum expedit, ne perflatus sit, qui offendere patefactae cerebri membranam possit. Curatio hoc modo ordinatur. Homo, cui aures gossypio obturantur, collocandus est in lectulo, ita, ut capiti subiectus sit durus scorteusque puluinus. Is etiam, si satis valens est, consistere potest in demissiori sedili. Caput ministrum contineat. Chirurgus digitis prehendit modioli caput, seu manubrium, terebello acuminato (565, 562), quo prius sinus exiguus sit, qui clauum recipi potest, ut, eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit. Sunt, qui hoc negligunt et mox rem modiolus clauum habente agunt. Vbi vero modiolus circumactus est, eius clauus in illum sinus, qui terebello impressus fuit, demittitur. Summo vero capulo, qui mederi vult, imponit laeuam manum, et huic vultum frontem, vel mentum. Qui exercitatiores sunt, si

am manum imponunt. Si circumagendus est modiolus, is semper ab initio paululum in aduersam partem circumduci debet, et post ita agi, vt orae ferratae offi-
 primantur. Est vero quidam premendi modus, vt foretur et circumagatur, quia, si leuiter imprin-
 ur, parum proficit, si grauiter, non mouetur. At, si iam iter modiololo impressum est, medius clauus
 lucitur et modiolus per se agitur. Interea scobis,
 nae huic inhaeret, detergitur, et penna succisa, vel
 ecillo, foraminis altitudo, num illa vndique aequa-
 sit, exploratur. Si officulum excisum, terebra eiici
 bet, necesse est, vt haec, quae cochleae in modum
 orta est, illi finui, quem clauus fecit, adaptetur, ne
 iculum, si id terebra tollendum est, prematur et
 elidat. Scobis sanguinea significat ad diploen ven-
 m esse, quo tempore etiam os mollius esse, ex
 odioli motu, et ex strepitu, quem is facit, intelligi
 test. Sed tunc maiori cura agendum suspenden-
 que magis sinistra manus et lentius ducendus mo-
 ulus est: Subinde etiam foraminis altitudo, et num
 a vndique aequalis sit, examinanda. Si enim illud
 qua parte profundius est, in aduersam partem in-
 nari et paulo magis premi potest modiolus, quo id,
 od relictum est, prius excidatur. Vbi scobis iterum
 oida, et si haec, mediante penicillo (*fausse tente*
 2. 12), excussa est, orbis modiololo impressus inferi-
 obscurior esse coepit, et quasi coeruleus, intelligi-
 r, os fere perforatum esse. Igitur modiolus saepe
 ollendus omniaque diligentius exploranda sunt, ne
 inopinato perrumpatur, et ora modiololi ferrata
 dat cerebri membranam. Officulum vero tollitur,
 illa terebra (561. 6), vel forcipe ad id facta *
 561. 6).

§. 567.

Vbi sic caluaria perforata est, scalpello excisorio (561. 9.) foraminis orae circumradendae, et, quidquid spinosum est, et intus eminet, excidendum est. I vero ferramento, quod membranae custodem vocant (561. 11.), deprimitur cerebri membrana, quo exit detur humori intus concreto. Qui non effluit, euocari potest penicillis (561. 12.) donec nullum eius vestigium appareat. Non parum etiam ad excutiendum humorem confert, si aeger interea spiritum cohibet et tussiens sternuensque cerebri membranam commouet atque attollit. Quod si vero is sub dura meningem coit, necesse est, hanc scalpello (561. 13.) haud timide et ita incidere, ut plaga latius pateat. Arteriis tamen, quae per hanc membranam ferunt, parcendum est. Si qua sunt ossis fragmenta, vel remoueri debere, vel, si maiora defecerunt, citari, iam supra praecepi.

§. 568.

Si paruulum ossis fragmentum intus inditum, idque acutum, duram matrem vexat eique inhaeret, id saepe sine huius grauiori noxa tolli nequit. Melius est in hoc casu, membranam incidi, quam valentem trahi atque vellicari. Imo, si necessarium videretur, aliud foramen modiolis faciendum est, quo calvariae sinus latius pateat, et fragmentum commode tolli possit. Non raro id etiam fieri oportet, si maius fragmentum, quod totum perfractum est et laceratum, duramque meningem infestat, per foramen extrahi nequit. Si plura foramina facienda sunt, necesse est, ut prius alterius orbe comprehendatur. Sic et septa haud relinquuntur, quae scalpro excisorio malleo excidenda forent. Illud enim, quod sic relinquitur

uitur et ex ora eminet, sine negotio scalpello ex-
iforio tollitur.

§. 569.

Quod vero ad curationem attinet, quae adhiberi
ebet cerebri membranae, si illa patefacta, aut caete-
quin integra est, optimum esse duco, si linteolum
(63) purum, et super hoc etiam sicca linamenta im-
onuntur, praecipue, si non omnis humor euocari
otuit, quem sic linamenta bibere possunt. Alii
uris pollen inspergunt, atque id membranae, si ea
tegra est, inducunt, illud vero linteolo et linamen-
siccis contegunt. Expedita vero cognitio est, si
ura meninx inflammata vel alienata fuit ex colore.
inflammata enim rubet, et alienata albidior apparet.
tur, si illa inflammata est, linteolum, postquam per
amen demissum et cerebro inductum fuit, respergi
bet aqua vulneraria, cui parum ess. succini, masti-
is et croci adiici potest. Videndum vero, ne haec
edicamenta acria sint et cum sale tartari parata.
ecessse est, omnia simul adhiberi, in quibus aduersus
inflammationem periculosiorem auxilium esse alias
uli.

§. 570.

Si vero non dura mater tantum, sed id ipsum ce-
rum, aliqua parte corruptum est, et ex foramine
, vel sanies, vel alius corruptus humor, fertur,
erenda sunt medicamenta ad vlcus purgandum
nea. Optimum est essentia succini, cui aliquot
tulae olei terebinthinae admixtae sunt. Si vero
us valde impurum esse videtur, pauca essentia
rhae addi poterit. Si haec valentiora videntur,
i queunt aqua vulneraria. Commodus etiam est
or, quo Galli crebrius vtuntur, qui balsamum
auanti vocatur. Inimica sunt acria, aquosa, pin-
T 2
guia

guia et nimis digerentia. Optima sunt sic dicta spirituosae: nocere tamen possunt, si valentiora sunt, quod dura mater, quae valde nervosa est, iis nimium afficitur. Spirituum usu etiam omnem suppurationem cohiberi, alias retuli.

§. 571.

Si vero ulcus in cerebro est, et si hoc aere, vel medicamentis nimium mollientibus ac digerentibus alienatum, et si vulnere laxior vincitura adhibita fuerit per calvariae foramen, superque hanc ipsam, tum excrescit rarus, mollis, putris carnis instar, qui, cum celerius in maiorem molem augetur, fungus cerebri dicitur. Is auertitur euitatis his omnibus, ex quibus nascitur, et si in calvariae foramen, quod vel vulnere est, vel a modiollo factum, demittuntur minores atque paulo duriores glomi ex linamentis formati (563. 2. fig. IV.), et his imponuntur multiplices ac gradati panni. Multi etiam usus esse potest hoc casu illa plumbea et crebris foraminibus perforata lamina Bellostii (563. 3); Quae omnia, et si liquor illi spirituosus superhabentur et vulnus rarius ac celerius deligatur, cerebrum sic excrescere haud patiuntur.

§. 572.

At, cum fungus iam increvit, is scalpello periculi debet et respergi alcohol, quo etiam sanguinis profluuium supprimitur. Supra imponenda sunt linamenta ex spiritu mastiches et succini expressa. Nec vero est, ut, impositis linamentis, pannisque, addatur paulo adstrictior fascia, quo illud, quod iterum crescere potest, contineatur. Nonnulli medicamentis uti malunt ad carnem supercrescentem exedentibus idoneis. Ergo inspergunt pulverem ex aristolochia, sabina, caryophyllis, mastiche, olibano et vitriolo.

vsto, quae, quum acria sint, minus tuta sunt. Nam cerebrum grauitur afficiunt et magnam in eo suppurationem mouent.

† Fungorum causae fere hae sunt: 1) Aer diutius admissus. 2) Medicamenta pingua et mollientia. 3) Neglecta cerebri compressio moderata. 4) Purulenti humoris neglecta deterfio et repurgatio vlceris. 5) Multo saepius cerebri corticis irritatio a pungentibus spiculis ossium aut re aliena quauis. Causae igitur hae remoueantur; compressio vero linteis faciunda magnam moderationem requirit.

§. 573.

Quod si pura membrana, et aeger, sine malis signis est, caput sic deligatum contineri debet, donec foraminis ora, seu os, quod emortuum fuit, a parte sana recessit; id quod non protinus, sed interposito plurimum dierum spatio, fieri solet. Interim ossi nudato imponi debent linamenta ex alcohol expressa. Vbi tempus processit, os labare incipit, tandemque caruncula excrescit, quae intra integram atque emortuam partem subit, et id, quod inter ossa vacuum est, implet. Haec caruncula in callum duratur, qui quasi ossis cicatrix est. Sub finem vero callus, processu temporis solidatus, in os degenerat.

§. 574.

Quamdiu callus adhuc tenerior est nondumque confirmatus, qualis in corporibus imbecillis diu quoque esse solet, is contra ea, quae extrinsecus incidere possunt, tuendus est, imposita aurea, vel plumbea, lamella, vel etiam panniculo denso crassoque.

§. 575.

Reliqua autem curatio eadem est, quae in omnibus. Celerius, et quantum res permittit, rarius vulnera resoluenda sunt. Id bis per diem fieri, tunc saltem necessarium est, ubi magnus puris modus ex vulnere,

et praecipue ex cerebro, fertur. Omnia, quae vulnera superdantur, tanto magis ea, quae per effractam, vel excisam, caluariam demittuntur, prius calefieri oportet. Auertenda vbique aeris noxa est, cuitandaque sunt omnia, quibus vulnera infestari (391. 402. queunt. Nullibi magis necessaria est abstinencia victus tenuis, potiusque aquosior. Nec quidquam magis sanguinis missionem desiderat, quam si plaga capiti illata est. Quia vero metus est, ne sanguis erupta quadam vena missus sub caluaria coeat, expedit illum protinus, et nulla interposita mora, vel dubitatione, mitti, eius etiam quam plurimum detrahi. Neminem medentium hanc occasionem, qua plures qui in praecipiti sunt, seruari possunt, decet omittere.

VVLNERA FACIEI.

§. 576.

Vulnerum, quae in facie incidunt, non alia curatio est, quam, qualem supra praecepi (375. ad 390). Ea potissimum diligentia in his adhibenda est, ut cicatrix inducatur minime foeda, utque illa nec excrescat nec concaua sit, sed sanae cuti aequalis.

PALPEBRAE SUPERIORIS CASVS.

§. 577.

Vbi musculis, qui in fronte sunt, plaga transfuerat illata fuit, et haec cum oculo, qui sub ea est, ita deligatur, ut cutis multum inter se diducatur lataque cicatrix fiat, accidere potest, ut palpebra superior attolli nequeat, quod vitium *πτῶσις τῆ βλεφάρου* vocatur. Si vero illud accidit, ut pili, seu cilia, aut ipsum oculum obuertantur, *Φαλάγγωσις** nomen est. Hoc vitium etiam oritur, si musculus ille, quo superio

rio

ior palpebra tollitur, resolutus, vel transuersa plaga infectus est.

* Vid. AETIVS Lib. VIII. Cap. 68. p. 135. Edit. Ald.

§. 578.

Iam a vetustissimis autoribus * huic malo inuenta curatio est, qua cutis, quae in palpebra abundare videtur, exciditur et vulnus glutinatur. Quo vero haec curatio minus dubii habeat, recentiores instrumento vtuntur ad id facto **. Compositum est ex nobis argenteis bacillis, quae in altero extremo commissuram, per quam, velut per cardinem, clauus tractus est, in altero vero cochleam habent. Hac vltima mediante, bacilla, quae crebris foraminibus pertusa sunt, coarctari possunt. Eum vero, qui curaturus est, paulo considerare oportet, quantulo cutis detracto futurum sit, vt naturaliter se habeat palpebra; longiorem vero cutim istis bacillis ita includere, vt id, quod excidendum est, ex iis promineat. Prius vero transuerior palpebra debet, et acus minor, filum sericum ceratum ducens, per illa bacillorum foramina et cum ita transmitti, vt in quoque foramine filum paulo longius relinquatur. His constitutis scalpellus adhiendus est, et eo omne id, quod super bacilla palpebram continentia eminet, praecidendum. Vbi cutis detecta fuit, ita tollenda bacilla sunt, vt fila per palpebram traiecta in hac relinquuntur. Filorum autem capita post inter se deligantur et orae vulneris iunguntur. Super danda sunt medicamenta, quae glutinant. Optimum est, imponere linamenta balsamo de secha illita. Summa cura id, quod ita sutum fuit, continendum, quare etiam vterque oculus obligandus et per aliquot dies ita continendus est.

* Vid. CELSVM Lib. VII. Cap. VII. No. 8. PAVLVM et AETIVM l. c.

** Hoc primus delineauit GEO. BARTISCH in 'Οφθαλμοδραχμ. P. IX. Lib. XIV. p. 178. Lites de eo agitatae fuere inter RVYSCHIVM et RAVIVM. Vide RVYSCHII Epist. XIII. RAVII Responſionem ad deſenſionem RVYSCHII, ubi adiecta eſt figura.

§. 579.

Si vero oculus aperiri nequit, quia musculus relaxatus eſt, expedit, prius imponere medicamentum roborantia, linamenta ex ſpiritu (§. 81.) expreſſa, et hiſ ſuperdare ſacellos ex herbis roborantibus (§. 18). Si haec parum proficiunt, experiendae cantharides ſunt. Minimum enim emplaſtrum, quod ex iis compoſitum eſt, imponi poteſt mediae palpebrae. Veteres in hoc caſu ferramentum candens admouerunt, in quod vero circumſpectius fieri oportet, et demum prius in oculum lamella plumbea.

† Emplaſtrum veſicans e cantharidibus imponi poteſt mediae parti marginis ſuperioris orbitae, quo loco vel per foramen vel per inciſuram offis ramus nervus tranſit. In maxilla incipiente palpebra ſcarifari poteſt mediante lanceola. Aliquando ignis electricus prodeſt. GVERINVS paralyſin eius muſculi ſuſtulit per embrochem (*Les Douches*) aliter antea fruſtra adhibitis. ST. YVES ſuffimigia laudat. Poſſunt quoque vapores calidi rerum odoratarum et pauciorum per infundibulum aſcendentes palpebrae admitti. Alius homo curatus eſt emplaſtro compoſito ex cera et oleo tartari nigro, ut MANGETVS refert. CHANDLER Tr. de morbis oculorum laudat Unguentum paratum ex tinctura mari ſyriaci admodum ſpirituosa, cui ſapo, camphora et ſpiritus ſalis ammoniaci adijciuntur. Neque omittenda illa alia, quae intus aſſumpta corpus vniuerſum mutant. Sed de hiſ videant Medici.

ΑΛΓΟΦΘΑΛΜΟΣ.

§. 580.

Aliud vitium superioris palpebrae est, si illa parum descendit, ideoque oculum non contegit. Atque id quoque euenit, si vulnera collisa, vel in ipsa palpebra, vel in musculis, qui in fronte sunt, non recte fuere curata. Huic vitio mederi haud licet, si id in corpore tenui est, et quod cutim macie adductam habet, nec etiam, si multum palpebrae deest. Si vero corpus plenum, et parum palpebrae deest, id curatio restituere potest.

† Non modo vulnera palpebrarum, sed ambustiones quoque et abscessus sero incisi relinquunt cicatrices ita contractas, vt contegi oculus non possit. Malum hoc dicitur quoque existere a spasmō musculi attollentis, a paralyfi musculi orbicularis, ab abusu medicamentorum ophthalmicorum iusto magis adstringentium, et siccantium, a malo positu infantum in cunis, quo fit, vt ii oculos sursum attollant, et retro positas fenestras resque alias contueri conentur. Dicitur quoque aliquando a natiuitate adeoque connatum virium esse. Neque solum palpebrae superioris sed interdum etiam inferioris morbum esse HEISTERVS asseuerat.

§. 581.

In oculum, diductis palpebris, inferendum est cornu, (Gallis *emboitement*.) vel lamella plumbea. Necessè vero est, vt ante, quam haec in oculum demittuntur, is axungia quadam superinungatur et ei tenerioris vesicae (323) frustulum inducatur. His constitutis, palpebra adducitur, et cutis cum adipe infra supercilium inciditur, lunata figura, cornibus iuxta vtrumque oculi angulum deorsum spectantibus. Ea vero moderatio adhibenda est, ne et palpebrae cartilago, neque musculus, quo ea attollitur, laedantur. Vltimum enim si incidit, attolli palpebra non potest. Cutis vero sic incisa tantum diducitur, vt, hiante plaga, ima palpebrae ora paululum descen-

dat, In plagam vero coniiciuntur lamella plumbea prius ei aptata, vel linamenta sicca, quae, diductam cutim coniungi, prohibent. Oculus, impositis panis, fascia, quae paulo valentius adstringitur, comprehenditur. Est ferramenti quoddam genus, quo oculus multum comprimi potest. (*Fig. XIII.*) Ut tamen cauendum; ne ei, nimium his irritato, superueniat inflammatio. Si curatio bene cedit, cicatrix latior nascitur, quae, si eum locum impleuit, recte oculus operiri potest.

† Haec medendi ratio huic caussae singulari tantum accomodata est. Loco cornu aut lamellae plumbeae similis eboris apta est. Si spasmus subest aut paralyfis, adhibenda remedia his generibus affectionum dicata. Si abusus adstringentium siccantiumque nocuit, relaxantia, mucilaginosae, oleosa, pinguis adhibenda. Experiri quoque tum licet detractionem superioris palpebrae, aut, si vitium in inferiori fuerit, elongationem huius, digitis faciendam, et emplastris atque apta fascia, noctu praecipue, iuuandam.

E C T R O P I V M.

§. 582.

Nonnunquam inferioris palpebrae vitium est, quod parum sursum attollitur, sed pendet et hiat, neque potest cum superiore committi. *Εκτροπίω* Graeci vocant. Atque id euenit ex mala curatione, si ex cicatrice cutis contractior est. Aliquando intra sub palpebra tumores nascuntur. Nonnunquam infantes cum hoc vitio in lucem eduntur, quorum oculi digitis obstetricantium nimium vexati fuerunt. Illis senibus resoluitur quandoque musculus, quem orbicularem vocant. Si fistulae lacrymali efficacior chirurgia adhibetur, quandoque, vel scalpello, vel ferrum candente, cutis laeditur, qua palpebrae in oculi angulo interno inter se committuntur, quae res etiam *ἐκτροπίω* occasionem dare potest.

† Tumor

† Tumores illi vel circumscripti sunt, vel per totam interiorē palpebrae tunicam diffusi. Vtrique vel benigniores vel maligni et ad canceri naturam vergentes. Ex palpebra ulcerata etiam propullulant fungosae carnes. Hoc casu aliquando margo osseus orbitae latens vitium habet. Cuius si qua est suspicio, omnis externa curatio malum exasperat.

§. 583.

Si cutis contractior est, eadem ratio chirurgiae est, quam supra (581) posui. Plagae tantum cornua ad maxillas, non ad oculum, conuertenda sunt. Si vero vitus sub palpebra caro increuit, hanc ad imam radicem acu incurua perforare et post scalpello excidere commodissimum est. Excidenda est paulatim secando, ita, vt scalpellus acui, quae traiecta fuit, et ipsi oculo obuertatur. Sic enim acus oculum laedi non nit. Expedit vero sanguinem fluere pati, et, vbi is conqueuit, plagam scalpello altius concidere, imo ei remouere lapidem infernalem. Maior enim vis adhienda est, ne tumor iterum increseat et reuertatur. Summa etiam moderatione opus est, ne his adurentis oculus irritetur, quare prius necesse est, illum unguia, vel balsamo de tutia, superinungi, et vesicam ter eum ac palpebras inferi. Si musculus orbicularis resolutus esse videtur, experienda sunt ea, quae supra (579) posui. Nam, si ex aliis occasionibus vitium enatum est, illud nullam curationem recipit.

† Si morbus ex senectute atque adeo paralyfi oritur, CELSI consilium sequi possumus et tenui ferramento palpebram extrinsecus adurere, de quo vid. CELSVS L. 7. C. 7.

§. 584.

Ἐντροπίον est, vbi palpebrae inferioris ora oculo uersa est. Huic rarius mederi licet, si interior palpebrae tunica inciditur, et plaga ea ratione, qua posui, ducitur atque glutinatur.

† Huius morbi symptoma est ciliorum conuersio ad bulbum oculi, quae ab aliis quoque causis fit, quas enumerare longum

longum foret. Legatur A. C. CELSVS, AEGINETA, HER-
STERVS et CORTVM in *Dissertat. de Trichiast*, Traiecti
ad Viadrum habita.

SVTVRA PALPEBRAE.

§. 585.

Si tota palpebra vulnere dissecta est, ea sui pote-
Neceſſe vero est, vt prius, quam acus transmit-
tur, inter eam atque oculum inferatur lamella pluri-
bea. Haec, postquam suta est palpebra, tollitur,
in oculum coniicitur vesica, balsamo de tutia, et
parum balsami de Mecha admixtum est, illita.

VVLNERA OCVLORVM.

§. 586.

Si vulnere pertusa est cornea, vel sclerotica, omnis
humor ex oculo effluit, quem vero protinus ite-
rum renasci iam veteres haud ignorauerunt *.
nihil aliud vitii accessit, vulnus glutinatur, imponitur
albo oui et inserta inter palpebras vesica. In oculum
etiam coniici potest balsamum de tutia, cui parum
balsami de Mecha adiectum est. Neceſſe vero est,
oculus conquiescat, quare vterque oculus obligandus
et aeger in lectulo continendus est.

* Id GALENVS in puero viderat, qui vero hoc singulare
putauit. Vid. L. I. de Sympt. causis Cap. II. T. VII. p.
Praeterito seculo plures ludificatus est BVRRHVS, callio-
arcanorum venditor, qui de medicamento gloriatus
quo oculorum humores restitui possint. Vide eius Epito-
lam a THOMA BARTHOLINO editam.

† Quodcunque vulnus oculorum sit, omni diligentia cur-
dum est, vt aut nulla aut exigua tantum inflammatio
ueatur. Itaque ad ea, quae supra dicta sunt, recur-
dum est.

STAPH

STAPHYLOMA.

§. 587.

Aliud vero sub ictu oculi periculum est, ne, dum aqueus humor ex plaga corneae illata effluit, simul prolabatur tunica vuea, quod vitium, quia similitis figura acino fit, *σαφύλωμα* dicitur. Hoc si acciderit, quia cornea malo ulcere exesa est, lumen amittitur oculusque rumpitur, ideoque superuacua omnis curatio est. Si vero ex vulnere deuoluitur tunica vuea, seruari potest oculus, qui vero etiam non nimium distantem curationem desiderat.

§. 588.

Homo protinus resupinari debet, idque omne, quod ex vulnere prolapsum fuit, condi. Hoc commodè fieri potest specillo ex balaenaria virga secto. Quo melius vuea in sedem suam reducatur, oculus teniter premi potest. Si plaga angustior est, quam, ut id, quod prolapsum fuit, refundi possit, ea scalpello exiguo falcato incidenda est, donec satis pateat. Magna vero moderatio adhibenda est, ut, neque illa media corneae pars, quae pupillae obuersa est, neque prolapsa tunica, secando, premendoue, laedantur. Prius enim si incidit, cicatrix, quae relinquitur, aciem nebetat, et, si vuea premitur atque irritatur, periculosior sequitur inflammatio.

§. 589.

Postquam sic vuea restituta est, licet iis medicamentis non inutiliter uti, quae glutinandis oculorum vulneribus idonea sunt (586). Oportet etiam cum his inferi vesicam. Ad inflammationem vero auertendam ea curatio necessaria est, quam alias proposui (292). Quo vulnus citius coeat, oculus modice compressi-

primendus est, quare super linamenta extrinsecus oculo imposita dari potest plumbea lamina, et mediant fasciâ adstringi, vel aptari machina ad id facta *Fig. XII*

§. 590.

Ad hanc rem etiam pertinet, corpus recte iaceret, ut superior semper pars ea sit, in qua vulnus est. Igitur, si hoc inferius est, collocari homo supinus debet, coxis elatioribus, capite demisso. Si in lateri in id, ubi oculus integer est, si vero in summa oculi parte plaga est, oportet hominem fere erecto capite esse. Aeger continendus tamdiu est, donec vulnus glutinatum et in oculo renatus humor est.

§. 591.

Si enim id, quod elapsum fuit, iam vetustate alienatum videtur, altera curatio est, illud hamulo, vel filo traiecto, attollere et ad ipsas radices excidere, vulnus autem sanare, qua curatione vero omnis oculi acies corrumpitur.

† Staphylomatis vocabulum datur diversis generis vitiiis corneae. Quidam habent pro dilatatione tunicae huius factam ab abundante humore aquo. Alii hanc causam rariorem esse dicunt, multo saepius vero corneae substantiam vitiatam in omni ipsius ambitu vel in loco circumscripto crassiorem esse. De his omnibus legatur AVG. GOTTL. RICHTER *Dissert. inserta Comment. Soc. Reg. Goetting. T. VI. aut ea excerpta in eiusdem Viri Cl. Bibliotheca Chirurg. T. II. P. IV.* Digna etiam lectu sunt, quae scripsit IANIN l. c.

VVLNERA NASI.

§. 592.

Naso subesse ossa atque cartilaginem, nemo ignorat. De ossibus fractis infra dicendum. Cartilago vero cu haud tuto traicitur, quare, si futura necessaria est, sola cutis ea comprehendere debet. Inimica ob id etiam sunt omnia medicamenta pingua et nimium digerentia. Magis opportuna est essentia balsamica. vero interior membrana, quae a pituita nomen habet, laesa fuit, intus iniici, vel naribus duci, debet qua vulneraria, cui adiici essentia succini potest, vel eius liquor, ad haec opportunus.

§. 593.

Nasum penitus praecisum iterum glutinari posse, nonnulli prodiderunt *. Alii annisi sunt, ut hunc, vel ex ipsius hominis, vel ex alius, cute, ex brachio eorumque, excisa adductaque sarcirent **.

* Adducitur Historia ex HENR. MOINICHEN Obseru. Med. c. LYSERI Cultro Anatomico editis Obs. 23. p. 212. Hic enim testatur, ANTONIVM MOLINETTVM in praelectionibus de patre suo, Chirurgo Veneto, prodidisse, eum, cuiusdam, qui hanc scelerum poenam pertulerat, nasum abscissum, calente pane per medium fisco excepisse, et injecta futura glutinasse. Sed MOLINETTVS in Dissert. Anat. Pathologicis L. IV. Cap. XII. p. 174. nullam huius curationis mentionem facit, id autem affirmat, se Anno MDCXXV. vidisse *nares* a parente nobili Polono *elegantissime resarcitas*, (haec eius verba sunt). Illa historia, quam GARENGEOTTVS *des Operations* T. III. Obs. VI. p. 55. proposuit, fidem auctoris non parum imminuisse videtur.

De historia ista a GARENGEOTTO proposita non multo mitius iudicium tulit EL. COL DE VILARS, scriptor Chirurgiae haud ignobilis. Sed eius Translator Auctorem praecipitati iudicii coarguit. Alseuerat enim, hominem eum ipsum Parisiis vidisse se, et ab eo didicisse, vera utique esse quae scripserit GARENGEOTTVS, h. e. nasi mucronem sibi dentibus mordicus ablatum, in profluentem in platea proiectum, pede calcatum, sordibus conspurcatum, aqua frigida ablutum atque detersum, a Chirurgo vicino futura dextre

dextre applicatum retentumque coaluisse 'pristino loco e concreuisse feliciter. Vid. ELIAS COL DE VILARS *Vollständige Einleitung in die Chirurgie, übersetzt von HEINR. FR. PETERSEN*, T. II. p. 238. Quaecunque et quantumcunque pretium huic asseuerationi aliquis statuatur, arripio tamen hic oblatam opportunitatem monendi, ne vel nasi vel alius cuiuscunque partis humani corporis particulam secando irresectam, ut per paucas tantum fibrillas cum reliquo corpore cohaereat, velut inutilem neque concreturam protinus tollere atque abiicere velit. Potest enim nisi tempus saepe tamen seruari et conglutinari. Neque huius generis curationes aliae praeter illam desunt. Ipse ille PETERSEN papillam mammae muliebris morsu ablatam, dicitur postea loco appositam et concretam ab se visa esse l. c. refert. Dentes sanos errore chirurgi extractos protinus alueolis suis redditos repositosque saepe demum stabiles fieri experimentis credimus. Atque in animalium brutorum et vegetantium generibus obuia sunt facta quidam, quae, ablatas prorsus partes animantium denuo coerefcere et seruari posse, luculenter demonstrant.

** De hac curtarum narium curatione legi meretur GASPAR TALIACOTII *Chirurgia curtorum per insitionem*, liber, qui certe egregia et eleganti doctrina abundat. Sunt vel plures, qui putant, omnia, quae in eo proposita sunt commentitia esse et iactandi ingenii causa a TALIACOTIO scripta. In horum numero fuit IOH. ANDR. A CRUCE *Chirurgia* T. II. L. II. Cap. III. p. 32. Quo minus vel cum eo aliisque sentiamus, vetant testimonia praestantium morum et fide dignissimorum Scriptorum. Teste enim CORTESIO in *Miscell. medicis* Dec. III. p. 83. TALIACOTIVS hanc artem accepit a Turpiensibus medicis ex Boia Familia natis, in qua, ut olim medicina in familia Asclepiadarum, haec ars, a quodam PETRO BOIANO inuentum tradita fuisse dicitur. Et ipse TALIACOTIVS, se hanc rem non inuenisse, sed a medicis quibusdam in Calabria accepisse, fatetur in praefat. Etiam acriter contra eum pugnat, qui, artem vanam esse, sibi aliisque persuadere L. I. Cap. XVII. p. 44. Adducit autores plures, qui eius veritate ante tempora, quibus ille scripsit, testimoniorum grauia dederunt, ALEXANDRUM BENEDICTVM, VESALIUM PARAEVM, GOVRMELENVM, SCHENCKIVM Cap. XIX. 49. Imo rem experimentis a se factis confirmat L. I. Cap. XXIII. p. 69. Etiam in Epistola, quam ad MERCVRIALEM dedit, et quae in huius Libro de Decoratione, Cap. XVI in Edit. Francofurti Anno MDLXXXII. impressa legitur, plures nobiles viros nominat, quibus a se nares restituisse asseuerat. Atque non solum MOLINETTVS c. l. I. et FIENVS in *Chirurg. Lib. XII. Cap. I.* et HILDAN

Cent. III. Obs. 31. p. 214. et in Epistola ad IOH. GRIFFONIVM in Epist. Cent. Ep. XXII. quem propter hanc curationem puellae feliciter adhibitam laudat, testantur, se tales homines vidisse, quibus factae fuerint et restitutae nares. Conf. G. F. DE FRANCKENAV Diss. med. de Restitut. in integrum, Sat. Med. p. 501. SALTZMANNI Diss. de Chirurgia Curtorum Anno MDCCXII. et H. A. R. Sc. MDCCXIX. p. 36. TALIAOTIO in Theatro Anatomico Bononiensi statum positam esse dextra nasum tenentem, reliquit WAGENSEIL in Exercit. varii argum. p. 61.

VVLNERA MALARVM.

§. 594.

Malarum vulnera, si altiora sunt, sui debent. Aliquando accidere solet, ut parotidis canalis, cui nomen a Stenone est, vulnere discissus sit. Is enim dicta glandulaeductus fertur super masseterem musculum, per musculum buccinatorem penetrat, et attingit alterum, vel tertium, dentem maxillarem superioris maxillae ori inseritur. Cum hic salivae ductus discissus est, humor multus, tenuis, dilutus ex vulnere effluit et illud glutinari haud finit. Quare vulnus tantum in vlcus degenerat. Saliva eo tempore copiosius effertur, quo homo loquitur, vel cibos mandit maxillam movet.

Vid. STAHLII Theor. medicam. p. 720.

§. 595.

Hoc, si, vel ex vulnere, vel ulcere, incidit, salivae nova via in os aperienda est. Ergo subula, vel ad ferramentum acutum mucronem habens, in vulnus ita demittendum est, ut membranam buccinalem, qua os ab interiori parte finitur, transeat. Intus aliquid laedatur, necesse est, ut is, qui membranam vult, digitum in os demittat et obiciat mucroni. Plagam sic factam, mediante specillo, vel acuta auersa, traiecitur filum ex serico paulo valentius

tius et tortum, quod in ea relinquitur. Quia necesse est, vt interioris vulneris orae occallescant, os crebrius spiritu ardente perluendum est. Callum satis durum esse, intelligitur, si in vulnere nullus sensus est. Quo vero saliuā ad interiora feratur, educendum filum et lapide infernali non nisi exterioris vlceris callosus erodendus est, relicto interno. Vbi vero sic vlcus exterius in mala purum factum est, necesse est, illud comprimere et superdare glutinantia, quo saliuā in defluat. Si vulnus mox penetrauit, vel, si illud coactum est, filum non, nisi sub finem curationis, immitti debet. At vero, vbi cicatrix inducenda est, oportet aegrum, nec loqui, nec cibos mandere, nec buccas inflare.

* Vid. CHESELDENS *Anatomy* Lib. III. Cap. III. p. 13. ALEXANDER MONRO in *the Medical Essays* Vol. II. Cap. XIII. p. 249. Mihi notum est exemplum, vbi vulnus recens scalpello tenui acuto illatum, et ex quo copiosior saliuā exiit, impositis pannis, et adstrictiori fascia breuiter curatum. Opinor, ductum saliualem, quamuis vix exiguus is sit, fuisse non discissum, sed incisum.

† Si oris interioris membranā vulnus non transit, igitur faciendum in ea est, id in vulneris exterioris paulo inferiori fieri debet et decliuē quidem ad internum. De huius generis curationibus plura videantur in *Method. Acad. Chirurg. Paris.* T. III. p. 436. et alibi.

AVRIVM VVLNERA.

§. 596.

Auris quandoque vulneratur, cuius maior pars cartilaginosa est. Vulnus, si recens est, adcohere potest, et protinus glutinari. Si futura opus est, sola cutis, non vero cartilago, comprehendi debet. Si vulnus iam alienatum fuit, necesse est, vt a cartilagine aliquid, velut ab osse, abscedat, quare superius debet esse mastichis, succini, elemi. Si tota auris scissa fuit, homo grauius audit. Leuamen ad

cochlear

ochlea caua ex metallo confecta, qua aeris tremores colliguntur, augenturque, et ad interiora perferuntur.

LABRORVM VVLNERA.

§. 597.

Labra, si vulnere dissecta sunt, difficilius sanescunt, quod illa, dum cibis assumitur et sermo explicatur, multum commouentur. Experiendum est emastrum glutinosum, et seruanda quies atque abstinentia. Si vero plaga maior est, vel aliquid mutilatum fuit, ad illud futurae genus veniendum est, quod artis labris, et sic dicto labro leporino, adhibetur.

LABRVM LEPORINVM.

§. 598.

Non raro enim pueri nascuntur, quorum mediis labris aliquid deest. Fere semper hoc vitium, si vterque est, in supremo labro esse solet. Cum labro am quandoque maxilla ipsumque palatum fissum est mutilatum, ex qua re magna deformitas oritur.

§. 599.

Curatio, quae huic vitio adhibenda est, impedit, ut minus infantes lactantes mammam sugere possint, are ei haec aetas haud idonea est. Differri minimum debet, donec pueri a lacte depulsi sunt. Vagitus iam nocere multum potest.

§. 600.

Ratio curationis eiusmodi est. Orae labri fissi inque forfice praeciduntur. Illae enim inter se coire nequeunt, nisi naturam recentis vulne habeant. Magna vero cura cauendum est, ne ni-

miun cutis praecidatur. Forfice etiam nullum etratum mucronem habente inciditur illa membrana qua labri summa pars cum gingiua committitur. etiam in suprema parte aliquid ex ora relictum fuit, vel forfice concidi, vel scalpello praecidi, debet. Factis, cutis vtrinque digitis premitur et adducitur. Videndum vero est, vt recte inter se committantur orae exasperatae, ne deformis cicatrix fiat. Per hoc itaque, mediante ferramento ad id facto, (379) trahuntur acus acutae, et quidem in pueris duae, in adultis quandoque tres, quae in labro relinquuntur.

§. 601.

Acuum vero plura genera sunt. Ferreae optime sequuntur. Sed cum in vulnere relinquuntur, rubi ei nocere potest. Ideo praeferri debent, quae ex auro fiunt crebrioribus mallei ictibus indurato. Dum trahuntur, expedit, inter labrum et gingiuam demittere laminam plumbeam. Prima acus per supremam labri partem transmittitur, vltima per imam. Ita vltimae immittendae sunt acus, vt orae sibi aequales fiant. Melius autem cutis, quae adducitur, sequi potest, malae manibus famuli premuntur. Vbi acus sic trahuntur, iectae in labro haerent, circumuoluitur linum, quod orae, ne iterum diducantur, valentius continent. Si acus longiores sunt, et metus est, ne illae cutem offendant, forcipe praeciduntur, et earum extremitates emplastrum, aut linamentum, submittitur. Nonnullae vero imponuntur medicamenta, quam, quae suto vniuersi idonea alias praecepi (381).

§. 602.

Sed haec curatio quasdam etiam animaduersiones desiderat. Vbi ex praecisis oris sanguis fluit, is summi nullo medicamento debet. Sponte enim coagulat quod

uiescit, postquam orae adductae et sutae fuerunt. auendum vero, ne is ab aegro deglutitus vomitum fiat, vel spiritum intercludat, quare caput sublime abendum, quo sanguis ex ore possit efferri, id quod praecipue obseruandum, si infans curatur.

§. 603.

Nonnunquam aliquis ex prioribus dentibus multum prominet, qui prohibere potest, quo minus orae nescere et glutinari possint. Igitur is, antequam ratio suscipitur, euellendus est. Ne etiam labrum gingiua post curationem inter se cohaereant, intus uri et inter vtramque. partem demitti linamenta debent. Quia vero haec varium humorem bibunt, non vulnus alienari potest, necesse est, ea frequentius mutari. Minus haec opportuna sunt infantibus, cum attur obstruere et spiritum intercludere possint, vel his quandoque deglutiantur. His confert, plumum, melle, vel alio medicamento ad id idoneo, mantentem, crebrius intus demittere, et sic prohibere, quo minus illae partes inter se coalescant.

§. 604.

Si vero, praecisis oris, vulnus valde, et adeo hiat, illae contrahi satis nequeant, alia experienda sunt. Emplastris glutinosis, quae malis imponuntur, adsuuntur vtrunque fibulae, per quas transmittitur linum, quod, valentius adductum, oras vulneris ita iungit, ut se contingant. Per ea emplastra etiam plura fila transmitti et eorum capita inter se deligari atque stringi queunt. Alii vtrunque cutim figura vel liana lunata, et ad vulnus conuersa incidunt, et huiusmodi as inter se multum diducunt, quo cutis, dum ad glutinandas prioris vulneris oras attrahitur, sequi possit. Super lineam illam incisam dant linamenta,

vel lamellam plumbeam, vt caro increſcat, eamque impleat, vtque cicatricis latitudo aliquid cutis praefare poſſit.

† De hac ratione curandi perite expoſuit A. C. CELSUS l. c.

§. 605.

Filum, quod circa acum voluitur, inceratum eſt oportet et ſatis valens. Neceſſe vero eſt, vt quaelibet acus proprium filum habeat, quo illae, glutinatae inter ſe oris, ſine negotio poſſint educi. Faſcia praeter aliis idonea eſt, quae fundae figuram habet. Ea vero iniectam ante quartum diem reſolui haud decenter nec prius futuras eximi, quam orae fuerunt glutinatae. Hoc fere quinto vel ſexto die eſſe ſolet, quo acus labare incipiunt. Vbi educuntur, digitis comprimendae orae ſunt, et ſumma moderatio adhibenda, ne id quod glutinatum fuit, diducatur. Nec expedit, vt die omnes acus extrahere, ſed prius ſupremam, vt mediam, et poſt etiam inferiorem, Vbi illae eximuntur, linum etiam commode tollitur. Poſtquam aceductae ſunt, panni oblongi gradati ſuperimpoſui poſſunt et his iniici habena medio in longitudine incifa, quam faſciam vnientem vocaui (15. 375).

† Vt felix curatio fit, haec neceſſaria ſunt: 1) Commoc poſitus chirurgi et hominis curandi. 2) Solutio fraenae uſque ad finem fiſſurae in labro. 3) Calloſae cutis reſectio ad apicem uſque, vt omne calloſum, neque tam quicquam praeter id, reſecetur. 4) Acus duae vel triquetrae, et rectae nec nimis craſſae. 5) Harum in cernis oris applicatio diſtans vna linea geometrica marginibus, et 6) earum tranſitus per duas tertias ſubſtanciae labrorum. 7) Fila incerata circumuoluuntur acubus vel in orbem vel in modum cyphae ∞. Si quid ex oris maxillari ſuperiori deſit, et nihilominus curatio admittitur, 8) inter labrum et gingiuas immitti debet puluinae linteo, quod ſilum longum affixum extrinſecus habet, ne ipſum fortaſſe deglutatur. 9) Inter acus extrinſecus et labrum vtrinque danda lintea carpta, ne ab acubus premantur oris foraminum. 10) Ori cruentatis et adeo acubus impone

da lintea carpta ficca. 11) Desuper! emplastrum habens capita quatuor adglutinanda genis. 12) Vtrinque splenium fatis crassum labri angulis versus medium, quam fieri potuit adductis. 13) Haec omnia contegit et firmat fascia, illa, cuius capita in nucha firmantur. 14) Altero die linteis illis instillari potest aqua vulneraria. Omni tempore curationis attente obseruandus est homo ita curatus, atque cauendum ne risus, ploratus, tussis, vomitus, sternutatio fiat. Neque omittendum est, esse, qui eam suendo administrandam curationem reiiciant. Vide de his *Monum. Acad. Chirurg. Parisiens. T.*

LINGVAE VVLNERA.

§. 606.

Rarum non est, linguam vulnerari, id quod, vel telo et gleba plumbea, vel ipsius hominis dentibus, fieri solet. Haec res cum dolore etiam hanc habet molestiam, quod sermo prohibetur et cibi maniac deglutiri vix queunt. Linguae vulneratae non ita superdanda sunt medicamenta, quam, quae sine ulla deglutiri possunt. Essentia succini paruo sachari crustulo excipienda linguae imponitur. Si vero ardor etque dolor vrgent, magis commodum est, oleum mygdalarum dulce cum sacharo miscere, et ei essentiam modo dictam aduicere. Nec, praecipue vulnere colliso, alienum est mel rosatum, cui etiam essentia balsamica commode admiscetur. Os crebrius elui potest decocto, quod et naturae vulneris et tempori inflammationis accommodatum esse debet. Salua, qua vulnera purgantur, non parum ad curationem confert. Si lingua inflammatur, ea altius concidenda est. Nec illud ignorari debet, non aliam fere partem in vniuerso corpore cancro magis opportunam esse, quam linguam et vtrumque labrum.

† Si vulnus linguae tantum est, vt longo maxima eius pars transuersim vel etiam oblique diuisa sit, neque igitur labia vulneris sese contingere queant, proponitur quidem a

multis futura iniicienda, sed quia haec neque facile fit et dolores in parte ea sensum acutum habente mouet praestare videtur curatio ope burſae deſcriptae in *Monument Acad. Chirurg. Pariſ.* T. III.

RESOLVTIO LINGVAE.

§. 607.

Eſt chirurgiae quoddam genus, quod adhiberi debet pueris, quibus a primo natali die lingua cum ſubiecta parte iuncta eſt, et qui ob id nec ſine moleſtia mammam fugere, nec, vbi adoleuerunt, verba recte formare poſſunt. His membranam, qua lingua inhaeret, ſcalpello reſecari oportet. Quo vero hoc ſine periculo fiat, et ne maiores venae, quae ſub lingua ſunt, vulnerentur, linguae ſubmittitur ferramentum in extrema parte inciſum (*Fig. XIV*). Hac inciſura excipitur illa membranula, frenulum vocant quam forſice incidunt. Eſt aliud ferramentum (*Fig. XV*), cui ſcalpellus minor affixus eſt, qui elatere mouetur. Hoc, ſi in os inferitur, et lingua attollitur et venae cuſtodiantur, et preſſo elatere membrana illa ſine periculo inciditur.

* CICERONI haec chirurgia cognita fuit. Vid. L. II. de Diuinatione Cap. XLVI. T. IV. p. 1120.

† In regionibus quibuſdam mulierculae multa crepant de neceſſaria linguae reſolutione. Itaque notas ſcire decet, quae fraenulum nimis adſtrictum eſſe aut non eſſe docent. Infans, qui mammas ſine moleſtia fugit, recte conformata habet hanc partem. Non ideo tamen male conformata ea eſt, quia infans cum moleſtia fugit. Nutricis enim mammae aut papillae parum peruiuae moleſtiam eam creare poſſunt. Non recte conſtituta videtur ea pars, ſi infans ſub clamore linguam neque palato apprimat, neque ſuper labrorum exſerit; itemque ſi lingua ſub clamore anteriora non oualem figuram reſert, ſed quaſi biſida eſt. Nam vitium id fere in fraenulo nimis longe ad apicem linguae procurrente cernitur.

CALCVLI SVB LINGVA.

§. 608.

Calculi sub lingua in ductibus salivam ferentibus nonnunquam concresecunt, qui, vbi grandiores sunt, summos dolores mouent. Necessè est, eos, aciculis scalpello membranarum, excutere et vulnus glutinare. Nam et huius vulneris curatio in prioribus posita est.

CERVICIS VVLNERA.

§. 609.

uenire potest, vt musculis, qui in ceruicibus sunt, et quorum actione caput sublimè habetur, ensè tius incidantur. Hoc si incidit, caput in anteriora colabitur, et attolli nequit. Nec illud contineri potest, sed opus est fascia, quam *Diidentem* appellant*.

* Vid. HEISTERI Chirurg. P. III. C. III. p. 1197. Tab. XXXVII. BASSIVS Tab. IX. fig. I. a. Longè tamen melius hæc fascia caput continet, si ei additur alia habena duarum circiter vlnarum. Hæc prius capiti ita imponitur, vt fines vtrinq; a fronte et a ceruice dependeant. Super hanc fronti iniicitur alia longior fascia in duos fines, seu capita, glomerata, eaque media. Capita, quæ in vtramque partem ducta in ceruice decussant, illam dependentem habenam comprehendunt et sistunt. Procedunt fasciæ capita, et dexterius sinistra, sinistrum dextra sub alas fertur, a quibus iterum per pectus ad ceruicem tendunt. Priusquam vero eo perueniant, retro dandum est id, quod ex habena a facie dependebat, quod etiam fascia, cuius iterum vnum caput super alterum fertur, comprehenditur. Fasciæ capita ad hominis caput reuertuntur, et circa hoc voluuntur, a quo per ceruicem ad alas descendunt, tandemque in diuersa ducta pectus amplectuntur et finiunt. In ceruice illa habena decussanti fasciæ adsui, vel acu adfigi, potest.

VVLNERA COLLI.

§. 610.

Collum etiam multa periculi plena vulnera recipit. Nam in nulla corporis sede tot et tam variae partes sunt ad vitae vsum necessariae, quam in collo. Praeter nota enim corporis tegumenta ac plures musculos, sunt variae glandulae, illa maior thyroidea et praeter hanc, aliae iugulares et ceruicales, trachea cum larynge, stomachus cum pharynge, arteriae carotides, quae sub maxillis in internas externasque diuiduntur, venae iugulares, superius etiam in internas externasque diuisae, arteriae et venae vertebrales, quae ab utroque latere per vertebrarum processus, in ceruice tenuibus cauis peruios, feruntur. Nervi parioctauum, ab hoc recurrentes **, nervi intercostales *** ceruicales, et ex his phrenici alique, os hyoides, vertebrae, et, quae per has medias fertur, medulla,

* Vid. CONR. GRAFII Dissert. de Casu Autocheiriae, Giesae MDCCXII. In hac historia vulneris legitur, quod sub *αὐτόχειρ* intulerat, in quo collum ab auricula sinistra ad dextram incisum, et praecisus fuit larynx, non totus praecisus, aut incisus stomachus, carotis externa, duae iugulares externae etiam affectae. Nihilominus vero homo ad duo decimum usque diem superstes fuit. Similem fere casum retulit LA MOTTE Chir. T. II. Obs. 212. p. 519.

** Vid. de nervo recurrente vulnere dissecto GALENVS de Locis affectis L. I. Cap. VI. T. VII. p. 396. et LA MOTTE c. l. Homo verba quidem ore explicare potest, aut sub furda, et suppressa voce. Experimenta in brutis facta vid. in GALENO de Praenot. ad Posthumum Cap. V. T. VIII. p. 837. confer *the Medical Essays* Vol. II. Obs. VIII. p. 114.

*** Vid. experimenta, quibus nervi paris vagi et intercostales in animalibus praecisi fuere in Com. A. R. S. MDCCXXVI. p. 96.

§. 611.

Haec vulnera oculis subiecta sunt. Ipsae vero sedes, quas ex Anatomia discimus, indices sunt partium.

um percussarum. Scire etiam possumus ex iis proprietatibus, quas alibi proposui, (362 ad 368. 370.) ex quibus, vel spes, vel desperatio, oriatur, et quae promptiorem, quae difficilem, quae nullam, curationem habeant.

§. 612.

Homo, cui arteria carotis, vel, ubi ea diuisa est, cuius interior ramus, praecisus est, seruari nequit. Exterior, nec non vena iugularis externa, deuinciri possunt, vel comprimi (405 ad 409). Existimo etiam, nullam curationem superesse, si vena iugularis interna rauiter vulnerata fuit. Vtrum homo, deuincta hac vena, superstes esse queat, in dubio relinquo. Minus ea vulnus digito potest comprimi, donec illud glutinetur. Quibus ante diuisionem, vel carotis, vel iugularis, praecisa fuit, eos plerumque mors celerrime, et antequam chirurgus acciri potest, rapere solet.

§. 613.

Quibus aspera arteria tota praecisa fuit, iis nullo modo succurri potest. Si vero illa percussa non ita magnum vulnus habet, id potest glutinari. Magna diligentia adhibenda est, ne ex vulnere sanguis, vel medicamentum, vel aliud quid, in asperam arteriam elabatur. Nam, hoc si incidit, tussis vehementissima hominem vrget et strangulat. Orae vulneris adduci debent et iniectis medicamentis glutinantibus curari. Ubi vero vulnus non tantum discissum, sed etiam colatum est, necessaria sunt digerentia, quae locis nervosis idonea dixi. Ante omnia vero caput debet inclinari et ad pectus adduci, sicque inclinatum in lecto amdiu haberi, donec vulnus ad sanitatem perductum sit.

BRONCHOTOMIA.

§. 614.

Nonnunquam autem, si spiritus propter angustias per quas is euadit, intercluditur et homo stragulatur, aspera arteria perforanda est. Hoc praecipue incidit in angina, et si per glottidem seu rimulam quae in larynge est, aliquid in asperam arteriam delapsum fuit, quod tussi excuti haud potest.

† Hac chirurgia opus esse potest, si cynanche remediis non cedit et suffocationem minatur, si ab lingua nimium tumida idem periculum instat, aut tonsillae tumidae et scirrhus, vel polypi nasi alte in fauces descendentes, vel polypi oesophagi curatio per constrictionem vinculo facendam administranda est. Sed si in grauiori cynanche haec chirurgiam administrare velis, mature satis fiat; omittatur si pulsus iam et mollis et debilis valde atque intermittens iam frigent artus; item si ex summa pectoris oppressione et anxietate, orthopnoea et tussicula suffocante inflammatio pulmonum patet.

§. 615.

Homo collocari debet in demissiori sedili. In posteriore vero parte minister caput eius multum reclinatum contineat et immobile praestet. Sub larynge et huius cartilagine cricoide inciditur cutis cum aliqua glandulae thyroideae parte, et deoperitur aspera arteria. Sanguis, qui ex facta plaga fertur, spongia alcohol madefacta extergitur et supprimitur. Vbi vero glandula thyroidea inciditur, vulnerari haud debet vena illa, quae antea super asperam arteriam fertur ne ea sanguinem fundat. Nec laedendi sunt nervi recurrentes, qui e latere sursum ad laryngis musculos procedunt (610 **). Inciditur vero membrana, quae inter tertium quartumque circum cartilaginofum media est. Etiam cartilaginosi circuli sine maiori periculo incidi possunt, quos tamen integros esse satius est. Ea diligentia adhibenda, ne maucro scalpellum

elli, vel specillum, vel aliud quid, illam membranam irritet, qua aspera arteria ab interiori parte finitur, eque per factam plagam sanguis in eam feratur, cum haec res vehementissimam tussim mouere possit.

† Locus, in quo homo ita curatur, frigidus ne sit: ab aere enim frigido ad sensiles partes illas admissio irritatio et tussis fit.

§. 616.

In vulnus itaque, quod factum est, suspenso manu mittitur specillum, super hoc iniicitur argentea tula, aut recta, aut incurua, quae recuruatis in anteriorem partem labris, vel circumcingente quadam remora esse debet, ne tota intus delabi possit. Remora latere debet vtrinque forata esse, quo fistula commode ad collum alligari queat. Alii per cutim, glandularum atque asperam arteriam, mox ferramentum traiciunt, quod cannulam habet. Id enim prorsus simile est ei, quo aqua hydropicis emittitur (*troisquarts*). Haec curatio promptior, minus vero tuta est. Importatur protinus fistulae spongia ex vino calido expressa, ne aer nimis frigidus, qui pulmonibus noxius est, intraret, eosque offendant. Ob hanc causam etiam is, qui curabitur, in conclauis calido esse debet.

† Chirurgia haec semper sub ea sede, ubi impedimentum aeri transituro oppositum est, fieri debet; eaque nihil prodesse potest, si vel bronchia inflammata sunt, vel res deglutita ad ima gutturis descendit. Fieri autem ita debet, ut ne quid sanguinis destillat in tracheam. Cauendum igitur est, ne glandula thyroidea secetur. Itaque si ea descendit in eum ipsum locum, ubi guttur aperiendum est, secta cute reprimi debet. Ne emphysema oriatur ab aere in cellulositates ingressuro, locus, ubi trachea pertunditur, ab iis atque musculis liberari debet. Quo ipso et hoc consequimur, ut immissa post fistula tutius haereat, neque a tumentibus partibus foras trudatur vrgeaturque. Rationes tracheam aperiendi a PLATNERO aliisque propositae variis incommodis impediri cum videret RICHTERVS, nouum machinamentum, idque magis idoneum inuenit, quo vna enchiresi et pertusio tracheae et immissio fistulae fiat, tam apte

apte quidem, vt haec tuto sedeat, atque aeris inspiratum flumen non recta in parietem posteriorem tracheae incurrat. Habet lanceolam crassam et recuruam in canalem aequo plano reconditam sic, vt eius mucro per spatium lineae geometricae vnus nudus sit. Vfus autem facile intelligitur. Non enim differt ab vsu acus triquetrae alio occasionebus adhiberi solitae. Vid. de his *Noui Commentarii Soc. Reg. Sc. Goetting.* aut *Biblioth. chirurg.* viri clariss. T. III.

§. 617.

Fistula in vulnere relinquitur et ad collum adstringitur. Inter oram fistulae et cutim ponuntur linamenta, super fistulam vero iniicitur emplastrum parvumque, quorum media pars foramen habet. Foramini imponitur subtilissima sindon ex raris staminibus contexta. Simulatque fauces ad pristinum habitum reuerterunt, vulnus glutinandum est * (613).

- * Haec chirurgia ab ASCLEPIADE inuenta fuit, teste GALENO in Medico, Cap. XIII. T. II. p. 329. et CAELIO AVRELIANO Lib. III. Acutar. Cap. IV. p. 195. Illa non semper feliciter cessit, quare ARETAEVUS Acut. Lib. I. Cap. VI. p. 111. et CAELIVS l. c. illam, vt vanam et periculosam prorsus repudiarunt. AVINZOAR in Lib. I. Thezizir Tract. X. Cap. XIV. experimentum in capra fecit. Exempla, vt homines ea morti erepti fuerunt, lege in RENATI MOREA Exerc. de Laryngotomia c. Th. BARTHOLINI Tr. de Angina puerorum edito p. 132. (prostat etiam in Epist. med. BARTHOLINI Cent. I. Ep. 81. p. 336.) qui eam bis feliciter adhibitam vidit, primo in hortulano, et deinde in milite cui levis vocis raucitas post curationem relicta fuit. Exempla vero recentiora vide in GARENGEOT *Operat.* T. I. p. 455. in *Transact. Angl.* No. 416. p. 448. in *Compendio* IOH. MARTYNS *Vol. VII.* p. 496.

§. 618.

Num haec chirurgia, si protinus adhibetur, eos qui aquis submersi praefocati sunt, ad vitam reuocare possit, vsus et observatio experimentorum ostendet *

- * Singulari studio hanc rem persecutus est GEORGIUS DE THARDING in Epistola ad SCHROECKIVM de methodo subueniendi submersis per Laryngotomiam, Rostochii MDCCXIV. At enim, hanc curationem non omnibus submersis

mersis opitulari posse, ostendit Vir doctiss. IO. HENR. KESSELRING, in Dissert. de Morte submersorum in aquis, praefide CHR. LVDOV. CHARISIO, Regiom. MDCCXXXV, proposita.

† Vtilis immo etiam necessaria esse potest haec tracheae sectio in submersis, si glottis ita impedita est coeno, ut inflatio pulmonum, per nares nullo modo fieri possit. Initium tamen curationis ab ea ordiendum non est.

†† PLATNERVS nihil dixit de illa ratione guttur aperiendi, qua opus est ad extrahendum ea, quae illapsa sunt. Antea quam de ea adhibenda certi quid statuamus scire debemus, haereat ne alienum id in loco, ad quem peruenire liceat. Si licet, cunctandum non est, verum mature partes tracheam regentes sectione longitudinem corporis sequente ad os sterni fere diuidantur, et ad latera remoueantur reprimanturque, et tot cartilagine arteriae scalpello dissecantur, ut, iis paulum distractis, via vel hamulo vel forcipi pateat, quo illud eiiciatur.

VVLNERA STOMACHI.

§. 619.

Communes vero asperae arteriae atque stomachi curationes sunt. Per prioris vulnus aer exit, per posterioris cibus et potus. Insanabile est vulnus, si totus stomachus discissus fuit. Aegro leuamentum praestari potest, si mediante infundibulo iuscula in vulneratum stomachum immittuntur. Vbi vero in stomacho vulnus est, idque hiat, necessarium est, caput inclinari et fascia ad pectus adduci (610), quo orae vulneris attrahantur. Cum autem vulnus, nisi purgatum sit, glutinari nequeat, illud famem sitimque dederat. Vbi vero aliquid assumpsit homo, vulnus soluendum et spongia ex calido vino expressa deterendum est. Ne etiam aegrum, qui nullum cibum accipit, fames perdat, is nutriripotest iusculis, quae aluum immittuntur. Prius vero, quam illa intus mittantur, alius aliis lotionibus eam mouentibus subduenda est*.

* Com-

* Commemorabile experimentum; est, quod a RAMAZZINI factum in eius Operibus p. 173. legimus, de moniali virgine, quae per LXVI. dies, cum nihil deglutire possit, folis iusculis in aluum immixtis seruata fuit. Conf. HILDEBRANDI Cent. IV. Obs. 30. p. 311. De Clysterum nutrientium usu disputatum olim fuit inter LITTRIVM et LEMERY. Vid. H. A. R. Sc. MDCCXVII. p. 25.

VVLNERA PECTORIS.

§. 620.

Sequitur, vt de vulneribus dicam, quae in pectoribus sunt. Haec, vel ex acuto telo, vel ex retuso graui, atque ex glande plumbea, esse solent. Euenire vero potest, vt vulnus ad interiora haud perueniat, sed intra carnes desinat, id quod scire licet, si id exploratur, obseruatis omnibus, quae alias praecipitur (358 ad 361). Ad id vero explorandum specillo laevi retuso atque pleniori opus est, qualis est fistula argentea, qua vrinam, si naturaliter non redditur, foeminae emoliri solent chirurgi.

§. 621.

Sunt vero quaedam, quae eum, qui curaturus est, decipere possunt. Si enim vulnus tenue, sed altum atque curuum, corpus vero plenum est, ac obesus incidere potest, vt, quamuis, nec specillum demittere nec mediante siphone lotio per illud immitti queat, et, quamuis, nec spiritus, nec multus sanguis, ex vulnere feratur, nihilominus illud penitus penetret in intus condita viscera arteriae venaeque percussae finem. Nam digito et specillo reniti potest adeps, vel musculus, praecipue, si corpus interea, dum specillum demittitur, non, vt decet, inclinatur. Nonnunquam etiam ense tenui acuto discissa est vna ex cartilaginibus, quibus costae finiuntur. Hoc vulnus nec his nec specillum admittit, nec ex eo sanguis, vel spiritus ex-

exit, et nihilominus intus viscera maioresque arteriae ac venae violatae esse possunt *. Illud igitur vulnus in summa carne et absque periculo est, in quod specillum demitti haud potest, ex quo, nec spiritus, nec sanguis, effertur, et cum quo aeger facile spirat **, in caeteroquin nullum emphysema *** est, et in vulnerato nihil eorum, quae terrere possunt, deprenderitur.

* Vid. Exemplum in FAUDACQ p. 429.

** Est etiam quaedam spirandi difficultas, si muscoli externi, etiam illi, qui ad respirationem nihil faciunt, vulnerati et inflammati sunt, v. gr. pectoralis maior. Haec vero, quae a dolore oritur, facile discernitur ab ea, quae ab emissio in pectus cruore proficiscitur. Accidere tamen potest, ut primis diebus aeger facile spiret, post vero nihilominus difficultate spirandi stranguletur, si forte minor arteria, vel vena, vel ductus thoracicus, vulnere dissectus fuit, et ex iis humor pedetentim effertur.

† Vulnere musculo pectorali maiori, latissimo dorsi, aut cucullari sic illata, ut vel sub iis pus colligatur, vel vehementior dolor et inflammatio accedant, grauiora mouent symptomata. Vulnus plerumque ampliandum est, et dolori atque inflammationi medendum.

*** Emphysema (519) crebrius pectoris vulneribus, quae ad interiora penetrarunt, superuenire solet, maxime, si ea curua sunt et quae aer libere transire nequit. At enim vero, etiam in pectore, ut in capite, illud oriri potest, si aer, praecipue gelidus, in adiposas cellulas extrinsecus irrumpit illasque distendit. Ergo nec emphysema certum indicium est, vulnus ad interiora peruenisse.

§. 622.

Vulnus, quod in carne est, non aliam curationem quirit, quam, quae alias proposita fuit. Si vulnus curuum est et curuum, expedit, illud protinus noua ratione ampliari (373. 476. 477), quo cruor, aliaque, quae intus haerent, possint excuti, et quo ad interiora vulneris perueniri liceat. Si illud transversum est sub cute, haec supra specillum inciditur (478), vel, si vulnus nimis longum est, quam, ut hac ratione chi-

rurgus illud scalpello commode persequi possit, scillicet illud demittunt, et cutis supra huius caput altera parte inciditur (478).

§. 623.

Quandoque, si vulnus quidem in carnibus est, at in his altius, et ad pleuram usque, penetrat, metus esse solet, ne pleura inflammetur, et ne per illam perrumpat et in pectus destillet. Pus etiam quandoque serpit et tunicam adiposam, quae inter musculos, praecipue sub pectorali et latissimo dextra est, rodit, quae res magnis suppurationibus occasionem dare potest. Igitur vel ob hanc causam vulnus ampliandum est. Oportet vero aegrum in ipsius vulnus inclinatum cubare, quo omnis humor exeat. Nec in eiusmodi vulnus dari turunda debet, cum hac puris exitus prohiberi possit. Imponuntur linimenta, vel pura, vel ex medicamento idoneo expressa. Iniicitur fasciā, quam mantile cum suspensorio vocant. Nec hanc nimis adstrictam esse oportet.

§. 624.

Vulnus etiam magnum, discissum, et quod multum hiat, curari potest. Minus tamen apta his vulnibus futura est, cum pectus propter spirandi necessitatem quiescere haud possit. Si vero ea utendum oportet illam non nimis raram esse.

§. 625.

Pessimae illorum vulnerum curationes sunt, quibus vertebrae costaeque fractae, et in tergo, pro vertebra, tendines, aponeuroses, aliaeque nervorum partes, collisae sunt. In his sanguis mittendus praeter abstinentiam adhibenda omnia sunt, quae contra inflammationem maxime possunt.

§. 626.

Costam perfractam esse, intelligitur ex dolore ungente, qui eo tempore, quo spiritus trahitur, increbrescit, et, si locus tactu indolescit. Protinus huic malo occurrendum est, quia id graues pleurae inflammationes, et febris et suppuratio, et saepe vitae periculum sequitur. Necessè itaque est, ut contra costam vitis et carnes incidantur, utque id, quod fractum est, revertatur in sedem suam excitetur. Fragmenta vero vitiosa, quae pleuram, vel carnes, vulnerant, extrahi, si inhaerent, praecidi, debent. Reliqua, quae ad hanc curationem pertinent, infra, ubi de ossibus actis dicetur, uberius persequar. Costae ossa sunt dura, et quae facile vitium contrahunt. Ad vulnus curandum non aliis medicamentis opus est, quam, quae alibi exposui (523. 524.). Nec in his casibus melius succurritur ac inflammationis periculum aueritur, quam sanguinis missione et abstinencia.

§. 627.

Vulnus autem penitus et in ipsum pectus penetrasse, ex variis indiciis scire licet. Considerari debet illud, quo vulnus illatum fuit (360). Digitus, vel scissillum demitti (358. 359. 621), lotio mediante spongia immitti, potest. Si extrinsecus vulnere empysema accessit, coniicere licet, pleuram percussam esse (621). Certior vero nota est, si ex vulnere spiritus, et sanguis copiosior,isque aere remixtus atque spumans, exit, vel, si talem vulneratus expuit, id quod incidit, ubi pulmo laesus est. Cur vero quandoque, nec aer, nec sanguis, quamvis eius non parum effusus coiuverit, ex vulnere exeant, supra retuli (621).

§. 628.

Est tamen quaedam differentia. Sanguis si effluit rubens atque spumans, is ex pulmone fertur, si rubens

bens nullo aere remixtus, laesa arteria, v. g. inter costalis est. Si exit obscurus, vena icta est, si lacteus humor sanguini admixtus est, is, ductum thoracicum discissum esse, significat. Oportet vero cum his considerari et ictum, qualis is fuerit, et vulnus, et internarum partium sedes, quae etiam indices sunt, qui intus laesum sit.

§. 629.

Maiorem vero arteriam venamque, vel ipsum cor percussum esse, cognoscitur, si magnus sanguinis modus ex vulnere fertur, praecipue, si id in summo pectore est, et si praeccluso vulnere spiritus difficiliter trahitur, si arteriarum motus elanguescunt, inaequales sunt, ac saepe intermittunt. Si color pallidissimus sudores frigidi, extremis partibus etiam frigidis, occurrunt, et aeger animo linquitur, quae omnia, eum in praecipiti esse, significant. Si pulmo ictus est et sanguis ex ore copiose et sine tussi fertur, signum est maiorem arteriam venamque in pulmone percussam esse. Si tussis non, nisi parum sanguinis, extunditur arteriae venaque minores vulneratae sunt.

§. 630.

At, si sanguis in pectus confluit, is moto corporis ita mouetur, ut vulneratus eius impetum sentiat. Praeter hanc vero etiam quaedam aliae notae oriuntur quarum commune est spiritum difficiliter trahi. enim sanguis diaphragma onerat, homo caput sublimius habere sine molestia non potest, et, ubi illud ita habet spiritus facilius trahitur, quam redditur. Aegro vero in illud latus, in quo sanguis inclusus est, cubare iucundius est. At, si valde multus humor effusus fueritque pulmonem adeo premit, ut spiritum haurire non queat, homo paulo liberius spirat, si erecto corpore est, quam, si cubat. Nam sic sanguis, qui coit, qui

em septum tranſuerſum premit, non vero totum pulmonem ſtrangulat, id quod fit, vbi homo, qui ectus ſanguine plenum habet, ſupinus iacet. Si vero in latuſ integrum inclinatus cubat, ſpiritus multum impeditur, aſt longe facilius redditur, quam trahitur. tumor enim mediaſtinum premit, et prohibet, quo minus diaphragma ſatis deſcendere poſſit.

§. 631.

Non raro autem pulmo pleurae adhaereſcit. Si parte vulnuſ eſt, et ipſe pulmo laeſuſ eſt, ſanguis, ſi in pectuſ confluere nequit, per vulnuſ fertur, et ore prorumpit, quare aeger ſatis facile ſpirat.

§. 632.

Mediaſtinum autem percuffum eſſe, ſcire licet ex ſo, qui illatuſ fuit, ictu, ex telo, ſi altiuſ penetrauit, hominiſ poſitu, et ſi in medio pectore dolor vrget. homo etiam, quem ſupinum iacere iuuat, aegre ſpirum trahit. Accidere poteſt, vt in vtroque pectoriſ quo ſanguis confluat,

§. 633.

Praeter notas, quae, pulmonem vulneratuſ eſſe, ſtendunt (626. 627. 630), etiam hoc experiri licet. otio in vulnuſ immitti poteſt, quae, ſi ſub proprio genere ſaporis in ore ſentitur, pulmonem laeſum eſſe ſignificat. Iam a veteribuſ proditum legimus, hominem, cui pulmo grauiter ictuſ eſt, ſi in ipſum vulnuſ clinatuſ ſit, loqui, ſi in aliam partem, obmuteſcere*.

* Vide CELSV M L. V. Cap. 26. §. 9. PARAEVM Lib. IX. Cap. XXX. p. 308. Cauſſa forte haec eſt: Spirituſ pulmo- ne hauſtuſ per huiuſ vulnuſ, ſi id maiuſ eſt, effertur, et ideo ei uſ tantum, quantum ad vocem formandam neceſſarium eſt, laryngi reddi nequit. Vbi vero vulnuſ coſtiſ ad- primitur, ſpirituſ illud permanere haud adeo facile poteſt. Rem aliter explicat GENGA in Comment. in HIPPOCR.

Aphor. ad Chirurgiam spectantes Sect. VI. Aphor. XVIII. p. 259. qui putat compresso mediastino sermonem prohiberi, cum eo diaphragma nimis adducatur.

§. 634.

Non solum vero latentium, sed et futurarum rerum quaedam notas habemus, quae aegrum vel consolari, vel terrere, possunt. Protinus omne vulnus, quod in pectus penetrauit, timendum est, minus tamen quod ex gladii ictu, quam, quod etiam collisum, vel ex glande plumbea est. 'Raro et interdum eo tempore, quo pulmones adspirantes se contrahunt, accidere potest, ut pectus vulnere confodiatur et intus nihil violetur. Potest secunda valetudo ei contingere, qui nec magnum, nec altum, vulnus in pulmone habet, sed, quod in summa huius parte est. Graue periculum habent vulnera, quae penitus penetrauerunt praecipue, quae glans plumbea impressit. Hos enim qui sic vulnerati sunt, si nec sanguinis profusione exhausti, nec inflammatione strangulantur, tabe inuadit, cum iis pulmonum exulceratio accidere soleat. Sanabiliora sunt vulnera, quae infimo pectori super diaphragma illata sunt, quia his nec maiores arteriae venaeque subesse solent, et quia ipsum vulnus praecidio est, ex quo humor, qui intus confluit, exit potest. Magis ob id timeri debent ea, quae in altiori pectoris parte sunt. Si telum per utrumque pectus perrupit, si cor, maior asperae et sanguiferentis arteriae ac venae ramus percussus est, mors in propinquo esse solet. Si homini, qui graui sanguinis profusione exhaustus, diu quasi intermortuus iacuit (626), intra viginti quatuor horas calor, atque arteriarum vis, redit, ei salus contingere potest.

§. 635.

Haec vulnera glutinari non possunt, nisi euocatus prius ex pectore, et aere, et omni, qui intus coit humor

umore. Aer cum sanguine, si plaga non magna est, ducitur ore hominis, qui vulnus exfugit. Si omnis humor omnisque aer sic extractus fuit, si post vulnus incisum protinus deligatur, idque per aliquot dies non detegitur, homo vero et sanguinis missione et abstinentia utitur, vulnus saepe intra tam paucos dies nescit, ut hae curationes quibusdam minus sapientius prodigiosae visae fuerint, et quasi a praecipua et magica arte profectae. Oportet vero eum, qui sic medetur, certum esse, nihil alieni in pectore fuisse relictum. Si nullus homo est, qui vulnus exfugat, aer sanguisque extrahi possunt siphonibus ad id idoneis *.

* Vid. *L'Art de succer les playes par ANEL.*

† Suctio seu tubulis seu ore faciunda incommodis stipata est. Si aer extrahi debet, vix sat claudi potest vulnus, ut, dum fugitur, nullus novus aer ingrediatur; aut certe inter ipsam deligandi operam novus ingredietur. Si humor quidam extrahi debet, necesse est, ut tubuli caput attingat humorem illum. Quod vix locum habebit, si vulnus non versus inferiora est, etiamsi tubulus versus caput inflexus est. Si homo adhibetur, qui fugat, metus est, ne, si humor purulentus est, aut vulneratus morbo contagioso seu cognito, seu incognito laborat, homo fugens sibi noceat. Quam quidem noxam non auertere potest diaphragma in aliquo tubuli loco efformatum, de quo vid. *LVDWIGII Instit. Chirurg.* §. 973. Nam vis contagiosa halitibus non soli crassae materiei inhaeret. Illos autem in os adducit homo fugens, cum aeris communio inter os fugentis et tubuli caput necessaria sit. Ut nihil dicam de contrectatione vulneris, quae ab hac tali curatione vix abesse potest. Itaque melius est, aut vulneratum cuabre in vulnus, aut inciso thorace humorem extrahere.

§. 636.

Haec curatio vero locum non habet, ubi maior arteria venaque intus affecta sanguinem fundit. Nunquam enim sanguinem ex pectore emitti decet, priusquam ille intus conquieuit. Interdum vero, cum pressio pulmone omnis spiritus intercluditur, res cogit illud emoliri, id quod commode ex ipsa plaga fit.

Neceſſe vero eſt, vt aeger conquieſcat et vt non niſi parum ſpiritus hauriat, quia metus eſt, ne ſanguis dum pulmo pectusque diſtenduntur, copioſior efferatur.

§. 637.

Sanguinem vero intus conquieuiſſe, coniciere licet, ſi ſpirandi difficultas haud intenditur: qua re explorata is euocandus eſt. Fieri hoc poteſt per ipſum vulnus, ſi illud in inferiori pectoris parte eſt. Si anguſtius vulnus eſt, illud incidendum eſt, donec ſatis pateat, habita cura, ne pulmo laedatur *. Neceſſe vero eſt, ſi pulmo vulneratus non fuit, et, ſi ex eo nulla ſanguinis profuſio timetur, vt aeger ſpiritus quantum poteſt, pulmone hauriat, dum interea vulnus impoſito digito contegitur. Quando ſic ſpiritus dilatati fuere pulmones, tollitur digitus, et aeger iubetur, tuſſire. Tuſſi enim humor ex vulnere exunditur.

* Ad id idoneus eſt ſcalpellus anceps, cuius mucro reſuſus eſt. Eum debeo clari Argentoratensium Chirurgo ſupra laudato LE MAIRE vid. fig. XVI.

§. 638.

Si ſanguis in pectore concretus nihilominus remanſit, neceſſe eſt in vulnus lotionem compellere, vt cruenta, quae coiuerunt, diſcutiantur. Opportunum decoctum eſt ex hordeo, rad. althæae, fl. verbaſci maluae. Si vero ſanguis iam computruiſſe videtur, adiici poteſt mel, vel aqua vulneraria, et paucum ſalis ammoniaci. Humor, ſi per vulnus, quod in elatiori pectoris parte eſt, emitti nequit, nouum vulnus faciendum eſt; de qua chirurgia protinus dicam, prius vero, quae ad vulneris curationem attinent, exſequar.

§. 639.

Euocato omni humore, vulnus deligandum eſt. Imperandum eſt homini, vt ſpiritus, quantum poteſt, hauriat,

hauriat, eumque contineat. In vulnus, quamdiu fatius videtur, illud nondum glutinari, coniicitur linteolum caesitium, cuius orae in fila resolutae sunt (22). Superimponuntur linamenta mollia alio linteolo involuta *, et superdantur panni, iniicitur mantile cum suspensorio. Summo pectori hoc fasciae genus accommodari nequit, cui habena opportuna est, quae sub ala sinistra obuoluta per pectus ad dextrum humerum tendit, eiusque caput comprehendit, deinde ab ala dextra iterum per pectus decussando ad humerum sinistrum fertur, quem etiam complectitur, ita ut aliquoties ad hanc rationem circumagatur. Si vero etiam vulnus in tergo est, fascia, postquam humeri caput comprehendit, etiam per scapulas dari debet, et sic utrumque vulnus contegi.

* Turundae, si illae maiores durioresque sunt, vulnera multum alienare possunt et oras callosas reddere, ex qua fistulae nascuntur, quae difficilius sanescunt. Sanguinem etiam alia, quae intus sunt, exire prohibent (20). Si pulmo laesus est, illum rarum, et spongiae assimilem, irritant et inflammationem excitant, vel certe multum augent. Ergo convenit, illas omitti, et, si necesse est, plagam ampliari. Cannulae, quibus alii utuntur, longe nocentiores sunt. Quicquid vero in vulnus coniicitur, illud lino vinciri debet, cuius lini capita extra plagam relinquenda sunt, ne id in pectus deoluatur.

§. 640.

Quamdiu aliquod humoris vestigium apparet, vulnus glutinandum haud est, sed inditum linteolum (22), relinquendum. Vulneratum oportet semper in vulnus inclinatum esse, ut, si quid humoris intus superest, emittatur. Vbi vero is omnis euacuatus fuit, sine mora vulnus glutinandum est. Multum confert, si vulnus raro resoluitur, et omnis aer magna adhibita cura auertitur. Quo tempore vulnus contegendum est, monendus aeger, ut spiritum hauriat atque contineat, quo is, qui per plagam introrupit, discutiatur.

Si duo vulnera sunt, nunquam vtrumque resoluendum est, sed interea, dum alterum curatur, alterum diligentius operiri debet. Periculum enim oritur, ne pulmo, aere per vtrumque vulnus irruente pressus, nimium contrahatur, quae res exitiosa esse potest. Aer frigusque pestifera etiam his vulneribus sunt, quare ea celerius et admoto igne obliganda sunt. Reliqua curatio nullam peculiarem animaduersionem desiderat.

§. 641.

Si pulmo percussus est, et sanguis ex eo periculosius ruit, nullum aliud auxilium esse potest, quam quies et abstinentia. Vbi videntur id sustinere aegri vires posse, sanguis ex talo mitti potest, vt alia parte emissus desinat fluere, qua nolumus. Vbi vero parum sanguinis ex vulnere exiit, eum incisa vena detrahi longe magis necessarium est, quod pulmones ex retenta in iis materia inflammationem atque mala vlcera accipiunt.

§. 642.

Si pulmo pleurae ita adhaeret, vt nullus sanguis in pectus defluere possit, is omnis ex vulnere fertur. Hoc autem oportet crebrius resolui, et sanguinem, aliumque humorem, euocari. Periculum enim est, ne humor, si coercetur, pulmonem a pleura diducat, sicque perrumpat, et in pectus descendat, ex quo non, nisi maiori negotio, emitti potest.

§. 643.

Casus asperior est, si arteria, quae sub quaque costa ad anteriora fertur, vulnere praecisa est et sanguinem fundit. Admoueri, et ad eam valentius apprimi debet puluillus ex alcohol expressus. Saepe res requirit, vt ob id vulnus noua sectione ampliatur. Si periculum vrget, vulnus vulneri adiici, et iuxta illud, quod

quod curandum est, aliud fieri sub costa debet, et aliud supra illam. Per has duas plagas demittitur acus curua, auersa, vel retusa, qualis in chirurgia aneurysmatis adhiberi solet, filum ducens, quod, extracta terum acu, in vulneribus relinquitur. Linum adtringitur et arteria deuincitur, inter quam atque linum demitti puluillus potest. Repertum fuit aliud instrumentum *, quo linum mox sine facta prius plaga traici potest, quod vero corpori pleno atque obeso vix idoneum esse arbitror.

* Vid. GARENGEOT *des Operations* T. II. p. 430.

† Cum vulgo cognita constringentia, comprimentia, obturantia remedia propter vasis positum et sedem, atque partes adiacentes motumque thoracis ut plurimum aut non commode, aut non tuto adhibeantur; sunt aliae rationes articularias has comprimendi inuentae, quae ad usum traductae aliquando sanguinem represserunt, si locus quidem arteriae vulneratae satis a spina remotus curationem eius modi admitteret. Simpliciori apparatu usus est QUESNAY. Vestis est ex lamina eburnea, eaque tenui, cuius alterum caput linteo obuoluitur, sub quo puluinar est ex linteis discerptis sat multis compositum; idque fauciae arteriae apprimitur; subiacens costa pro hypomochlio est; alterum caput vestis ligaminibus duobus per foramina in eo facta datis alligatum fuit, ut commode potuit, atque sic sanguinis profluuium repressum est. Vid. *Comment. Acad. Chir. Paris.* T. II. Huic non dissimile parari iussit LOTTERI. Ex chalybe factum est, et haud procul a capite inflexum, quo sit, ut magis constantiusque apprimi possit. In extremo capite foramina quatuor sunt, per quae data fila puluinar aliquod affigere firmiter queant. In loco flexionis illius est foramen maius, quod iis, quae in pectore coierunt, exitum concedat. Versus alterum caput sunt foramina duo, oblonga illa, per quae ligamen ducitur, huic capiti firmando dicatum. Vid. idem *Volumen Comment. illorum*, p. 91. et p. 126. Sed ne haec quidem ratio comprimendi securitatem praestat. Nam motus thoracis et abdominis laminam eademque affixum puluinar abducere ab arteria potest; si valida vero fuerit appressio, sit partium vexatio; compressio vasis solum exteriora versus dirigitur, quae ab inferioribus superiora versus tendere debet; neque si qua costa fracta est, seu ea ipsa, quae vas faucium in sulco suo reconditum habet, seu ei subiecta, commodus erit machinamenti huius usus. Eapropter BELLOCVS excogitauit genus

genus quoddam torcularis (Tourniquet) maxime compositum; ut describi vix possit, descriptum intelligi ne vix quidem. Vid. idem Volumen *Comment.* cit. p. 127. Ac ne eo quidem comprimi poterit arteria, si in loco vulneris fracta costa est, et huius spinæ exstantes vel forcipe demtae sunt, vel relictæ pungunt partes vicinas. Alium modum proposuit GERARDVS. Ausus est, acu sat curua pleuram perfodere in loco quidem spinam versus paulum distante a vulnere arteriae atque filo constringere et costam et pleuram, arteriaeque apprimere puluinar. Vid. GARENGEOT *Traité des Operat. de Chir.* T. II. p. 377. praecipue vero DE LA FAYE in *Not. ad Dionis Cours d'Operat.* p. 421. Eius autem modum cum pauci probarent, acum aliam, quam iam antea paratam haberet, proposuit GOVLARDVS. Curua ea quoque est, sulco quodam conspicua in arcus sui conuexitate, qui filum commode recondat; pertusam primo voluit foraminibus duobus, deinde foramen alterum omisit, tanquam non modo non necessarium, sed turbas etiam Chirurgus parans. Apicem eius paulum reclusum fieri iubet, manubrium vero rectum, paulo longius. Sed haec quoque ratio curandi terrere potest. Nam primo fieri debet incisio cutis et musculorum intercostalium, corporis longitudinem sequens, costas quasi tres aperiens et nudans, fere ut fit in dicta paracenthesi thoracis. Deinceps ab superioris costae margine superiori perfodi vult pleuram, eaque pertusa acum ad costam inferiorem dirigi eleuando manubrium sic, ut pulmo non laedatur; apice reperto prope marginem superiorem costae inferioris per pleuram ad exteriora trudi iubet, et filo manus sinistrae digitis apprehenso retentoque, retrahi et educi acum e pectore, eademque postea filo, duplici et incerato illo puluinar apprimi arteriae saeculae, reliq. Acus ipsius effigiem delineatam descripsit et GOVLARDVS et GARENGEOT in *Comment. Acad. reg. sc. Paris.* a 1740 et GARENGEOT *Traité des Oper. de Chir.* T. II. Methodum GERARDI paulo subtilius excoluit LEBER Chirurgus Vindobonensis. Adhibet specillum flexile, cuius foramen recipit filum quadruplex. Per vulnus antea ampliatum (si ampliatio quidem opus fuerit) in pectus mittit specillum (haud dubie antea flexum) ita, ut in costae margine superiori caput eius percipiatur, et tum eo ipso loco vulnus infligit, ut filum digitis apprehendi, eiusque extremum alterum educi possit; quo facto retrahitur specillum seponiturque, atque filo, quod in sui medio affixum habet puluinar, satis constricto, atque adeo puluinari costae appresso arteria sanguinem fundens praeccluditur. Vid. PLENK *Sammlung von Beobachtungen*, p. 210. In omni autem ratione costam et pleuram constringendi antea costa nudari debet, ne carnes in

corruptionem abeant. Sed cum a filo constricto pleura mor-
fus accipiat continuos, symptomata grauiora rationem hanc
medendi plerumque subsequuntur, dolor scilicet et inflam-
matio, quibus misere mactatus homo mortem tandem oppe-
rit truculentior, quam si fato suo relictus vna cum san-
guine animam efflaret; id enim fieri placide solet. Ab
hac ratione vix differt ea, quam STEIDELE proposuit.
Vid. STEIDELE *Abhandlung von Blutflüssen*, p. 77. seq.
His igitur commotus THEDENIVS aliud remedium ad vul-
nera haec quaesivit, eoque vtens homines duos facile
sanauit. Arteriam vulneratam in sulco ipsius osseo ptorfus
dissecuit, adhibendo ferrum alterutra tantum parte secans,
quod figuram folii myrti, exigui eius, retulit; dissectae
arteriae caput, quod a parte spinæ est, versus hanc ipsam
spatio pollicis dimidii retrusit, vtens ad hanc enchiresin
ferro alio, aequè figuram folii myrti aemulente, sed vtrin-
que retuso eo; ita autem repressæ arteriae vestigia ipse
protinus pressit, turundam vel ex linteis carptis vel aga-
rico efformatam, at densiorem durioremque, adurgendo,
donec satis et sic compressum arteriae caput in sulco suo
esset, vt sanguinem nullum eiiceret. Vid. THEDENS *Neue
Bemerkungen und Erfahrungen*, p. 63. Optandum vehe-
menter est, vt tam facilis atque simplex ratio nunquam
non bene respondeat. Eam quidem STEIDELE parum
probat l. c. pag. 79. quod arteria et fonti suo vicina sit, et
cum costa et pleura arctius cohaereat, ei igitur vix detur
libertas se contrahendi. At vero, qui ab vicinitate illa
proficiscitur, impetus sanguinis, angulo, sub quo inter-
costales arteriae e trunco suo exeunt, frangitur, atque ma-
gis etiam adhibitis communibus haemorrhagiarum auxiliis
frangi potest. Estque praeterea, quae a vicinitate ista fit,
difficultas caeteris curandi generibus communis. Arteriae
vero contractio haud dubie iuuatur eius ipsius dissectione
et resolutione a costa (dissectae namque arteriae minores
contrahuntur, incisae hiant) nec non replicatione repressi-
oneque versus spinam; quo fit vt adiecta mediocris com-
pressio, quam turunda facit, sanguini sistendo sufficere
possit

§. 644.

Emphysema, si ex intus pertusa pleura, et, quia
olaga curua est, enascitur, requirit, vt vulnus proti-
us sectione ampliatur. Tumori adhibenda est lenis
ricatio, et superdanda sunt discutientia (519), atque
inter haec etiam epithemata. Expedit, tumorem, si
res patitur, impositis pannis et arcte circumdata
fascia

fascia paulo valentius comprimere *. Ecchymosis etiam scalpelli curationem requirit, quo vulneris orae conciduntur.

* Emphysema, ex quo fere totum corpus intumuit, vid: in C. A. R. Sc. MDCCXIII. p. 5. et aliud ex costarum fractura e. a. p. 154. Conf. LE DRAN Obs. T. I. Obs. XXXVII. p. 282. FAUDACQ p. 449. seq. prae caeteris doctiss. Viri IOH. HENR. SCHVLZE Diss. de Emphysemate, Halae MDCCXXXIII.

§. 645.

Euenire potest, vt glans plumbea illata corpori sit, quae vero ex longinquo missa in pectus penetrare non potuit, sed se intra duas costas demersit, ibique haeret. Magna cura illa reuellenda est. Si enim in pectus delabitur, diaphragmatis motum sistere et citam mortem adferre potest *. Igitur, si ea altius insidet et recipi commode non potest, quia labat, sub ea acus incurua traicienda est, ligulam, vel linteolum, trahens, quo glans comprehenditur, vt retro recipi atque tuto extrahi possit.

* Vid. similem casum in FAUDACQ p. 447.

E M P Y E M A.

§. 646.

Supereſt, vt de chirurgia dicam, qua pectus vulnere perforatur, vt humor, qui intus confluxit, possit effundi. Illa vero non solum necessaria est, vbi vulnus in elatiori pectoris parte est (630), sed etiam, si, vel ex vulnere, vel ex inflammatione, *ἐμπύημα*, seu suppuratio, orta, vomica vero rupta est. Huius enim humor subita multitudine septum medium onerat et spiritum intercludit. Raro haec medendi ratio iis opitulatur, quibus hydrops, siue id morbi genus est, quo in pectus multa aqua contrahitur. Nec in vul-

nere

tere eam admitti posse, nisi prius sanguis intus erumpens conquieuerit, supra praecepi (636). Magnum tamen discrimen est, si vomica a costarum parte, vel, si a pulmone, nascitur. Vltimum enim si accidit, ex vomica rupta plerumque malum vlcus manet, quod pulmonem excest et phthisin adfert. Idem periculum ille solet, si casus vetustior est, et, si sanguis, vel pus, quod intus ex vero etiam empyemate confluit, iam compotruit, ex quo etiam exulceratio accidere solet.

§. 647.

Suppurationem vero futuram esse, ex certis indiciis deprehendi potest. Si pleuritis vehementisque et acuta febris circa dies, quos *κρίσιμους* Medici vocant, nec sudore per totum corpus diffuso, nec sanguine ex naribus et haemorrhoidibus profluente, soluta fuit, nec in vrina nihil subsedit, nec ea purulenta processit, neque per aluum biliosa purulentaque descenderunt, vel, si haec exigua fuerunt, et quibus aeger leuatus aud fuit, empyema futurum est. Id etiam timeri potest, si ab initio morbi sanguis vel nullus detractus, vel id factum fuit serius, et corpus malis medicamentis affectum est. Febris enim quamuis se multum remittat, nunquam prorsus quiescit, sed interdum intenditur, vt aeger etiam inhorreat. Sentit ille cum his obscurum manentemque dolorem et grauitatem a parte, quae ab initio vehementius doluerat; Fastidium vrgetur, et purulentus in ore sapor est, nec corpus refectionem accipit; Tussicula vexat, quae tamen nihil emolitur; ex quibus omnibus praefagire licet, vomicam futuram esse, quae circa vicesimum diem venturimum erumpere solet.

§. 648.

Aliae vero notae ostendunt, quo latere pus ex vomica rupta confluerit. Res enim plerumque manifesta

nifesta est, si sanguis ex vulnere coiiit. Vomica vero nasci solet eo loco, qui ab initio acuto vehementique dolore affectus fuit. Homo, ea rupta, impetum intus circumfluentis humoris sentit, cui in latus, in quo pus est, cubare iucundius est. Si enim in latus sanum cubat, id ex pondere aliquo onerari videtur. Multo etiam pure intentum latus magis se attollit et aliquantum intumescit (conf. 630).

§. 649.

Si igitur res cogit, vel sanguinem, vel pus, emoliri, aperiendum pectus est; Aeger cubare in ventrem debet, eoque sic collocato, ante omnia inueniendus locus est, quo pectus tuto perforari potest. Esse vero is solet inter nonam decimamque costam, iuxta vertebrae, ad tertium circiter digitum ab horum processibus transversis, et ad quintum, vel sextum, a mediana spina. Vbi locus repertus est, ex atramento lineae super eum duci eaque incidi debet.

§. 649.

Prius vero incidenda cutis adepsque est, plaga recta, ad inferiora descendente, quam, ne strictior sit; longam esse oportet, Post vero hominis ventri submittendus pulvinus, et altera transversa plaga facienda est, qua et muscoli et pleura aperiuntur. Magna vero cura adhiberi debet, ne pulmo laedatur, et ne arteria intercostalis praecidatur, quare scalpellus ab hac longe esse, et ad summam inferioris costae partem multum inclinari, ubique etiam leuissima manu teneri debet.

§. 651.

Pectore sic perforato, pus, vel cruor, erumpit. Vulnus illo ancipiti scalpello (637. *) potest ampliari. Si magna vis puris intus confluit, non protinus omne, sed eius maior pars, effundi, et haec curatio diuidi

uidi debet. In vulnus coniiciendum, et in hoc relinquendum est linteolum caesitium (22. 639). Si ad etergendam malam materiam id necessarium videtur, intus infundi possunt supra commemoratae lotiones (638). Non raro illae melius omittuntur, cum et humor, et ipse aer, qui cum his intus fertur, saepe pus noceant, quam illae proficiunt.

§. 652.

Si, vulneris et sanguinis emittendi causa, novum vulnus factum fuit, prius, et quod casu inflatum est, curari, ex altero vero, id, quod humoris superest, potest emitti. Quae ad reliquam curationem, aegri iam positum, pertinent, supra (639. 640) comprehensa sunt.

§. 653.

Pus, quod in pectore coit, quandoque per alium, quae urinam efferri, observationibus compertum est*. Huius rei cognitio, cum securitatem aegro polliceatur, iam ad hanc medendi rationem pertinet. Nam idonea auxilia haud inveniuntur, si salutaria a perniciosis non discernuntur.

* Vide GALENUM de locis affectis Lib. VI. Cap. V. T. VII. p. 517. HIPPOCRATES vero in Coacis No. 429. de purulentis pronunciauit, mortis signum esse, si iis pus per alium fluat. Hoc vero intelligendum videtur de phthisicis, et quibus pulmo corruptus est, non vero de empyemate. Commemorabile exemplum legitur in Comm. A. R. Sc. Anno MDCCXXXI. p. 724.

§. 654.

Magnum etiam periculum adfert pus, si eius cois in mediastino factus est. Huius rei cognitio facilis esse solet. Coniecturam facit dolor, si in medio pectore sub sternum sentitur, et si ea indicia, quae supra proposui (645), adfuerunt, et si nihilominus ex perforato pectore nihil puris seffluxit. In hoc

Y

casu

casu iam olim chirurgia proposita fuit, qua sternum modiololo exciditur *, ad quod auxilium decurrendum ubi vltima experiri statutum est.

* Hanc chirurgiam olim adhibuit GALENVS de Administrat. Anat. Cap. XIII. T. IV. p. 262.

VVLNERA ABDOMINIS.

§. 655.

De vulneribus, quae abdomini inferuntur, etiam dubitari potest, num illa altius et intus penetraverint. Hoc ex iisdem notis, quas supra proposui (621), cognoscitur, et si plaga non alium humorem cibum, potum, chymum, chylum, lympham, bilem, sterces, vrinam, vel horum odorem, exhibet, si nec ea quae per os, vel aluum, redduntur, rursus sanguinis mixta sunt, si non alia mala signa, et quae periculum ostendunt, rigor, horror atque febris, inflammatio, dolor, spiritus difficilis, singultus, nervorum distentio, animi defectio, sudor frigidus, vel, qui non per totum corpus aequalis est, superueniunt.

§. 656.

Etiam in hoc vulnere genere euenire potest, ut ex minori, aut altius penetrante, plaga nihil exeat. Igitur haec (655) sedulo consideranda sunt, et videndum, num spiritus facilis sit, et num, contrectato ventre, tumor vel durities sentiatur. Nam, ubi sanguis in ventrem confluxit, is indurefcit atque distenditur, praecordia sursum contrahuntur et dolens spiritus aegre trahitur. Tandem, si homo non sanguinis profusione rapitur, accedere solent inflammationis internae notae.

§. 657.

Periculum habent vulnera, quibus musculorum, qui in abdomine sunt, tendo, lineam albam vocant, percussus est. Solent enim graues inflammationes cum signis malis, et quae valde terrere possunt, cum acuto dolore, vomitu, singultu, neruorum distentione, mox cum periculo mortis, oriri. Protinus ea necessaria sunt, quae aduersus inflammationem maxime valent.

§. 658.

Magnam etiam inflammationem accipere solent musculorum rectorum aponeuroses, si in eas mucro gladii, vel alius teli, desedit, illaeque exigua tantum parte fissae sunt. Id vero cognoscitur, si circa leuem plagam durus tumor permanet, isque cum inflammatione, aliisque malis signis increfcit. Quod ubi incipit, necesse est, vulnus scalpello latius aperiri (83. 187. 99), quo illud satis pateat, et humori exitus detur. Super illud autem vtendum est medicamentis, quae denuo in locis neruosis mouendum idonea sunt, superdatis aliis adhibitisque omnibus auxiliis, quae aduersus inflammationem possunt.

§. 659.

Vulnus magnum altumque, quo et cutis, et muscoli, discissi sunt, etiamsi illud haud ad interiora peruenerit, aliud, graueque, periculum facere potest. Nam peritoneum, quo intus abdomen inclusum est, mole illud onerantium viscerum distenditur, vt intestina atque epiploon continere satis nequeat. Inde herniae genus oritur, de quo infra dicam. Quo vero illud auertatur, vulnus protinus suendum est, non sine ratione, ac mox de aliis vulneribus dicam, in quibus hoc futurae genus, quod gastroraphiam nominant, necessarium est. Caeteris vulneribus, quae ad interi-

ora haud peruenerunt, eadem curatio adhibenda, quam in pectoris vulneribus (622. 623) exposui.

§. 660.

Vulnus vero ad interiora penetrasse, per notas scire possumus, quas alias (627. 628. 629. 655) proposui. Si specillo vtendum est, illud non nimis tenue neque acutum, esse, et quam leuissima manu tenere debet, quoniam periculum est, ne eo id, quod occurrat, violetur. Frequentius, si abdomen ictu perforatum est, epiploon atque intestina euoluuntur, quae oculis subiecta sunt.

† Vt metus ille non sit, chirurgi ad explorandum vulnus eius generis vtuntur cereo.

§. 661.

Quid vero intus laesum sit, aliae notae significant. Ipsum enim telum considerari debet, vt scire possimus, quo, et quam alte, illud peruenerit. Specillum ostendit, num plaga recta sit, num curua, num flexa et tortuosa, qualis fieri potest, si vulneratus eo temporis articulo, quo is percussus fuit, corpus repente in aliquam partem inclinauit. Et viscerum sedes, quae notitia ex Anatome petenda, indicant, quid intus percussum sit. Haud tamen illud debet ignorari, viscerum positum ex variis occasionibus non parum mutari. Nam vbi corpus erectum est, altius descendunt viscera, et ipsum, quod his innexum est, diaphragma. Multum etiam interest, an homo vulnus acceperit ieiunus, vel, postquam se assumpto cibo potuque repleuit. Nam et haec res efficit, vt, aucto ventriculi pondere, viscera magis deprimantur. Constat etiam inter omnes, septum transuersum cuius omnibus visceribus, quae illi innexa sunt, eo tempore deorsum ferri, quo pulmones spiritum hauriunt, iterum

um vero adscendere alio tempore, quo illi adspirantes
è contrahunt

§. 662.

Ad singulas vero species si veniendum est, vbi
septum transuersum percussum fuit, praecordia vehe-
nenter dolent, accedit inflammatio, febris. Spiritus
parus est et aegre ducitur, homo crebrius singultit,
nonnunquam vomit: Quae omnia asperiora sunt, si
percussum fuit medium septi transuersi, quod neruo-
um esse constat.

§. 663.

Si ventriculus vulnus acceperit, insequitur praecor-
diorum dolor, nausea, anxietas, crebriori vomitu
cruenta et biliosa eiiciuntur. Si quid cibi, vel potio-
nis, assumptum est, id cito redditur, vel ex vulnere
effertur. Solet etiam et singultus et ructus frequens
esse.

§. 664.

Eaedem fere (663) intestini vulnerati notae sunt.
Ex tenuiori intestino exit chylus, ex crassiori stercus,
quorum odor ex vulnere ad nares fertur. Venter
tumet et indurescit, cruenta per aluum descendunt.
Homo eundem dolorem patitur, quem is, qui colico
morbo afflictus est. Frequens etiam est vomitus ac
singultus.

§. 665.

Vbi iecur percussum est, vel sanguinis profusio
hominem repente exhaurit, vel, si is superstes est,
spiritus cum molestia ac dolore ducitur. Accedente
inflammatione, seu hepatitis, totum corpus decolora-
tur et ictericum fit. Vbi vero bilis receptaculum,
illaque itinera, per quae haec emittitur, vulnerata
sunt, bilis ex vulnere fertur.

§. 666.

Renibus percussis, vrina in adipem, quo renes comprehenduntur, huiusque cellulas, fertur. In his vero mala vlcera, et quandoque gangraena, nasci solent. Dolor acrior cum prurigine ac calore est, quia humor serpendo penetrandoque adipem aliasque partes vorat. Pauca vrina et cum difficultate redditur, in qua quaedam cruenta concreta sunt, aut sanguis per vrinae iter editur. Vbi vulnere praecisus vreter est, dolor ad inguina testiculosque descendit, quem dolorem alias patiuntur, quibus calculus ex renibus in vretes prolapsus deuoluitur.

§. 667.

Mesenterio autem vulnerato vehemens dolor esse solet, praecipue, si nerui praecisi fuerunt. Toto enim mesenterio crebros neruos intextos esse compertum est *.

* Vid. RVYSCHII Aduers. Dec. II. Cap. IV. p. 8.

§. 668.

Vterus si percussus est, sanguis per naturam descendit. Non attinet dicere, hoc ex alia occasione accidere posse.

§. 669.

Vrina, si in viris per aluum excernitur, significat, vesicam ea parte vulneratam esse, qua cum intestino recto committitur.

§. 670.

Euenire potest, vt ex recenti vulnere pus cum sanguine profluat, id quod accidit, si qua parte fuit vomica, olim ex alia causa excitata, et iam telo percussa ruptaque.

§. 671.

Periculosa vulnera sunt, quae altius in abdomen penetrant. Raro incidit, vt vulnus ad interiora et
per

er medium abdomen ad oppositam partem ita perueniat, vt intus nihil sublit, quod ictum fuerit. Plerumque enim ex discissis vasis sanguis profluit, vel discissis neruosis sedibus vehemens dolor et inflammatio mouetur, vel humor ex percussis receptaculis effusus corrumpitur, quo integrae partes tandem afficiuntur vitianturque ita, vt hominem, vel gangraena, vel pes, tollat.

§. 672.

Vix ad sanitatem perueniunt, quibus septum transversum percussum fuit. Certior tamen desperatio esse solet, si media atque tendinea eius pars icta sit.

† A pertuso septo transverso genus singulare herniae aliquando relictum fuisse in medicorum libris legimus vid. IOSEPH. TADD. KLINKOSCH, *Programma quo divisionem herniarum etc. proponit Pragae*. Prostat quoque descriptum in *Thesouro Dissertationum* ab EDVARDO SANDIFORT collectarum.

§. 673.

In praecipiti sunt, quibus ventriculus percussus sit, praecipue, si duo tergora vulnerata sunt. Nulla spero spes superest, si icta fuit ima ventriculi, nec non pars, vbi pylorus est, et is in summum intestinum parcatatur. Seruari quandoque possunt, quibus in extrema parte vulnus est *.

* Id testantur cultriuiorum exempla. Vide de cultriuioro Prussico scripta BECKHERI et LOTHII, et de focmina relationem HVBNERI.

§. 674.

Idem fere periculum adferunt intestinorum vulnera. Glutinari possunt interdum minora et recta, praecipue si vulneratum intestinum ad peritoneum commode adduci potest. Intestinum, si vtrunque perforatum est, plerumque mortem maturat. Facilius nescit crassum, quam tenue. Nonnunquam homi-

nes seruati sunt, quibus intestinum totum discissum fuit *, imo alii, quibus maior pars fuit corrupta et ablata **.

* Vide BLEGNY Zodiacum Med. Gall. Anno MDCLXXX. mense Iunio Obs. IV. pag. 123. Ephem. Nat. Curios. Dec. II. A. VIII. Obs. 229. et illum casum a Celeber. Viris ABR. VATERO in Dissert. de Vulnerum in intestinis lethalitate, Witteb. MDCCXX. et POLYCARPO GOTTLIEB SCHACHERO in Dissert. de Intestinatorum situ praeternaturali, Lipsiae MDCCXXI. descriptum. Conf. *Transact. Angl.* No. 366. p. 89. et in Compendio Vol. VII. p. 515. Tab. XVII. fig. 81.

** RAVIVS in Orat. de Methodo Anatomem docendi et discendi p. 36. proficitur, se curasse intestinum ileum, quod ad longitudinem trium vlnarum per vulnus prolapsum, et per quatuordecim dies aeri expositum fuerat, magna cum supuratione. MERIVS in Comm. A. R. Sc. MDCCI. p. 370. testatur, in foemina, cui hernia inflammata fuerat, corruptum fuisse intestinum ad longitudinem quatuor, vel quinque circiter, pedum, quae vero conualuit, relicto etiam in inguine foramine, per quod ea, quae per intestina descendere solent, emissa fuerunt. Similes fere historias habet CHESELDEN in *the Anatomy* p. 148. seq. Tab. XXIII. et XXIV. et Celeberr. HEISTERVS in *Observ. Med. Misc. theoreticis et practicis* Helmst. Anno MDCCXXX. propositis, Conf. *the Medical Essays* Vol. I. Obs. XX. pag. 227. vbi tandem vlcus, quod in inguine relictum fuerat, iterum fuit glutinatum. FAUDACQ *Reflexions sur les playes* p. 562. vulnus describit valde collisum, quippe pluribus minoribus plumbeis globulis (*mit Schroot*) colo illatum, et quod ad sanitatem iterum perductum fuit. Vulnus coli, ex quo alui etiam faex exierat, perfecte sanatum descripsit GAETANVS TACCONI. Vid. *Commerc. Literar.* Anno MDCCXXXVIII. hebd. XLII. p. 329. Ex his clarum est, intestinatorum vulnera, etiam vehementiora, curationem recipere posse.

† Sunt plures historiae de coli vulneribus; ita perfanatis, vt anus artificialis seu succenturiatus hominis vitam produceret. Prae aliis omnibus legi meretur ea, quam B. S. ALBINVS memoriae mandauit in *Annotation. Academic. Lib. II.*

§. 675.

At, quibus iecinoris summa vel extrema pars leniter vulnerata est, ii conseruari possunt. Vbi vero hoc viscus medium percussum est, et vbi laesae sunt maiores

res arteriae ac venae et bilis itinera, vulnus mortiferum est.

§. 676.

Periculum etiam certum esse solet, si alia viscera, lien, pancreas, huiusque meatus, nec non receptaculum chyli, vulnus acceperunt. Mors etiam plerumque sequitur, si mesenterium percussum fuit. Id enim et multas maioresque arterias venasque, tum sanguinem, tum chylum, ferentes, crebros etiam nervos, habet, et adipem immatum, ob quem illud corruptioni et gangraenae valde opportunum est. Omentum celerrime corrumpitur, sine noxa vero id, quod corruptum est, abscinditur.

§. 677.

Vterus cum periculo summo vulneratur, maxime in grauida, in qua arteriae venaeque multum distantiae sunt. Plerumque enim foeminae brevi profusione sanguinis, vel inflammatione, moriuntur *.

* Grauidae mulieris tumidus uterus facile vulnerari potest. Vid. Exemplum, ubi non solum is, sed et ipse partus, minori glande plumbea (*Schroot-Korn*) percussus fuit, in Dissert. de Vtero grauidae una cum foetu vulnerato, quam IOHAN. MART. REICHARD, Argentorati Anno MDCCXXXV. proposuit.

§. 678.

Non ita mala sunt vulnera renum, quae in summa et externa horum parte sunt, mortifera vero, quae penetratius penetrauerunt. Si enim ex plaga, qua ren percussus, vel vreter praecisus est, vrina exit, illa futuram mortem, vel maturiorem, vel seriore, denunciat.

† Si a vulnerato rene cruor multus in laxam et adipe plenam cellulositatem effluit, suppuratio diffusa multum negotii facit.

§. 679.

Non semper mortem sequi, si vesica vulnerata est, docet illa chirurgia, quae calculosis adhibetur. Interdum etiam euenit, vt glans plumbea, quae per abdomen in vesicam perrupit, in hac, glutinato exterius vulnere, relicta fuerit, cui postmodum accreuit calculus *. Nihilominus vero haec vulnera peiora sunt, et quae magnum periculum faciunt.

* Vid. HILDANVS in Obs. Chirurg. Cent. III. Obs. 67. p. 250. et de Lithotomia Cap. III. p. 710. TH. BARTHOLINVS in Epp. med. Cent. III. Ep. XXXV. pag. 128. aliud exemplum a MORANDO propositum in *Tr. de la Taille au haut Appareil* p. 224. Conf. H. A. R. Sc. Anno MDCCXXV. p. 30. et CHESELDENS *Treatise on the High Operation* Tab. X. Lit. D. TVLPIVS in Obs. Med. Lib. III. Cap. IX. p. 195. habet historiam de homine, cui hypogastrium cornu tauri siluestris ictum fuit. Post curatum vulnus homo calculo laborare coepit, et tandem valde magnus fuit ex vesica extractus, in huius autem medio reppererunt turundam, sine dubio in vulnere olim relictam.

§. 680.

Quodsi ex certis indiciis coniicitur, intus, quamvis vulnus penitus penetrauerit, nihil esse violatum, protinus prospiciendum est, ne quid aeris, sanguinis, vel alius humoris, in ventre maneat. Nisi igitur aliud quid hoc prohibeat, (prohibere vero possunt intestinum ac epiploon, si haec per vulnus prolabantur) aeger, quamdiu aliquid profluit, certa ratione collocari, et in vulnus inclinari debet, quo omne, quod intus est, profluat. Melius etiam id expellitur, si aeger subinde spiritum continere iubetur. Humor etiam ore alius hominis, vel mediante siphone, educi potest (635). Si plaga nimis angusta est, illa noua sectione latius aperiri debet. Demitti etiam in vulnus potest lotio (638); qua ea, quae intus sunt, eluuntur, donec purus humor per vulnus redditur. Tandem

em vulnus, vt in aliis, carne repletur, et cicatrix ducitur.

✚ Si sanguis multus ex vulneratis vasis diffusus est inter viscera, putredo nata vix non semper hominem rapit. Fit, vero etiam nonnunquam, vt is haereat inter peritonaeum et intestina loco quodam definito. Tum prodesse potest tempestiua eius emissio ex vulnere versus inferiora ampliata. Hac de re lectu digna sunt, quae PETITVS, Filius, commentatus est in *Comment. Ac. R. Chir. Paris. T. I. p. 237. seq. T. II. p. 92. seq.*

§. 681.

Sanguis vero non prius his auxiliis euocari potest, iam, si intus conquieuit, cuius rei nota est, si abdomen haud magis intumescit. Si enim fluere non debet, aeger in praecipiti est (629). Non satis tutum, si modo vero vnicum est praesidium, sanguinem alia arte emittere, quo is a vulnere auertatur, et quod sa hominis imbecillitas sanguinis profusionem probeat (636. 637. 641).

§. 682.

In omnibus abdominis vulneribus nihil magis proicit, quam, si alius crebrius leui lotione ex emollientibus composita ducitur. Leuatis enim sic intestinis, abdomen molle fit, vulnus celerius glutinatur. Et enim, si in crasso intestino vulnus est, clysteres sine ernicie adhiberi non possunt, quia id, quod in aluum iniicitur, per vulnus in abdomen effertur.

§. 683.

Frequentius incidit, vt ex vulnere, si id paulo lateus patet, et omentum, intestina, euoluantur. Omentum mox considerari debet, num illud, quod breui corrumpitur ac emoritur, integrum sit. Solet enim esse, si rubet ac calet, vbi illud protinus super intestina duci debet. Accidere vero potest, vt sub eo sit intestinum, quod, si ei immoratur et in ventrem compellitur,

pellitur, contortum manere potest et εἰλεῶν morbum afferre, quare illud, antequam conditur, diligentius, summa tamen cum moderatione, exsolui debet. Id vero, quod ex omento liuidum, nigrum et emortuum est, oportet protinus forfice abscindere. Sed vero ante quaedam facienda sunt, ne ex sanguinis profusione periculum sit. Id, quod prolapsum est, paulatim adducitur et explicatur, ne qua arteria, vel vena, laedatur. Traiicitur per illud medium acus maior, lino incerato sequente. Lini duo capita prius ex superiore parte, post ex inferiore inter se adstringuntur, quod vero infra vinculum est, forfice, vel scalpello, praeciditur. Post haec, quod super est, iterum conditur, lini autem capita, quo omentum vinctum fuit, debent extra vulnus dependere.

§. 684.

Non vero semper haec curatio necessaria est. Si enim plaga angusta et omentum solum, non vero cum eo intestinum prolapsum est, illud, si ab oris vulneris arcte comprimitur, emoritur et sine noxa tollitur, reliquum, pure orto, cum vulnere coalescit *.

* Vid. LE DRAN T. II. Obs. 90. p. 238.

§. 685.

Si vero omentum sic cum peritoneo coit, et aeger inter curationem erecto capite supinus cubauit, accidere potest, ut eo adducatur ventriculus. His percurato etiam vulnere, quam primum se, vel cibo vel potione, paululum repleuerunt, vomitus oritur quia omentum distendi ventriculum non finit. Nec huic vitio auxilium est.

† A coalitu omenti, cuius pars resecta vel sponte naturae separata est, cum peritoneo, quicumque sub curatione vulnerati positus et decubitus fuerit, non modo ventriculus sed intestinum colon etiam afficitur, si plena sunt aut flati
bu

bus distenta. Libere enim fluctuare omentum in ventre nequit, consequens igitur est, ut et omentum et ventriculus et intestina tendantur. Inde modo vomitus, modo colicae species.

§. 686.

Si intestinum, vel solum, vel cum epiploo, euolutum fuit, et illud mox considerari debet, num integrum sit, num vulneratum. Quod integrum est, etento spiritu distenditur, perforatum autem conficit, et materiam, quae per id descendit, exhibet. Vulneratum etiam raro prolabitur. Si integrum est, effundi debet, id quod non semper ita facile est, maxime, si id diu aeri expositum fuit, et spiritu, vel stercore, retento multum intumuit. Magna vero cum estimatione succurrendum est, ne intestina aere circumdata alienentur. Vbi enim pallida, liuida, nigra et frigida facta sunt, ut plurimum omnis medicina inanis esse solet. Si iam sicciora sunt, aqua non nimis valida irrorari possunt, cui parum olei adiectum est. Imponi potest spongia, vel linteum, calida, vel calido tiam lacte, madefactum. Ad calorem naturalem auerendum etiam facere potest, si animal recens occisum t adhuc calens superhabetur. Illud vero ignorari non debet, nimium calorem fere nocere, cum eo spiritus, qui inclusus est, rarior fiat, et intestinum magis distendatur.

† In omni vulnere abdominis frigus sedulo auertendum tum a reliquo corpore, tum vero ac praecipue ab imo ventre. Alioquin affectio colica existens omnia exasperat et curationem turbat.

§. 687.

Vbi autem id reponi debet, resupinandus homo est. Multum enim interest, hominem recte iacere, et semper superior sit ea pars, quae vulnus habet. Si igitur supra umbilicum vulnus est, aeger caput subline habeat. Si infra umbilicum, ille demisso capite sit,

fit, et coxis elatioribus. Si plaga in latere est, is semper in id, quod integrum est, debet inclinari. Oportet vero chirurgum ita condere intestina, ut, permittatis subinde digitorum vicibus, leniter premat, et, ut semper priora repellat, quae posteriora, prolapsa sunt. Repositis omnibus, venter hominis leniter concuti potest, ut singula in suis sedibus confidant. Curiose etiam prospiciendum est, ut intestinum et omentum, quae refundi debent, in suas sedes et ventrem reducantur. Nam incidere potest, ut illa sub cute intra musculos et horum aponeuroses condantur, qua re mortifera inflammatio excitatur.

§. 688.

Quod si vero plaga angustior, et intestina, quia vastiora, tument, retro compelli nequeunt, experienda alia sunt. Expedit, illa digitis magis educere, quo retentus spiritus et eo delapsum stercus latius dissipentur. Saepe etiam prodest sanguinis missio, quae et inflammationi et spasms medetur et plagam strictiorem laxat. Multi intestina acu compungunt, quo retentus spiritus exire possit, id quod, quia intestina non parum irritantur, ut in iis etiam inflammatio et suppuratio moueatur, sine perniciē fieri haud posset existimo.

§. 689.

Interdum tamen haec omnia parum proficiunt, sed vulnus noua sectione latius aperiendum est. Haec res vero summam moderationem postulat, ne intestina laedantur, neque, qua arteria venaue incidatur, et ne etiam omento, si id vexatum fuit, maius vitium accedat. Demitti in vulnus debet specillum, fulcum in longum ductum habens, cuius mucronem retusum esse, medium autem scutulum habere oportet *, quo reprimuntur intestina, ut illa a scalpello longe sint. Scal-

Scalpellum enim super specillum etiam in vulnus demittitur, adhibita cura, ne illud aliquid laedat. Post vero, dum simul, et specillum, et scalpellum, educuntur, inciditur cutis cum subiectis musculis ac peritoneaeo, donec vulnus satis patere videtur.

* Vid. GARENGEOT *des Instr.* T. I. Cap. VII. Art. I.

§. 690.

Multi aliis ferramentis vtuntur. Adhiberi enim potest Syringotomus vulgo regius dictus (*bistoury-oyal*) * vel Herniotomus, seu scalpellum falcatum, quod ferramento absconditur et pressio elatere exsurgit (*bistoury-caché*) **. Hoc, cum mucro facile laedere intestina possit, haud ita pridem immutauit et huic chirurgiae magis idoneum reddidit LE DRAN ***. PETIUS repertor fuit alius scalpelli, quod aciem habet, ma, non cote, acutam, et mucronem retusum ac obtundum. Hoc, nisi valentius impressum, scindere aud potest, neque ideo intestina adeo facile ledere ****.

* Vid. HEISTERI *Chirurg.* Tab. V. fig. 3.

** Vid. GARENGEOT *des Operat.* Tom. I. Cap. VII. Art. III. p. 232.

*** Vid. LE DRAN *Obs.* T. II. p. 26.

**** GARENGEOT c. l. Art. II. p. 227.

§. 691.

Vbi autem plaga strictior est, et euolutum intestinum, accepto spiritu, vel stercore, ita tumet, vt sine periculo, nec specillum, nec aliud ferramentum, in plagam demitti possit, manu reclinandum intestinum, interposito digiti vngue, deorsum versus, scalpello circumspectius incidenda summa cutis est, magna adhibita moderatione, ne mucro vsque ad intestinum perfidat, illudque vulneret. Monendus ob id aeger, vt se contineat, qui leui motu salutem in extremum

num pene discrimen adducere potest. Vbi diducta cutis erit, etiam muscoli sic, suspensa manu, semper altius impresso vngue, aperiri possunt, donec laxior sit plaga, eaque specillum admittat.

§. 692.

Sed haec Chirurgia etiam alias quasdam animaduersiones desiderat. Si vulnus noua sectione ampliari debet, cauendum, ne arteria epigastrica, quae sub musculo abdominis recto sursum fertur, vulneretur, ex qua mortifera sanguinis profusio oriri posset. Si autem vulnus iuxta umbilicum est, scalpellum ita inclinari debet, ne attingat ligamenta, quae ex arteriis et vena manent, quas in infantibus ad umbilicum pertinere constat. Nam illas in iunioribus aliquando adhuc cauas et peruias reperiri, ut sanguinem transmittere possint, obseruatione cognitum est. Neque etiam, nisi cum periculo, laeditur linea alba (651), quare, vbi vulnus adiiciendum est, oportet omnes has sedes euitari. Vbi intestina reposita sunt, curiose inspiciendum est, ne sanguis, vel alius humor, in ventre relinquatur. Prohibetur, si aeger in vulnus inclinat, cubat, et eo tempore, quo vulnus obligari debet, spiritum retinet. Id vero saepe prohibet metus, ne ea, quae, ex vulnere prolapsa in suasque sedes reducta fuerunt, iterum euoluantur.

ΕΝΤΕΡΟΡΑΦΗ.

§. 693.

Intestina, si perforata sunt, aliquando sanescunt, si vulnus peritoneo, vel alii cuidam parti, alii etiam intestino iungitur, et cum eo glutinatur*. Difficiliorem tamen fere curationem habent tenuia, quam crassa, et tolerabiliora sunt vulnera recta oblonga, quam obliqua et transversa. Etiam de intestinis suen-
is cogitauerunt chirurgi, quae futura adhiberi pot-
est, non, quod certa fiducia sit, sed, quod dubia spes
certa desperatione sit potior**. Ante omnia vero
considerandum, an iis color sanus sit. Si enim liuida,
et pallida, aut nigra, sunt, aut sensu carent, super-
flua et inanis haec curatio est.

* Illud enim ante omnia tenendum est, intestinorum, ventri-
culi, aliorumque receptaculorum vulnera, si sanescunt, non
ita glutinari, atque alia vulnera. Nam neque orae ita ad-
ducuntur, ut se contingant, et inter se coeant, neque vul-
nera supercrescente carne implentur, sed pars vulnerata
iungitur aliis, quae prope sunt, cum quibus media cicatrice
concrevit. Vide sectionem hominis, qui olim abdomini
plures plagas, etiam intestina penetrantes, intulerat, et
iterum conualuerat, in C. A. R. Sc. MDCCV. p. 40.

** Iudicium CELSI de hac chirurgia L. VIII. Cap. XVI.

† CELSVS autem in loco allegato sic curari posse negat intesti-
num tenue. PETITVS, vir summae peritiae et famae om-
nino improbat futuras intestinis vulneratis faciendas, neque
quenquam chirurgorum futuram pellionum ad usum
traduxisse credit. Vid. *Traité des Maladies chirurgicales.*
Ouvrage Posthume de M. I. L. PETIT. A Paris 1774. T. I.
p. 34.

§. 694.

Si itaque hanc futuram experiri statutum est, pro-
curatur ex abdominis vulnere percussum intestinum,
iunguntur inter se orae, et chirurgus digitis, pollice
indice laevae manus,prehendit intestinum, mini-
ster vero illud etiam altera parte continet, ut vulneris

Z

orae

orae sibi recta oppositae sint. Expedit vero, digitos, quibus intestinumprehenditur, linteolo circumdatos esse, calida madente, quo mollius prehendi queat. Traicitur per oras acus minor laevis, cuspidem acutam triquetram habens 377), quae filo plenior esse debet, ut non necesse sit, illam vi cogi, sed, ut, quasi sua sponte, sequatur.

§. 695.

Solet vero vulgo ea futura intestinis adhiberi, quae pelliones utuntur, et quae filum super oras in orbem fertur, illasque comprehendit. Quia vero filum, sanescente vulnere, iterum educi debet, futura, si quis ea uti velit, ita iniicienda est, ut acus non uno ictu per utramque oram transmittatur, sed per unam post alteram, et non recta, sed oblique. Filum etiam nimis valenter adduci non debet, quo mitius insideat. Nec finis nodo sistendus, nec alia ratione innectendus est, sed capita fili longiora adduci debent, ut extra plagam propendeant.

§. 696.

Quia vero in hac futura acus intestinum saepius transiit, et filum etiam crebrius traiectum id vehementius mordet, illa magnam ac periculosissimam inflammationem mouere potest. Recentiores igitur hanc suendi rationem omittunt, et raram, illamque futuram adhibent, quae aliis etiam vulneribus idonea est. Filum itaque per utramque oram transmittunt, huiusmodi capita, nec deligant, nec in nodum nectunt, sed digitis parumper contorquent eaque adducunt et extrinsece vulnus relinquunt. Nec crebriori futura utuntur. Nam cum vulneratum intestinum ad peritonaei vultum adducitur, id cum hoc glutinatur (693 *).

§. 697.

Haec vero suendi ratio proficere potest, si plaga intestino illata minor et oblonga est. Transuersa vero plaga

plaga, et si intestinum totum diuisum ac praecisum est, alio auxilio eget, quod non minus difficultatis habet. Oportet enim, si fieri potest, intestini discissi fines ex ventre promere, et illum, qui ad aluum spectat, filo deuincire, alterum vero, qui superne labitur, externo vulneri ita adsuere, vt is ea, quae per intestina descendunt, transmittat, et vt haec per nouam quasi aluum excernantur. Quare etiam huic loco vasculum stannicum aptari, idque ventri alligari, debet, quo illae sordes excipiantur. Miserum hoc auxilium tolerabile miserius malum facit, cum, nisi illud adhibeatur, necesse sit, aegrum perire. Id etiam non, nisi iis, conuenit, quibus inferiora intestina, ileum, aut colon, percussum fuit *.

* Conf. Obseruat. supra ad. §. 674. citatas.

§. 698.

Intestina vero vulnerata nunquam sanescere possunt, nisi fames adhibeatur, vel victus, qui a fame prior est. Satietas enim vulnera excitat, eaque diducit, et aegrum saepe in summum, et mortis, periculum praecipitare potest. Dari possunt, partitis vicibus, pauca iurulenta iuraque gelata, et quae aegrum non tam alunt, quam sustinent. Si vulnus in intestino tenui est, in aluum etiam iura immitti possunt (619).

§. 699.

Nec alia medendi ratio est, si ventriculus vulnus habet. Illum autem eo tempore, quo is repletus est, vulnerari commodius esse videtur, quam eo, quo ieiunus ac vacuus est. Nam, expulsa, quae intus est, materia, et ipse ventriculus et vulneris orae contrahuntur. Nonnulli igitur praecipiunt, vt, si vulneris externi sedes ostendat plagam in superiori ventriculi parte esse, et, si homo, qui ictus fuit, expletus sit,

etiā vomitus inuitetur, eoque ventriculus citius vacuetur. Hoc vero non, nisi lenissimis auxiliis, et irritatis digito faucibus, fieri debere existimo. Et his longum ieiunium necessarium, omnis satietas mortifera est.

† Si homo ventriculo vulneratus antea coenauit, et facile vomit, non modo a vomitu seu sponte seu arte moto hoc consequimur, vt orae vulneris ventriculi contrahantur arctenturque; sed etiam illud, vt in depleto, contracto atque collapsio ventriculo vasa vulnerata contrahi et in se coire possint, sanguinisque igitur ex iis fluxus remittat. Saepius autem profuisse vomitum testatur MORANDVS in *Comment. Ac. Chir. Paris.*

§. 700.

Repositis, et epiploo, et intestinis, euocatoque omni, qui intus confluxerat, humore, vulnus etiam, quod in abdomine est, curari debet. Illud vero, si exiguum est, non prius glutinari debet, quam, donec, nec pus, nec alius humor, ex vulnere exit. Non vero, facile immittenda turunda est, sed in vulnus coniiciendum linteolum, et, si res postulat, vulnus latius aperiendum est. Si vero magis opportunum videtur, turunda vti, illam breuem, paruam, mollemque esse oportet. Ea plurimum nocere potest, si epiploon alienatum, vel intestinum percussum, ad peritonaei vulnus adducta sunt. Imponuntur exterius puluilli pannique, superdatur emplastrum, cuius tamen medium foratum esse conuenit, iniicitur mantile cum suspensorio. Nam haec fascia pectori et ventri communis est.

§. 701.

Filum, quo intestinum sutum est, nec non aliud, quo omentum deuinctum fuit, si curatio bene cedit, pure orto, sponte excidit et sine negotio educitur, id quod quinto, vel sexto circiter, die fieri consuevit, vbi aeger in intestino velut quandam pruriginem sentit.

tit. Filum si ex secundo intestino extrahi debet, eius alterum caput quam proxime ad vulnus praecidendum est, quo illud facilius sequatur. Dum filum educitur, digiti imponi debent vulneri, et in omnibus, ne aliquid diducatur laedaturque, magna moderatio adhibenda est.

ΓΑΣΤΡΟΡΑΦΙΑ.

§. 702.

Vulnus abdominis, quod magnum est et hiat, fuisse debet. Illa vero futura, quae aliis vulneribus adhibetur, haud satis continet, quare plures haec vulnera ea futura comprehendunt, quae pinnata dicitur. Fere magis idonea est, quae ex communi et hac, quae cum pinnis fit, composita est.

§. 703.

Adductis oris, atramento notari potest cutis, qua perforari debet. Necesse vero est, ut inter futuram et utramque oram digiti spatium sit. In duas acus curvas maiores coniicitur filum, ex novem filis valentioribus ita compositum, ut quasi unitas sit. Lina vero haec haud torta esse debent, sed sibi ad latera posita, et media cera ita agglutinata, ut quasi ligulam repraesentent. Tum acus ab interiori parte in exteriorem, per illam atramento factam notam, adhibito etiam ferramento (379) traieciatur, ita, ut peritonaeum, quod multum recedere solet, quoque perforetur. Eadem ratione etiam altera acus, idem filum ducens, per alteram oram transmittitur. Hoc vero permutatis manibus et ita fieri debet, ut dextra, quae mox acum traiecit, iam oras vulneris contineat. Summa etiam cura habenda, ut ea pars acum, quae acuta est, ab intestino longe sit, quare cuspis digito imponi et

cum hoc in ventrem demitti debet. Si vulnus malus est, id simili ratione, secundo, vel tertio, fui oportet, semper acubus ab interiore parte venientibus. Traiectis sic linis, omnis humor ex abdomine exprimi, orae vero vulneris, impositis vtrique manibus, adduci debent. His tandem peractis, lina, quae in vulnere haerent, in tres aequales partes diuiduntur. Vnius partis capita inter se deuinciuntur, non alia ratione, quam in communi futura, interposito etiam inter ea panniculo minori, qui commodè ex panno serico incerato fieri potest. Id quod vero filorum reliquum est, diuiditur et vtrique super pinnam, vel aliud bacillum, deuincitur. Cum vero haec bacilla, si duriora sunt, premendo offendere soleant, illa fieri possunt ex cerèo tenui, qui panno serico incerato comprehenditur, vel ex eodem panno conuoluto, quibus sic adductae orae continentur.

§. 704.

Antequam vero vulnus, quod sutum est, deligatur, illis filis prospiciendum est, quibus, vel omentum deuinctum, vel intestinum sutum, fuit. Haec enim ad vulnus adducuntur, exterius super ventrem collocantur, ac mediante emplastro sistuntur. Si et omentum deligatum et intestinum sutum fuit, expedit, haec fila varii coloris esse, quo melius distingui queant. Super vulnus non alia medicamenta dari debent, quam, quae alias proposui. Si vero vulnus collisum est, vel, si deuinctum fuit epiploon, pus impositis medicamentis mouendum est. Ergo vulnus non nimis valenter futura intercludi debet, quo exitus sit humori, et quo etiam medicamenta pus mouentia in illud coniici queant. De turunda, quam multi, in hoc casu necessariam esse, contendunt, aliquoties dixi, illam alienam esse, cum intestina et epiploon grauiter irri-

irritare possit. Illa tamen cura etiam adhibenda est, ut humor, qui intus coit, profluat, et ne pus, quod ex vulnere fertur, descendat, ad quam rem plurimum facit, si homo frequentius in vulnus inclinatus cubat. Si inflammationis timor est, vulnus et totus venter circumliniendus est oleo, quod rosam excepit, et cui parum vini, vel spiritus ardentis, admixtum fuit.

§. 705.

Ne orae vulneris diducantur, necesse est, ut aeger se contineat et in lectulo quiescat. Quia id etiam fieri potest, ubi desidendi necessitas est, et quia venter mixtu inflari solet, crebrius lotiones in aluum immitti debent, ut haec sine nisu respondeat. Vitari etiam oportet sternutamentum, quod lac, si naribus adducitur, prohibet, nec non tussis et anhelitus. Nec spiritus imis pulmonibus hauriendus est. Haec etiam ei, qui conualuisse videtur, diu ita seruanda sunt, et adhibenda abstinentia est. Nam omnibus, qui sibi maturius indulgent, et in eius, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere, peccant, plura et genera et tempora periculi esse solent. Diu etiam adhiberi et arcte circum ventrem dari vinctura debet, cui pila assuta est. Huic enim subiicitur minus confirmata cicatrix, et intus compellitur intestinum atque omentum. Accidere enim potest, ut haec, laxatis carnibus ac cute, descendant, atque sic herniae genus oriatur, de cuius curatione alio loco dicetur. Nam peritoneum, si id vulnere discissum est, aliis partibus iungitur et cum his concrevit, orae vero eius haud coeunt, quare illi loco maior infirmitas manere consuevit. Haec vero proprie ad abdominis vulnera pertinent, caetera et in curatione et in victu similia iis esse debent, quae in alio quoque vulnerum genere praecepi. Nec alia viscera, si intus laesa sunt, propriam

priam curationem requirunt. In his enim praeter ea, quae in aliis vulneribus facienda sunt, nihil mouendum est.

V E X A T A.

§. 706.

Hactenus vulnerum curationes propositae fuerunt, nunc ad vexata veniendum est, de quibus etiam propria quaedam noscenda sunt. Vexata, quae aliis contusa, vel collisa, nominantur, sunt corporis viui partes, quibus telum, vel aliud durum ac retusum, ita impressum fuit, vt interius et sub cute minores arteriae venaeque varium humorem ferentes laceratae atque grauiter adfectae sint, quare ex iis humor, qui eos permanat, vel effunditur, vel in motu suo impeditur et sistitur.

§. 707.

Ergo etiam in vexatis corpuscula per minores arterias manantia subsistendo iter claudunt, et obstructionem efficiunt, quam saepe inflammatio sequitur. Ex quibus manifestum est, vexata inflammatis proxima esse. In ossibus autem, quae etiam frequentius colliduntur, veram inflammationem non esse, alias (35) proposui.

§. 708.

Vexata itaque fiunt a rebus, quae extrinsecus non alia ratione laedunt, quam, qua vulnera inferri solent (338 *).

* Praecipue vexata a corporibus duris fiunt. Cum vero fluidum maiori vi in corpus, v. g. per siphonem, agitur, vel, cum corpus ex alto in aquam praecipitatur, etiam partes grauiter adficiuntur, id quod probat, non a solis duris, sed etiam a fluidis, vexata proficisci. Etiam oriuntur a suctu, vel, si cutis ore fugitur, vel, si ei mediante igne admouetur cucurbitula. Nam ex his partes sugillatae et erore suffusae

fuffusae quoque relinquuntur. Tales vero maculae etiam ex aliis internisque causis oriuntur, id quod praecipue in varii generis pustulis et in febribus, quae cum *ἐξανθήματα* sunt,prehenditur. Saepe in his, maxime in malignis, sanguis nimis tenuis ac solutus in exiguas arteriolas propellitur. Scorbuto aegris maculae fiunt, quod a sanguine impuro crassoque et ideo subsistente arteriae minores clauduntur, et is in arterias lymphaticas vrgetur. At enim in moribundis illae maiores maculae liuidae ac obscurae nascuntur, quia sanguis ruber in vitali virtute defectas, laxatasque minores cutis arteriolas et venulas ruit, in quibus is coactus postmodum haeret.

† Sanguis in vexatis, aut etiam ab interna humorum diathesi maculas faciens, non modo in vasis haeret, sed in tela cellulosa quoque, siue per poros siue per oscula vasorum exierit.

§. 709.

Id, quod laedit, retusum esse debet, telum enim acutum vulnus imprimit (341). Si vexata cum vulnere sunt, vulnus collisum dicitur, de quo supra relatum est (341. 350. 370. 374. 384. ad 402. 462. ad 487).

§. 710.

Non vna vero ratione partes sic offenduntur. Nam eas aliquando ictus laedit, aliquando casus ab alto. Vexatorum etiam naturam habent partes, quae valentius comprimuntur, intenduntur, distorquentur, quare hoc vitii genus luxatis fractisque crebrius accidere solet.

§. 711.

Neque haec sola discrimina sunt, quae a causa proficiscuntur, maiora recipiunt sedes partesque, quae vexatae, vel contusae, esse solent. Hae vero in duas species commodè diuiduntur, externas nimirum internasque. Si de prioribus dicendum, vbi vexata est cutis, oritur fugillatio, quam Graeci *ἐκχύμωσις* nominant.

§. 712.

Ἐκχύμωσις enim nomen est tumori, qui in summa cute est, qui rubet, post liuorem contrahit, cui, nec magnus dolor, nec magna inflammatio, accedit. Oritur, si sanguis rubet, vel in eas arterias, quae lymphae accommodatae sunt, vel in cellulas adipis, transfusus est, et sub perluciente cute conspicitur *.

* Si alius humor, v. g. lymphæ, ab eadem causa in alium humorem vehentes atque insensibiles arterias, vel in adipis cellulas, transfunditur, nascitur etiam tumor, sed alius generis, v. g. oedema, quod vero ex eadem causa, ex confusione nimirum, ortum esse potest. Ecchymosis vero etiam alia occasione ex vulnere oritur, si hoc curuum est et obliquum et sanguis, qui profluit, in adipis cellulas vrgetur. Frequentius hoc incidit, si vena incisa et etiam altera parte percuta fuit, vel, si ante sectionem cutis a chirurgo nimis adducta fuit, et minor plaga, quae in cute est, vulneri, quod vena habet, non respondet.

§. 713.

At, cum grauior ictus fuit, et vehementer etiam percussae carnes subiectae sunt, aliaeque partes, timenda est inflammatio, suppuratio, gangraena, vlcus, fistula.

§. 714.

Laeso perioestio, hoc inflammatur, et insequitur exostosis, caries. Si totum os ita percussum fuit, id totum vitiatur. De quibus omnibus ad ossa attinentibus alio loco scribere operae pretium erit. In glandula grauius icta, vel pus oritur, vel ea scirrhus occupatur, ex quo non raro cancer nascitur. Si percussa fuit arteria, aneurysma insequitur (424). Si neruus grauius ictus est, is resoluitur et sensus intercidit et membrum, cui debilitas oritur, emacrescit. Si vero is parum offenditur, oritur vehemens dolor et distentio. Articulo ita percusso superuenire solet grauis inflammatio dolorque, isque nonnunquam contractus fit, et manet ἀγκύλη.

§. 715.

§. 715.

Ab his, quae intrinsecus et in prominentibus membris fiunt, ad ea pericula venio, quae in interioribus partibus ac visceribus, si illa icta ac contusa sunt, incidere consueverunt. Quae vero eueniunt, si caput ictum fuit, alias proposui (511. ad 514. 518. ad 526. 529. 530). De medulla, quae in spina est, infra dicam. Oculus, ictu laesus, inflammatur (284), et in eo nonnunquam hypopyon (321), aliquando etiam effusio, nascitur, eique omnis videndi facultas eripitur. Si percussa fuit glandula, ex qua lacrymae in oculum feruntur, oritur scirrhus, et propter hunc, *καληροφθαλμία* (279). Si ea pars in cantho interno ictum, grauem excepit, cui lacrymarum iter, seu sic dictus sacculus lacrymalis, subest, *ἀγχίλωψ* et *αἰγίλωψ* oriri potest, quarum noxarum expositio etiam in alium locum differenda est.

§. 716.

Contuso vero ac compresso pectori atque abdomini grauiora etiam pericula sunt. Nonnunquam enim intus maiores arteriae venaeque, imo viscera, rumpuntur laceranturque, ita, vt, effuso omni sanguine, cito mors sequatur. In liene hoc frequentius euenire, observationibus compertum est*. Ex eadem occasione intus etiam aneurysmata fieri, alias relatatum est (422. 424).

* Vide Lienum disruptorum observationes a IOH. VAL. SCHEID Argentorati MDCCXX. propositas et IOH. PHIL. EYSELII Dissert. de Ruptura Lienis, Erf. MDCXCVI. Hepatis disrupti exemplum adducit VILARS *Cours de Chirurgie* Tom. I. p. 415.

§. 717.

Si vero ictus paulo mitior fuit, et homo non tam cito tollitur, alia quandoque insequuntur, quae eum
lenta

lenta morte consumunt. Laeso enim pulmone, is sanguinem sput, et relinquitur saepe phthisis. Fractio sterni, costisque, grauem patitur inflammationem. Ossa haec rara etiam vitium contrahunt et mala vlcera excitant. Hepate percusso, oritur inflammatio, seu hepatitis, scirrhus, icterus, abscessus, vlcus, fluxus hepaticus, hydrops, tabes. Etiam in aliis visceribus, pancreate potissimum, nec non liene, mesenterio, vtero, scirrhos nasci, non ita rarum est.

† In pulmonibus militum gregariorum aliorumque hominum a vehementioribus fustigationibus, ecchymoses indeque phthisin fieri rarum non est.

§. 718.

Tandem etiam grauius percusso ac presso abdomine, valentius in variis sedibus peritoneum diducitur, et omentum ac intestina pondere deuoluuntur. Horum vitiorum, quae herniae nomine comprehenduntur, discrimina atque curationes alio loco exequar. In testibus compressis atque grauius ictis oriuntur etiam inflammatio, suppuratio, gangraena, scirrhus, sarcocoele, hydrocele, de quibus etiam infra scribam.

§. 719.

Vexata oculis exposita sunt, siquidem cutis color mutatur (712). Accedit etiam duritia. Aliquando autem locus, qui percussus fuit, iusto mollior esse solet. Prius enim incidit, si concurrentes humores in minores et lymphae idoneas arterias transfunduntur, si vero sanguis ex ruptis arteriis venisque in adipem emissus est, tumor plerumque mollior esse solet, atque digito cedens, nisi tumor sub valida neruosaque membrana sit.

§. 720.

Considerari etiam debet telum, quo homo percussus fuit, et num ictus, quocunque modo is illatus sit, fuerit mitior, vel vehementior (532).

§. 721.

Internas sedes percussas et violatas esse, haud certiora indicia habemus, quam ex iis, quae homini accidere solent (533. ad 536. 629. ad 632. 655. 656. 660. ad 669). Illud vero ignorari haud debet, in capite (511), pectore atque abdomine, non raro interiores partes atque viscera grauiter affecta, commota, imò disrupta atque lacerata esse, quamuis extrinsecus, vel nullum vestigium, vel non, nisi minor fugillatio, conspiciatur.

§. 722.

Quid vero de vexatis metuendum sperandumque sit, ex modo dictis intelligitur (712. ad 719). Maius periculum ostendunt, si partes grauiter percussae sunt, quae, ad vitam necessariae, haud facilem curationem recipiunt.

§. 723.

Nec vexatis fugillatisque alia ratione mederi licet, quam inflammatis. Si cutis percussa fuit et metuenda videtur *ἐκχύμωσις*, illa auerti potest, adhibitis iis, quae supra (62. ad 64. 76. ad 78) praecepi. Vbi iam ecchymosis tenet, haec aliena sunt, et adhiberi debent discutientia (56. ad 70. 79. ad 83). Vbi autem tumor valde durus est, vel iusto mollior, medicamenta, quae molliunt, et alia, quae discutiunt, varie misceantur (80). Tumor, si iam ad suppurationem spectare et pus alere videtur, requirit emollientia (89. ad 101). Quae vexatis glandulis superhaberi debeant, etiam libi (113. 89. ad 99) relatum est.

† Vexata mediocriter, h. e. vbi non tam effusio humorum insignis quam partium debilitas et relaxatio a causis vexantibus effecta est, curantur aqua frigida, oxycrato, aceto non adeo acri, vino rubro, aqua calcis, spiritu vini cum aquae parte aequa vel duabus tribusue, oxycrato cui sal ammoniacus adiectus est; haec quidem frigida profunt, saepius renouanda, in laxioribus hominibus addi potest alumen, vitriolum. Ex liquoribus illis coqui etiam possunt aromata vel inquilina vel exotica. Plurimum praeterea potest partis affectae compressio moderata quidem, sed tamen sufficiens, artuum igitur ita affectorum diligens, sat arcta restrictio fasciis faciunda. Hae autem saepius aliquo dictorum liquorum superfuso madida seruanda sunt.

Si humor extra vasa in cellulis haeret, eadem quidem omnia extrinsecus fieri debent, sed simul, vt resorptio promptior sit, neque inflammatio partem affectam corripiat, opus est sanguinis missione, aluum purgantibus antiphlogisticis. Quodsi tamen nimia vis humoris effusa est, neque illis adhibitis resorptio breui fit, cutis aliaeue partes, sub quibus humor quiescit, incidi atque is emitti debet, vulnus autem nutririi iis medicamentis externis, quibus aliqua, moderata virtus roborans est, qua suppuratio medicris haud prohibetur. Itaque balsamus Arcaei et epithemata roborantia diuersi modi pro habitu corporis curandi diuerso.

Si ad interiora corporis effectus confusionis transit, sanguinis missio et alui solutiones necessariae sunt, ac praeterea diluentia, nitrum, acetum, cremor tartari, fuligo splendens, castoreum, sanguis hircinus siccatus, decoctum seu infusum arnicae, aut radice rubiae tinctorum recte adhibita, iuuant discussionem stagnantis.

§. 724.

ScalPELLI autem operam desiderat ecchymosis altior maiorque, praecipue, si cum vulnere est. Concidenda enim cutis, et quiescens sanguis euocandus est (477). Vbi autem sub cute, vel etiam sub alia et neruosa membrana, sanguis concurrit, sectione tumor aperiendus et sanguis effundendus est (521. 522).

§. 725.


VISCERA, si intus violata sunt, non aliam curationem recipiunt, quam, quae ad auertendam eandem inflam-


inflammationem opportuna est. Sanguinis missio, quae etiam iteranda est (62. ad 69), et cum his abstinentia, a fame propior, primo loco sunt.


† In eorum, qui fulmine tacti sunt; corporibus non raro laesiones sunt vexatis non absimiles. Modo enim leuiores maculae rubenter, liuidae, nigricantes in cute sunt, modo humorum sub cute effusiones plus minus graues; modo cutis itemque interiores partes tanquam igne ambuslae. Nolo de ratione nocendi ampliter disputare, cum varietas et diuersitas effectuum a fulmine in corporibus humanis perpetratorum tanta tamque mirabilis sit, vt ea ipsa doceat, vana esse conamina doctorum hominum explicationem periclitantium. Noui ego hominem, qui, cum ante annos aliquot a fulmine surdus redditus esset, ab alio fulmine facultatem audiendi nictu oculi citius recuperaret. Sed haec haec. Fulmine tactorum maculae et humorum sub cute effusiones non alia ratione curantur, quam quae in superioribus tradita fuit. Concomitantia autem effecta in reliquo corpore singulares curationes requirunt. Aliter enim curandae sunt inflammationes et febres, aliter affectiones paralyticae, stupores, dolores, sopores, praecordiorum anxietas et spirandi difficultas etc. Sed haec a medicis requiri debent. De fulminis natura et agendi ratione atque cum igne atque flumine electrico similitudine multi multa haud ita pridem scripsere, in quibus non infimus est, qui alia occasione a nobis laudatus est, vir peritissimus, IOSEPHVS IACOBVS PLENK. Vidi eius *Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzney-wissenschaft*. Wien 1775.

†† Hac autem oblata occasione non possum non quaedam de illis adiacere sideratis, qui mortis speciem prae se ferunt. Fere autem vel apoplexia tacti sunt, vel pulmonum actio sublata est. Prima autem curatio est, vt, si in conclau fulmen hominem tetigit, in aliud spatiosum, vel si tempestas frigida non est, in liberum aerem gestentur, et obliquus trunco capitique situs detur. Statim atque fieri potest, vena iugularis secetur, multus aer affletur, nares plumula titillentur, irritentur oblati acrioribus et volatilibus sic quidem, vt volatilibus madida manus auxilium afferentis iterum iterumque ac saepius ante nares cominus et velocius moueatur, atque aer in nares vi aliqua pellatur. Facies quoque aqua frigida adspargenda est. Aere inflantur pulmones, et intestinum rectum, quod etiam immisso tabaci fumo exstimulari debet; fiant praeterea frictiones extremorum abdominis, pectoris, spinae totius; abdomen quo-

quoque et costae spuriae mediocriter vicissim comprimantur. Vt lingua etiam pungatur, paucae guttulae liquoris anodyni mineralis Hoffmanni, spiritus nitri dulcis sat volatilis, spiritus salis ammoniaci non acerrimi, aut aceti acerrimi, aut si horum copia non est, salis culinaris aliquid ei admovebimus. Si homo excitatus est, aliquid aceti diluti, vini rhenani, offerendum est, videndumque, quae symptomata curationem singularem exposcant. Nam aut sanguis vehementius commotus novam sanguinis missionem, nitro-sa aliaque temperantia, ingens virium imbecillitas medicamenta neruina desiderat; aut nouus sopor obrepit; quo casu prodesse possunt epithemata frigida supra ad commotionem cerebri laudata.










ch







TIGHT
GUTTERS
THROUGHOUT

